

Bertrand Dumont

Niches écologiques

ARBRES – ARBUSTES – CONIFÈRES

ROSIERS – PLANTES GRIMPANTES

Version 2005



L'horticulteur *Bertrand Dumont* présente la niche écologique de plus de 1 500 arbres, arbustes, conifères, plantes ligneuses et rosiers.



Vous vous DEMANDEZ pourquoi les plantes vivent dans la nature sans aide alors que dans votre jardin vous devez vous en préoccuper pour qu'elles survivent ? Tout simplement parce que, le plus souvent, vous plantez des végétaux sans vous soucier de leur habitat naturel alors que dans la nature les plantes se regroupent naturellement dans des conditions de vie qui leur conviennent. **En FAIT**, mettre une plante dans de mauvaises conditions de lumière et de sol (qualité, pH et humidité) risque de mettre sa vie en péril. Dans une approche tout à fait nouvelle et originale, ce livre présente des plantes ligneuses regroupées par habitat afin que vous puissiez leur fournir les conditions propices à leur épanouissement. De plus, vous trouverez des informations sur les rôles écologiques de chaque plante.

Niches écologiques

ARBRES – ARBUSTES – CONIFÈRES

ROSIERS – PLANTES GRIMPANTES

Bertrand Dumont



www.redactechweb.com

*À Janine, pour qui les habitants de cette planète,
humains, végétaux et animaux, sont si importants.*

Niches écologiques

ARBRES – ARBUSTES – CONIFÈRES

ROSIERS – PLANTES GRIMPANTES

Bertrand Dumont

www.redactechweb.com

TABLE DES MATIÈRES

Comment utiliser ce livre	12
Cinq critères pour décrire l'habitat	13
<i>Au soleil ou à l'ombre ?</i>	14
<i>En sol pauvre ou en sol riche ?</i>	14
<i>En sol léger ou en sol lourd ?</i>	15
<i>Un sol au pH acide ou alcalin ?</i>	15
<i>Une terre sèche ou une terre humide ?</i>	16
De l'habitat à la niche écologique	17
<i>Les types de plantes</i>	17
<i>Le bon nom de la plante</i>	19
<i>Rusticité et résistance au froid</i>	20
<i>Hauteurs et largeurs</i>	22
<i>Les attraits de la plante</i>	22
<i>Les données physiologiques</i>	23
<i>Attraits et limites écologiques</i>	25
Les habitats des arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers	26
<i>Carte des zones de rusticité</i>	381
Index des arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers	382
<i>Bibliographie</i>	414

Les habitats des arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers

SOLEIL

SOL pauvre caillouteux légèrement alcalin sec	26
SOL pauvre caillouteux neutre sec	27
SOL pauvre caillouteux légèrement acide sec	28
SOL pauvre léger légèrement alcalin sec	28
SOL pauvre léger neutre sec	29
SOL pauvre léger neutre frais et bien drainé	30
SOL pauvre léger neutre humide	32
SOL pauvre léger légèrement acide sec	33
SOL pauvre léger légèrement acide frais et bien drainé	34
SOL pauvre léger légèrement acide humide	35
SOL pauvre léger très acide sec	35
SOL pauvre léger très acide frais et bien drainé	36
SOL pauvre léger acide à alcalin sec	38
SOL pauvre meuble très alcalin sec	38
SOL pauvre meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	38
SOL pauvre meuble légèrement acide frais et bien drainé	39
SOL pauvre lourd neutre humide	39
SOL pauvre lourd légèrement acide humide	40
SOL pauvre lourd légèrement acide très humide	40
SOL pauvre lourd très acide humide	40
SOL pauvre lourd très acide très humide	41
SOL pauvre léger à lourd légèrement acide sec	41
SOL pauvre léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	41
SOL pauvre léger à lourd très acide humide	42
SOL pauvre tourbeux très acide humide	42
SOL pauvre tourbeux très acide très humide	43
SOL pauvre tourbeux très acide sec à très humide	44
SOL plus ou moins riche caillouteux légèrement alcalin sec	44
SOL plus ou moins riche caillouteux neutre sec	47
SOL plus ou moins riche caillouteux neutre frais et bien drainé	49
SOL plus ou moins riche caillouteux neutre sec à très humide	51

SOL plus ou moins riche caillouteux légèrement acide frais et bien drainé	51
SOL plus ou moins riche caillouteux acide à alcalin sec	52
SOL plus ou moins riche léger très alcalin sec	54
SOL plus ou moins riche léger légèrement alcalin sec	55
SOL plus ou moins riche léger légèrement alcalin frais et bien drainé	58
SOL plus ou moins riche léger légèrement alcalin humide	63
SOL plus ou moins riche léger neutre sec	63
SOL plus ou moins riche léger neutre frais et bien drainé	66
SOL plus ou moins riche léger légèrement acide sec	66
SOL plus ou moins riche léger légèrement acide frais et bien drainé	67
SOL plus ou moins riche léger légèrement acide humide	69
SOL plus ou moins riche meuble légèrement alcalin sec	70
SOL plus ou moins riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	71
SOL plus ou moins riche meuble neutre frais et bien drainé	83
SOL plus ou moins riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	92
SOL plus ou moins riche meuble légèrement acide humide	112
SOL plus ou moins riche meuble très acide frais et bien drainé	113
SOL plus ou moins riche meuble très acide sec à très humide	113
SOL plus ou moins riche meuble acide à alcalin frais et bien drainé	113
SOL plus ou moins riche meuble acide à alcalin humide	115
SOL plus ou moins riche lourd très alcalin frais et bien drainé	115

SOL	plus ou moins riche lourd légèrement alcalin sec	115
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	116
SOL	plus ou moins riche lourd neutre humide	117
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement acide humide	117
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement acide très humide	118
SOL	plus ou moins riche lourd très acide frais et bien drainé	118
SOL	plus ou moins riche lourd très acide très humide	119
SOL	plus ou moins riche lourd acide à alcalin humide	119
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement alcalin sec	120
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	120
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre sec ..	123
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	123
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre humide	127
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement acide humide	131
SOL	plus ou moins riche tourbeux très acide frais et bien drainé	131
SOL	riche meuble légèrement alcalin sec	133
SOL	riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	134
SOL	riche meuble légèrement alcalin humide	141
SOL	riche meuble légèrement alcalin très humide ..	142
SOL	riche meuble neutre sec	142
SOL	riche meuble neutre frais et bien drainé	143
SOL	riche meuble neutre humide	163
SOL	riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	165
SOL	riche meuble légèrement acide humide	171
SOL	riche meuble légèrement acide très humide ..	174
SOL	riche meuble très acide frais et bien drainé ..	175
SOL	riche meuble acide à alcalin frais et bien drainé	176
SOL	riche lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	176
SOL	riche lourd légèrement acide humide	176
SOL	riche lourd acide à alcalin très humide	177
SOL	riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	177
SOL	riche léger à lourd légèrement alcalin humide	181

SOL	riche léger à lourd neutre frais et bien drainé.	181
SOL	riche léger à lourd neutre humide	182
SOL	riche léger à lourd neutre sec à très humide ..	182
SOL	riche léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	183
SOL	riche léger à lourd légèrement acide humide ..	186
SOL	riche léger à lourd légèrement acide sec à très humide	189
SOL	riche léger à lourd très acide frais et bien drainé	189
SOL	riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	189
SOL	riche léger à lourd acide à alcalin humide ...	190
SOL	riche tourbeux très acide frais et bien drainé ..	191
SOL	riche tourbeux très acide très humide	193
SOL	pauvre à riche caillouteux acide à alcalin sec	193
SOL	pauvre à riche léger légèrement alcalin sec ..	193
SOL	pauvre à riche léger légèrement acide sec à très humide	195
SOL	pauvre à riche léger très acide humide	195
SOL	pauvre à riche léger acide à alcalin frais et bien drainé	195
SOL	pauvre à riche meuble légèrement alcalin très humide	196
SOL	pauvre à riche meuble légèrement acide humide	197
SOL	pauvre à riche meuble acide à alcalin frais et bien drainé	197
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	197
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement alcalin humide	198
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement alcalin sec à très humide	199
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	199
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre humide ..	200
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	200
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide humide	202
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide très humide	202
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide sec à très humide	203
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	203
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin humide	210

SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin très humide	214
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	215

OMBRE LÉGÈRE

SOL	pauvre caillouteux légèrement alcalin sec	215
SOL	pauvre caillouteux légèrement acide sec	216
SOL	pauvre léger neutre frais et bien drainé	216
SOL	pauvre léger très acide frais et bien drainé ..	217
SOL	pauvre meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	218
SOL	pauvre meuble légèrement acide frais et bien drainé	220
SOL	pauvre lourd très acide très humide	220
SOL	pauvre léger à lourd très acide humide	221
SOL	pauvre tourbeux très acide très humide	221
SOL	plus ou moins riche caillouteux légèrement alcalin sec	221
SOL	plus ou moins riche caillouteux neutre sec à très humide	222
SOL	plus ou moins riche caillouteux légèrement acide frais et bien drainé	222
SOL	plus ou moins riche caillouteux acide à alcalin sec	223
SOL	plus ou moins riche léger très alcalin sec	223
SOL	plus ou moins riche léger légèrement alcalin sec	224
SOL	plus ou moins riche léger légèrement alcalin frais et bien drainé	225
SOL	plus ou moins riche léger légèrement alcalin humide	226
SOL	plus ou moins riche léger légèrement acide sec	227
SOL	plus ou moins riche léger légèrement acide frais et bien drainé	227
SOL	plus ou moins riche léger très acide frais et bien drainé	228
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement alcalin sec	228
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	229
SOL	plus ou moins riche meuble neutre frais et bien drainé	238
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	242
SOL	plus ou moins riche meuble acide à alcalin humide	250
SOL	plus ou moins riche lourd très alcalin frais et bien drainé	251

SOL	plus ou moins riche lourd légèrement alcalin sec	251
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	252
SOL	plus ou moins riche lourd neutre humide	253
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement acide très humide	253
SOL	plus ou moins riche lourd très acide frais et bien drainé	254
SOL	plus ou moins riche lourd très acide très humide	254
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement alcalin sec	255
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	255
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre sec	257
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	257
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre humide	259
SOL	plus ou moins riche tourbeux très acide frais et bien drainé	264
SOL	riche meuble légèrement alcalin sec	268
SOL	riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	268
SOL	riche meuble légèrement alcalin humide	270
SOL	riche meuble neutre frais et bien drainé	271
SOL	riche meuble neutre humide	282
SOL	riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	284
SOL	riche meuble légèrement acide humide	287
SOL	riche meuble légèrement acide très humide ..	288
SOL	riche lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	290
SOL	riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	290
SOL	riche léger à lourd neutre frais et bien drainé ..	292
SOL	riche léger à lourd neutre humide	293
SOL	riche léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	293
SOL	riche léger à lourd légèrement acide humide ..	294
SOL	riche léger à lourd très acide frais et bien drainé	297
SOL	riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	298
SOL	riche tourbeux très acide frais et bien drainé ..	298
SOL	riche tourbeux très acide humide	299

SOL	pauvre à riche meuble légèrement alcalin très humide	300
SOL	 pauvre à riche meuble légèrement acide humide	301
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	301
SOL	 pauvre à riche léger à lourd légèrement acide humide	302
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement acide très humide	302
SOL	 pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	303
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin humide	306
SOL	 pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	306

MI-OMBRE

SOL	pauvre caillouteux légèrement alcalin sec	307
SOL	 pauvre caillouteux légèrement acide sec	307
SOL	pauvre léger très acide sec	307
SOL	 pauvre meuble légèrement acide frais et bien drainé	307
SOL	pauvre lourd légèrement acide humide	308
SOL	 pauvre tourbeux très acide frais et bien drainé	308
SOL	pauvre tourbeux très acide humide	309
SOL	 pauvre tourbeux très acide très humide	309
SOL	pauvre tourbeux très acide sec à très humide	310
SOL	 plus ou moins riche caillouteux très acide frais et bien drainé	310
SOL	plus ou moins riche léger légèrement alcalin frais et bien drainé	311
SOL	 plus ou moins riche léger neutre sec	312
SOL	plus ou moins riche léger neutre frais et bien drainé	313
SOL	 plus ou moins riche léger légèrement acide frais et bien drainé	314
SOL	plus ou moins riche léger très acide frais et bien drainé	315
SOL	 plus ou moins riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	315
SOL	plus ou moins riche meuble neutre frais et bien drainé	317
SOL	 plus ou moins riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	318
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide humide	320
SOL	 plus ou moins riche meuble très acide frais et bien drainé	321
SOL	plus ou moins riche meuble très acide	

	sec à très humide	321
SOL	 plus ou moins riche lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	321
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement acide humide	322
SOL	 plus ou moins riche lourd acide à alcalin humide	322
SOL	plus ou moins riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	323
SOL	 plus ou moins riche léger à lourd neutre humide	323
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement acide humide	324
SOL	 plus ou moins riche tourbeux très acide frais et bien drainé	324
SOL	riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	330
SOL	 riche meuble légèrement alcalin humide	332
SOL	riche meuble neutre sec	333
SOL	 riche meuble neutre frais et bien drainé	334
SOL	riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	338
SOL	 riche meuble légèrement acide humide	342
SOL	riche meuble légèrement acide très humide	343
SOL	riche meuble très acide frais et bien drainé	343
SOL	 riche meuble très acide humide	344
SOL	riche lourd légèrement acide humide	345
SOL	 riche léger à lourd légèrement alcalin frais et bien drainé	345
SOL	riche léger à lourd légèrement alcalin humide	346
SOL	 riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	346
SOL	riche léger à lourd neutre sec à très humide	347
SOL	 riche léger à lourd légèrement acide humide	348
SOL	riche léger à lourd acide à alcalin humide	348
SOL	 riche tourbeux très acide frais et bien drainé	348
SOL	riche tourbeux très acide humide	351
SOL	 pauvre à riche meuble légèrement acide humide	353
SOL	pauvre à riche léger à lourd légèrement alcalin sec	353
SOL	 pauvre à riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	353
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre humide	354
SOL	 pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	354
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin humide	355
SOL	 pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	357

OMBRE

SOL	pauvre tourbeux très acide frais et bien drainé	358
SOL	plus ou moins riche meuble neutre frais et bien drainé	358
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	358
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide humide	359
SOL	riche meuble neutre frais et bien drainé	359
SOL	riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	359
SOL	riche meuble légèrement acide humide	360
SOL	riche tourbeux très acide humide	360

INDIFFÉRENTE

SOL	pauvre léger légèrement acide sec	360
SOL	pauvre léger légèrement acide frais et bien drainé	360
SOL	pauvre léger très acide sec	361
SOL	pauvre meuble légèrement alcalin humide	361
SOL	pauvre léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	362
SOL	pauvre tourbeux légèrement acide humide	362
SOL	pauvre tourbeux très acide très humide	362
SOL	plus ou moins riche léger légèrement alcalin frais et bien drainé	362
SOL	plus ou moins riche léger neutre frais et bien drainé	363
SOL	plus ou moins riche léger légèrement acide frais et bien drainé	363
SOL	plus ou moins riche léger très acide frais et bien drainé	364
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	364
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	364
SOL	plus ou moins riche meuble légèrement acide humide	366

SOL	plus ou moins riche meuble très acide frais et bien drainé	366
SOL	plus ou moins riche lourd légèrement acide très humide	367
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement alcalin sec	367
SOL	plus ou moins riche léger à lourd légèrement acide humide	367
SOL	riche meuble légèrement alcalin sec	368
SOL	riche meuble légèrement alcalin frais et bien drainé	369
SOL	riche meuble neutre frais et bien drainé	369
SOL	riche meuble neutre humide	371
SOL	riche meuble légèrement acide frais et bien drainé	371
SOL	riche meuble légèrement acide humide	374
SOL	riche meuble très acide humide	374
SOL	riche lourd acide à alcalin humide	375
SOL	riche léger à lourd légèrement alcalin sec	375
SOL	riche léger à lourd légèrement acide frais et bien drainé	375
SOL	riche tourbeux très acide frais et bien drainé	376
SOL	pauvre à riche léger légèrement alcalin sec	376
SOL	pauvre à riche léger neutre frais et bien drainé	377
SOL	pauvre à riche lourd légèrement acide humide	377
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre sec	377
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre frais et bien drainé	378
SOL	pauvre à riche léger à lourd neutre humide	378
SOL	pauvre à riche léger à lourd très acide très humide	379
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin frais et bien drainé	379
SOL	pauvre à riche léger à lourd acide à alcalin sec à très humide	380

Comment utiliser ce livre

Les niches écologiques des arbres, arbustes et conifères est un complément indispensable au livre de Michel Renaud *Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes*, chez le même éditeur. Si vous n'avez pas lu ce dernier, il vous sera difficile d'utiliser adéquatement les informations contenues dans le présent ouvrage.

Dans le livre de Michel Renaud, vous découvrirez comment comprendre ce qu'est l'écologie appliquée au jardin, comment développer un langage écologique et identifier les habitudes gagnantes de la Terre. De plus, cette publication vous permettra d'analyser et de comprendre les sols, d'établir ce qu'est un biotope et d'apprendre à définir ce qu'est une communauté en termes de jardinage. En fait, l'auteur vous expliquera comment planifier un jardin paysager par écosystèmes, comment en faire le design, comment en sélectionner les plantes et finalement comment le réaliser.

Pour regrouper les plantes par niches écologiques au jardin, il fallait, bien sûr, établir la niche écologique de chaque plante. C'est ce que fait ce livre, tout comme *Les niches écologiques des vivaces et plantes herbacées*, chez le même éditeur.

Comme vous le savez déjà, puisque vous avez lu le livre de Michel Renaud, il existe une distinction fondamentale entre un habitat, ou biotope, et une niche écologique.

Dans un habitat, les facteurs physiques et chimiques restent généralement constants ou subissent des variations périodiques prévisibles, notamment au cours des saisons. Les cinq critères suivants ont été retenus comme principaux éléments définissant un habitat au jardin. Ce sont :

- la luminosité ;
- la richesse du sol ;
- la texture du sol ;
- le pH du sol ;
- l'humidité du sol.

Pour ce qui est de la niche écologique, celle-ci regroupe des plantes par habitat, tout en leur donnant un rôle esthétique et écologique. Le rôle esthétique, c'est celui que le jardinier préfère, car c'est souvent pour ses attributs physiques, mais aussi pour les rôles qu'elle joue au jardin, qu'un jardinier choisit une plante. En plus d'être une purificatrice d'air et de pollution, une plante peut avoir d'autres rôles écologiques, certains positifs comme nourrir les oiseaux, les abriter, nourrir les papillons ou les colibris, mais aussi négatifs quand le pollen est allergène ou que les fruits, par exemple, sont toxiques pour les êtres humains. En fait, si, dans la nature, les plantes ont surtout un rôle écologique, ce qui fait la différence au jardin, c'est leur rôle esthétique.

Cinq critères pour décrire l'habitat

L'exposition, le type de sol, sa richesse ou sa pauvreté, son pH et son niveau d'humidité, bref l'habitat, ou biotope, où vit généralement une plante, est un élément déterminant pour sa bonne croissance. Il est donc important de bien le déterminer au tout début.

Cependant, comme la nature regorge d'une grande quantité d'habitats et qu'il est impossible de les recréer à l'identique dans un jardin, il est important de comprendre dès le départ que les données contenues dans ce livre doivent être nuancées.

De plus, dans un jardin comme dans la nature, les éléments sont en perpétuelle évolution. En mai, une plante peut recevoir sept heures de soleil alors qu'en juin, elle en recevra dix. C'est quand même une plante de plein soleil. Il en va de même pour le sol. Entre un sol lourd et un sol meuble, il existe toute une gamme de sols. On plantera une plante de sol lourd dans un sol qui a tendance à être plus lourd que meuble, et on plantera une plante de sol meuble dans un sol qui aura tendance à être plus meuble que lourd. Toutes les indications quant aux exigences culturelles de la plante doivent donc être prises comme des préférences et non comme des obligations rigides. En fait, un genévrier sabbine (*Juniperus sabina*), qui pousse au plein soleil dans un sol pauvre, caillouteux, légèrement alcalin et sec, pourrait facilement être planté avec un yucca filamenteux (*Yucca filamentosa*) qui pousse au plein soleil dans un sol pauvre, caillouteux et sec, mais dont le pH est neutre.

Un cas particulier

Certaines plantes poussent aussi bien au plein soleil qu'à la mi-ombre. C'est dire qu'elles poussent aussi très bien à l'ombre légère. Toutefois, pour alléger le texte, de telles plantes ne sont pas répertoriées dans la catégorie plantes d'ombre légère. Donc, si on sélectionne une plante de mi-ombre et qu'elle figure aussi dans la catégorie soleil, ou vice versa, elle peut forcément être plantée à l'ombre légère.

Des conditions qui évoluent

Il est important de se rappeler que dans un jardin, les zones de lumière peuvent varier dans le temps. Ainsi, l'ensoleillement d'une plate-bande est différent quand le jardin est jeune et que les arbres ne sont pas développés, et quatre ou cinq ans plus tard. À l'opposé, un jardin peut être très ombragé, mais une tempête peut détruire les arbres et le jardin devient alors un jardin de lumière. Si dans ces cas, il est facile de transplanter les vivaces, c'est plus difficile de le faire avec les arbustes ou les conifères. La solution réside souvent dans l'élagage ou, à l'opposé, dans la plantation d'un arbre de gros calibre en remplacement de celui qui a été enlevé.

Au soleil ou à l'ombre ?

Le premier critère choisi est la quantité de lumière que la plante reçoit, et cela, pour deux raisons.

La première, c'est que dans une très vaste majorité de cas, c'est un élément qu'il est très difficile de modifier. Même si on plante un arbre pour diminuer la quantité de lumière sur une section du jardin, cette action mettra plusieurs années à prendre effet. À l'opposé, s'il est toujours possible d'élaguer un arbre, il est inconcevable de déplacer un bâtiment pour créer des zones de lumière.

La deuxième raison tient au fait qu'une même plante peut être placée sous différentes luminosités. Dans ce livre, on trouve donc une même plante à différents endroits, mais toujours dans le même type de sol, quelle que soit la quantité de lumière reçue.

Pour chaque type de lumière, les définitions sont les suivantes :

- **plante de soleil** : plante demandant plus de huit heures de soleil durant la période la plus chaude de la journée ;
- **plante d'ombre légère** : plante supportant l'ombre claire des arbres ou d'une construction, mais recevant du soleil pendant une bonne partie de la journée ;
- **plante de mi-ombre** : plante située en lisière des arbres ou à l'ombre d'une construction durant les heures les plus chaudes de la journée. Elle reçoit un minimum de quatre heures de soleil par jour ;
- **plante d'ombre** : plante poussant à l'ombre des constructions ou des arbres, mais avec un minimum de luminosité ou recevant au moins deux heures de soleil par jour ;
- **plante indifférente** : plante indifférente à la quantité de lumière reçue. Elle pousse quel que soit le type de luminosité, à l'exception de l'ombre dense. On la dit aussi de toutes expositions.

En sol pauvre ou en sol riche ?

Pour chaque qualité nutritive de sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol pauvre** : plante poussant dans un sol comportant naturellement peu d'éléments nutritifs assimilables ;

- **plante de sol plus ou moins riche** : plante poussant dans un sol comportant naturellement plus ou moins d'éléments nutritifs assimilables ;
- **plante de sol riche** : plante poussant dans un sol comportant naturellement beaucoup d'éléments nutritifs assimilables ;
- **plante de sol pauvre à riche** : plante poussant indifféremment dans un sol comportant naturellement beaucoup ou peu d'éléments nutritifs assimilables.

Bien sûr, il existe toute une gamme de sols entre ces grandes définitions. Suivant le type de sol que l'on observe sur son terrain, on sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus proches de celles observées.

En sol léger ou en sol lourd ?

Pour chaque type de sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol caillouteux** : plante poussant dans un sol composé principalement de pierres, de graviers, mais aussi, en plus petite proportion, de sable ;
- **plante de sol léger** : plante poussant dans un sol composé principalement de sable et de petites particules non liées ;
- **plante de sol meuble** : plante poussant dans un sol de type limoneux, bien pourvu en matière organique, comme une terre à jardin ;
- **plante de sol lourd** : plante poussant dans un sol de type argileux. Les particules sont très liées entre elles ;
- **plante de sol tourbeux** : plante poussant dans un sol composé principalement de tourbe de sphaigne ;
- **plante de sol léger à lourd** : plante poussant dans un sol léger, meuble ou lourd.

Un sol au pH acide ou alcalin ?

Le pH (pour potentiel Hydrogène) est un indice qui indique le niveau d'acidité ou d'alcalinité du sol. Il est exprimé sur une échelle de 1 à 14. Une valeur de 1 indique une solution très acide, la valeur 7 exprime la neutralité et une solution d'une valeur de 14 indique un haut taux d'alcalinité, aussi appelé basicité.

Pour chaque type de pH, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol très alcalin** : plante poussant dans un sol ayant un pH de plus de 8,5 ;

Une idée reçue

Contrairement à ce que bien des jardiniers pensent, les plantes n'aiment pas toutes croître dans un sol riche. Il en existe même un bon nombre qui préfèrent un sol pauvre.

Pour définir son type de sol

Sur la manière de définir un sol, consultez le chapitre « Identifiez vos biotopes » dans Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes.

Certaines aiment les sols secs

Tout comme pour la richesse du sol, il est faux de croire que toutes les plantes aiment les sols bien arrosés. Certains végétaux poussent même très mal quand le sol n'est pas sec.

- **plante de sol légèrement alcalin** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 7,5 à 8,5 ;
- **plante de sol neutre** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 6,5 à 7,5 ;
- **plante de sol légèrement acide** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 5,5 à 6,5 ;
- **plante de sol très acide** : plante poussant dans un sol ayant un pH de moins de 5,5 ;
- **plante de sol acide à alcalin** : plante qui pousse indifféremment dans un sol acide ou alcalin.

Il faut savoir que les plantes de sol acide, comme les azalées et les rhododendrons, sont très sensibles au niveau du pH du sol où elles sont installées. Le plus souvent on n'a pas d'autres choix que de modifier le pH d'un sol pour pouvoir les cultiver.

Une terre sèche ou une terre humide ?

Pour chaque type d'humidité du sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol sec** : plante poussant dans un sol où l'humidité est peu perceptible, voire inexistante, durant la presque totalité de la belle saison ;
- **plante de sol frais, bien drainé** : plante poussant dans un sol où l'humidité est un peu perceptible, parfois totalement absente et parfois présente en surplus, mais jamais sur de très longues périodes. Ces plantes peuvent aussi supporter des sécheresses passagères. On peut aussi parler de sol moyennement humide ;
- **plante de sol humide** : plante poussant dans un sol où l'humidité est perceptible la majorité du temps durant la belle saison ;
- **plante de sol très humide** : plante poussant dans un sol constamment humide ;
- **plante de sol sec à très humide** : plante qui pousse indifféremment dans un sol sec ou humide.

Ces définitions s'entendent bien sûr pour la période hors gel, certains sols pouvant être généralement secs en été, mais très humides lors de la période de dégel.

De l'habitat à la niche écologique

Pour une plante, lorsque l'on énumère ses conditions de vie (soleil, sol, humidité, etc.), on parle de son habitat, de son biotope. Quand on veut spécifier son aspect écologique, on doit préciser la relation de la plante avec son milieu. C'est la raison pour laquelle on présente dans ce livre plusieurs éléments de la niche écologique de chaque plante.

Le rôle écologique tient à la fois du rôle purement écologique, mais aussi du rôle esthétique pour le jardinier.

Les types de plantes

Pour chaque habitat, on fait la distinction entre les différents types de plantes. Cela est bien sûr important, car chaque catégorie de plantes joue un rôle esthétique différent dans un jardin. Bien que les définitions soient nombreuses, en voici une pour chaque type de plantes :

- **arbre** : plante ligneuse, le plus souvent à feuilles caduques, qui développe généralement un tronc (parfois deux ou trois) et qui est surmontée d'une cime. Sa hauteur à maturité est de plus de sept mètres.
- **arbuste** : plante ligneuse, à feuilles caduques ou persistantes, qui développe plusieurs tiges partant de la base. Sa hauteur à maturité est de moins de sept mètres.

Il arrive parfois que les arbustes soient taillés de manière à former une petite tige d'où part une cime. On indique alors qu'ils sont cultivés sous forme de petit arbre.

- **conifère** : plante ligneuse, à écaillles ou à aiguilles persistantes, qui développe un tronc unique ou plusieurs tiges partant de la base. Sa hauteur à maturité est variable.

Il arrive parfois que certains conifères bas ou rampants soient taillés de manière à former une petite tige d'où part une cime. On indique alors qu'ils sont cultivés sous forme de petit arbre.

- **plante grimpante** : plante ligneuse, à feuilles caduques, qui développe plusieurs tiges partant de la base qui « grimpent » sur des structures ou sur d'autres plantes. Sa hauteur à maturité est variable.
- **rosier** : plante ligneuse, à feuilles caduques, très semblable à un arbuste et, dans certains cas, à une plante grimpante, qui développe plusieurs tiges partant de la base. Sa hauteur à maturité est variable.

Un jardin structuré

Il est fondamental de connaître le type de plantes que l'on utilise, notamment quand il s'agit de plantes ligneuses, puisque celles-ci constituent l'ossature du jardin.

ARBUSTES CULTIVÉS SUR OU EN TIGE

<i>Acer ginnala</i>	<i>Halimodendron halodendron</i>	<i>Syringa</i> x 'Josée'
<i>Acer negundo</i> 'Kelly's Gold'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'	<i>Syringa</i> x <i>laciniata</i>
<i>Acer pensylvanicum</i>	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Kyushu'	<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'
<i>Amelanchier canadensis</i>	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Diamond'	<i>Syringa meyeri</i> 'Snowstorm'
<i>Amelanchier canadensis</i> 'Ballerina'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Unique'	<i>Syringa</i> x 'Tinkerbelle'
<i>Amelanchier laevis</i>	<i>Malus sargentii</i>	<i>Syringa microphylla</i> 'Superba'
<i>Betula pendula</i> 'Trost's Dwarf'	<i>Malus sargentii</i> 'Tina'	<i>Syringa patula</i> 'Miss Kim'
<i>Caragana arborescens</i> 'Lorbergii'	<i>Morus latifolia</i> 'Spirata'	<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Donald Wyman'
<i>Caragana arborescens</i> 'Spring Gold'	<i>Ostrya virginiana</i>	<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Isabella'
<i>Caragana aurantiaca</i>	<i>Philadelphus</i> x 'Virginal'	<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Minuet'
<i>Caragana frutex</i> 'Globosa'	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'	<i>Syringa reticulata</i>
<i>Caragana roborovsky</i>	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Jackman'	<i>Syringa reticulata</i> 'Golden Eclipse'
<i>Caragana rosea</i>	<i>Prunus cerasifera</i> 'Hessei'	<i>Syringa</i> x 'Charles Joly'
<i>Caragana tragacanthoides</i>	<i>Prunus cerasifera</i> 'Newport'	<i>Syringa</i> x 'Dappled Dawn'
<i>Carpinus caroliniana</i>	<i>Prunus</i> x <i>cistena</i>	<i>Syringa</i> x 'Katherine Havemeyer'
<i>Cercis canadensis</i>	<i>Prunus triloba</i> 'Multiplex'	<i>Syringa</i> x 'Michel Buchner'
<i>Cornus alba</i> 'Elegantissima'	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	<i>Syringa</i> x 'Madame Lemoine'
<i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata'	<i>Salix arenaria</i>	<i>Syringa</i> x 'President Grevy'
<i>Cornus racemosa</i>	<i>Salix cinerea</i> 'Tricolor'	<i>Syringa</i> x 'Sensation'
<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	<i>Salix</i> x <i>erythroflexuosa</i>	<i>Syringa</i> x 'Souvenir de Ludwig Spaeth'
<i>Cotoneaster apiculatus</i>	<i>Salix geyeriana</i>	<i>Viburnum</i> x <i>carlcephalum</i>
<i>Crataegus viridis</i> 'Winter King'	<i>Salix gracilistyla</i> 'Melanostachys'	<i>Viburnum lentago</i>
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Salix integra</i> 'Hakuro Nishiki'	<i>Viburnum sargentii</i> 'Onondaga'
<i>Elaeagnus</i> x 'Quicksilver'	<i>Salix interior</i>	<i>Viburnum trilobum</i>
<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	<i>Salix hookeriana</i> 'Claslop'	<i>Weigela florida</i> 'Variegata'
<i>Euonymus nanus</i> <i>turkestanicus</i>	<i>Salix purpurea</i> 'Gracilis'	<i>Weigela</i> x 'Red Prince'
<i>Forsythia</i> x 'Northern Gold'	<i>Salix purpurea</i> 'Pendula'	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa'		

CONIFÈRES CULTIVÉS SUR OU EN TIGE

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'

Juniperus horizontalis 'Prince of Whales'

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

Juniperus procumbens 'Nana'

Juniperus squamata 'Blue Star'

Larix kaempferi 'Blue Ball'

Larix kaempferi 'Blue Dwarf'

Larix kaempferi 'Diane'

Picea abies 'Formanek'

Picea abies 'Little Gem'

Picea pungens 'Glauca Globosa'

Picea pungens 'Procumbens'

Picea pungens 'Thume'

Pinus mugo pumilio

Pinus sylvestris 'Glauca Nana'

Thuja occidentalis 'Little Giant'

Thuja occidentalis 'Pendula'

Le bon nom de la plante

Une fois la catégorie établie, les plantes sont présentées sous leur nom latin. Dans le but de pouvoir se comprendre partout dans le monde, les horticulteurs ont pris l'habitude d'utiliser ce langage consensuel. Il s'agit en fait d'un nom universel, contrairement au nom commun qui change d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Cette normalisation profite en fait aux amateurs puisque cela leur assure ainsi d'acheter la bonne plante.

Par exemple, le *Cotinus coggygria* est un arbuste de 4,00 m de haut sur autant de large, ayant des feuilles ovales, gris vert, lisses, rouge pourpre à l'automne, aux fleurs jaunes qui portent des pédicelles garnis de poils panachés blancs, vaporeux, qui apparaissent à maturité sur la plante. Sa croissance est rapide. Par contre, le *Cotinus coggygria* 'Young Lady' est un petit arbuste de 1,00 m de haut et 1,20 m de large, avec des feuilles vertes, jaune orangé en automne. Les inflorescences vaporeuses, blanc rosé, apparaissent dès le plus jeune âge. Sa croissance est lente. Ces plantes sont toutes deux des arbres à perruque. Imaginez maintenant les différences importantes entre deux espèces ou entre deux genres ! Il est donc important d'être précis.

Le système utilisé, dit système binaire, a été inventé par Linné au xv^e siècle. Il présente :

- **le genre** : il est écrit avec une majuscule, en caractères gras et en italique. Ex. : *Cotinus* ;
- **l'espèce** : elle est écrite en minuscules, quelle que soit son origine. Elle est aussi écrite en caractères gras et en italique. Ex. : *Cotinus coggygria* ;

Le choix du nom latin

Il n'est pas laissé au hasard. Chez certains genres, la nomenclature changeant régulièrement, on a choisi d'utiliser le nom latin le plus communément employé pour rendre la recherche plus facile.

Marques déposées et cultivars

De plus en plus d'obteneurs de plantes enregistrent leurs nouvelles plantes comme une marque déposée et leur obtiennent un enregistrement. Les règles d'écriture concernant ces fameux enregistrements étant complexes, on les a ignorés et ils ont été traités comme étant des synonymes.

La meilleure stratégie

La zone de rusticité attribuée à une plante n'étant pas toujours une donnée fiable, l'expérience et l'expérimentation sont des approches fortement conseillées. Tenir compte des expériences existantes et s'adresser à un horticulteur local pour confirmer la zone de rusticité d'une plante est donc une très bonne idée.

- **le signe x** : il est écrit en caractère romain et signifie que la plante est un hybride. Ex. : *Diervilla x splendens* ;
- **la variété botanique** : il s'agit d'une modification de l'espèce que l'on observe à l'état spontané dans la nature. Le nom de la variété commence par une minuscule et est écrit en caractères gras et en italique. Ex. : *Euonymus nanus turkestanicus* ;
- **le cultivar** : il s'agit d'une variété horticole, c'est-à-dire une plante dont les caractères ont été modifiés par l'homme. Chaque mot la désignant est écrit en caractère romain, commence par une majuscule et est placé entre guillemets simples. Ex. : *Cotinus coggygia* 'Golden Spirit'.

Il arrive aussi parfois, qu'à côté du nom latin, on en trouve un autre, entre parenthèses. C'est un synonyme. Ex. : *Cotinus coggygia* (Rhus cotinus). Il faut savoir que la botanique est une science en évolution constante et que plusieurs botanistes ont parfois donné différents noms à une même plante. Le synonyme doit permettre de se référer à d'anciens ouvrages le cas échéant.

À côté du nom latin, est indiqué le nom commun français. Là encore, dans un souci de simplification, seul le nom le plus utilisé a été retenu.

On indique aussi si la plante est indigène, c'est-à-dire qu'on la trouve à l'état spontané dans les limites du territoire du Québec.

Rusticité et résistance au froid

Tout de suite après avoir nommé la plante, on indique une information très importante, soit sa faculté à résister au froid, plus communément appelée rusticité.

Au Canada, on a choisi d'établir un système qui divise le territoire en zones. Il y a actuellement neuf zones, la zone 0 étant celle où les températures les plus froides sont atteintes et la zone 8, celle où les températures hivernales les plus clémentes sont observées. Ces zones majeures ont été divisées en sous-zones, a et b. Le climat de la sous-zone a est un peu plus rigoureux que celui de la sous-zone b.

Pour définir ces zones, les climatologues ont compilé plusieurs données :

- les températures hivernales minimales ;
- la durée de la période sans gel ;

- les précipitations en été ;
- les températures maximales en été ;
- l'enneigement ;
- les pluies de janvier ;
- la vitesse maximale du vent.

De plus, ils ont pris en considération l'altitude, cette donnée ayant une influence directe sur les températures et les précipitations.

Reportées sur une carte, les zones de rusticité des plantes indiquent les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance des plantes ligneuses.

Pour connaître la zone de rusticité de l'endroit où l'on jardine, il suffit de consulter la carte publiée par Ressources naturelles Canada présentée à la page 381.

Publiée une première fois au début du xx^e siècle, cette carte a fait l'objet récemment d'une imposante mise à jour. Cela ne change en rien la cote de la plante (zone 3a par exemple). Ce que cela change, c'est que certaines régions sont considérées comme plus chaudes alors que d'autres sont considérées comme plus froides. Toutefois, il faut bien comprendre que selon Ressources naturelles Canada : « L'information présentée sur cette carte indique la rusticité des plantes de façon générale seulement, et sa précision est de plus ou moins deux zones. En effet, des erreurs peuvent se glisser dans les données provenant des stations météorologiques, ainsi que dans les estimations effectuées entre les stations. De plus, la carte peut ne pas refléter les fluctuations du climat d'une année à l'autre, ainsi que les variations locales. En effet, des variations peuvent se produire à l'intérieur d'une zone à cause de certains facteurs locaux comme un changement dans la topographie, des variations dans la couverture neigeuse, des variations climatiques observées d'une année à l'autre, des événements météorologiques exceptionnels et même des techniques de jardinage qui ont un impact significatif sur la survie des plantes à un endroit donné. »

Il faut aussi noter que la carte des zones de rusticité américaine, publiée par l'United States Department of Agriculture, est différente de celle publiée par Ressources naturelles Canada. Généralement, mais ce n'est pas toujours vrai, il y a une différence d'une zone au profit de la classification américaine. La

Rusticité et habitat

Si pendant longtemps, on a pensé que la rusticité était uniquement la capacité de résistance de la plante au froid, il n'en est plus de même aujourd'hui. Par exemple, on a observé qu'une plante de plein soleil, aimant les expositions chaudes, un sol plus ou moins riche, caillouteux, sec, au pH neutre, installée dans une bonne terre à jardin, riche et fraîche, souvent inondée au printemps, a de grandes chances de mourir à la fin de l'hiver. Par contre, quand on la plante dans le bon habitat, elle survit.

Au fil des saisons

Lors de l'aménagement d'un petit jardin ou d'un petit espace, il est bon de sélectionner des plantes qui sont attrayantes à diverses périodes de l'année.

zone 4 aux États-Unis correspond à la zone 5 au Canada et ainsi de suite. De plus, la situation est complexe puisqu'il n'y a pas de sous-zones aux États-Unis.

Hauteurs et largeurs

Après la rusticité, il est indispensable de connaître les bonnes dimensions de la plante.

Par exemple, un cèdre du Canada 'Boisbriand' et un cèdre du Canada fastigié font tous deux partie du genre *Thuja*, mais le *Thuja occidentalis* 'Fastigiata' atteint, à l'âge adulte, 15 mètres de haut et 0,70 mètre de large alors que le *Thuja occidentalis* 'Boisbriand' atteint 1,50 mètre de haut et 0,70 mètre de large. On comprend facilement que le positionnement au jardin, l'utilisation et l'effet procuré sont bien différents.

Il est indispensable de comprendre que les dimensions indiquées dans ce livre n'ont pas de valeur absolue, les conditions climatiques ou de sol pouvant varier d'un jardin à l'autre. Les dimensions sont données pour des plantes poussant dans la grande région de Montréal.

La largeur équivaut aussi à la distance de plantation que l'on devrait respecter, notamment pour éviter d'avoir recours à la taille. Par exemple, pour un arbuste de 3,00 mètres de large, les premières plantes voisines devraient être placées à 1,50 mètre du centre de la plante.

Les attraits de la plante

Une fois qu'on connaît la rusticité et les dimensions d'une plante, il faut s'attarder aux caractéristiques qui la composent. Elles sont nombreuses.

On commence par définir le port. C'est la silhouette, la première impression que l'on a de la plante avec un certain recul. Dans le cas des grimpantes, on décrit le type de tiges : volubiles, sarmenteuses, à ventouses, etc. On spécifie aussi la texture du feuillage, celle-ci pouvant être dense, moyenne ou fine, voire très fine. On décrit ensuite l'écorce, si elle est décorative. Puis on décrit la forme des feuilles, leur couleur en tenant compte des variations dans le temps (couleur de printemps, d'été et d'automne). On indique aussi si le feuillage est aromatique. Les fleurs sont ensuite décrites en indiquant l'époque de floraison, la couleur, la forme et aussi si elles sont parfumées. Finalement, on précise si les fruits sont décoratifs, comestibles ou persistants. S'ils représentent une nuisance, on le note aussi.

Ce sont tous ces critères mis ensemble qui font la spécificité physique de la plante.

Les données physiologiques

Les fonctions et les propriétés de certains organes des plantes ont une influence sur l'écosystème qui entoure les plantes. Il est donc essentiel de bien connaître ces données.

La vitesse de croissance

Pour chaque type de croissance des plantes, les définitions sont les suivantes :

- **plante à croissance très rapide** : la plante a une croissance supérieure à 90 cm par an ;
- **plante à croissance rapide** : la plante a une croissance entre 90 et 60 cm par an ;
- **plante à croissance moyenne** : la plante a une croissance entre 60 et 30 cm par an ;
- **plante à croissance lente** : la plante a une croissance entre 30 et 15 cm par an ;
- **plante à croissance très lente** : la plante a une croissance inférieure à 15 cm par an. Chez certaines plantes miniatures, cette croissance est même parfois inférieure à 10 cm.

Chercher à tout prix à avoir une croissance rapide chez une plante à croissance moyenne ou lente a généralement pour conséquence des désordres d'ordre pathologique. Une accélération de la croissance naturelle se traduit en effet par une augmentation des risques d'attaques d'insectes et de maladies ou par une moindre résistance au froid. Les ajouts d'engrais ou de compost pour stimuler à tout prix la croissance sont donc déconseillés dans la plupart des cas.

Le type d'enracinement

Pour chaque type d'enracinement, les définitions sont les suivantes :

- **plante aux racines superficielles** : ces plantes ont des racines qui s'étalent dans les premiers centimètres du sol. Il arrive souvent que celles-ci soient drageonnantes, c'est-à-dire que de nombreuses nouvelles tiges partent directement du sol et s'étalent de manière concentrique ;

Petite lente et grande vite

Il existe une relation entre la vitesse de croissance et les dimensions de la plante. Il est rare (bien qu'il y ait des exceptions) qu'une plante miniature pousse rapidement et qu'une plante de grande dimension croisse très lentement.

En attendant

Le temps que les plantes ligneuses prennent tout l'espace alloué, on peut utiliser des annuelles, des vivaces de courte vie ou des vivaces qui seront déplacées ou données au fur et à mesure de la croissance des plantes ligneuses.

Attention à la transplantation

Pour ce qui est de déplacer une plante à l'intérieur même du jardin, on aura compris que les plantes de reprise facile ne poseront pas de problèmes alors que celles de reprise difficile demanderont une bonne connaissance de ce genre de pratique.

- **plante aux racines descendantes** : ces plantes ont des racines nombreuses qui descendent plus ou moins profondément dans le sol ;
- **plante aux racines pivotantes** : ces plantes ont quelques racines qui descendent presque verticalement dans le sol.

Il arrive parfois que les racines produisent des rejets qui sont en fait des nouvelles tiges qui apparaissent directement sur les racines. Dans certains cas, ces rejets peuvent devenir envahissants.

Plantations et transplantations

Dans la nature, les plantes ne voyagent pas. La plupart du temps, quand les conditions sont idéales, les semences germent là où le vent, les oiseaux ou la petite faune les ont déposées. Il en va différemment au jardin. Dans cet espace, la plupart des plantes sont rapportées. Certaines subiront très bien ce déplacement alors que d'autres ne l'apprécieront pas du tout. Donc, tous les végétaux n'ont pas le même niveau de réussite quand il s'agit de les planter ou de les transplanter. On peut classer cette opération en trois niveaux de difficulté :

- **transplantation facile** : il n'y a pas besoin d'entourer cette opération de beaucoup de précautions. La plupart de ces plantes peuvent se planter indifféremment du printemps à l'automne ;
- **transplantation moyennement facile** : il faut prendre plusieurs précautions. La première est généralement de leur fournir de l'eau en quantité suffisante. Cela peut aller jusqu'à devoir recouvrir la plante d'une toile de protection pendant quelques jours. Ces plantes peuvent généralement être mises en terre au printemps, hors des périodes de grande chaleur ou à l'automne, une protection hivernale étant généralement nécessaire dans ce dernier cas.
- **transplantation difficile** : il faut entourer ces plantes de beaucoup d'attentions. Il leur faut de l'eau en quantité, des toiles de protection pendant plusieurs jours, mais aussi il sera peut-être nécessaire de tailler, de supprimer les fleurs ou de pratiquer tout geste qui peut aider à la reprise. Dans certaines circonstances, cette bonne reprise prend deux ans, les plantes n'étant belles qu'au printemps suivant. On plante ces végétaux au printemps seulement et on leur fournit une protection hivernale les premières années.

Aujourd'hui, la grande majorité des plantes vendues sur le marché le sont en contenant ou en motte. C'est pourquoi elles peuvent techniquement être plantées de la fin des gelées printanières aux premières gelées d'hiver. Il est toutefois conseillé de restreindre les périodes de plantation en fonction de la facilité de reprise de la plante.

Attraits et limites écologiques

En décrivant les fruits, on a noté s'ils sont comestibles ou pas. On précise aussi s'ils attirent les oiseaux. De plus, on indique les plantes qui attirent les oiseaux, que ce soit pour la nidification ou la protection.

On signale que certaines fleurs attirent les papillons par leur nectar. D'autres, par leur forme et leur nectar, attirent les colibris.

Dans certains cas, on précise si les plantes résistent aux insectes et maladies. Il faut savoir que plusieurs plantes, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, vont toujours être attaquées par des insectes ou des maladies (voir les plantes génétiquement faibles dans Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes, par Michel Renaud chez le même éditeur). Par contre, si on sélectionne bien les plantes en tenant compte des niches écologiques, les risques d'attaques de prédateurs sont moins élevés.

Plusieurs plantes résistent aux chevreuils, plusieurs autres y sont sensibles, on le note. Il faut toutefois savoir que la résistance aux chevreuils peut varier d'une année à l'autre et qu'elle est fonction du niveau de population dans la région. Certains hivers, des plantes réputées résistantes sont mangées, car les chevreuils ont épuisé les autres ressources. Ce phénomène est d'autant plus criant que la population augmente sur un territoire donné. Il peut aussi arriver que ce soit le territoire qui diminue (sous la pression de la construction notamment) augmentant ainsi l'attrait des chevreuils pour les plantes des jardins.

Les feuilles, les fruits, les tiges, etc., de certaines plantes sont toxiques. Il en est fait mention.

Aujourd'hui, les allergies causées par le pollen des plantes sont une préoccupation importante. Quand la plante est allergène, cela est indiqué. Il faut savoir que ce sont les sujets mâles (quand les sexes des plantes sont séparés) qui sont les plus grands générateurs de pollen.

Le revers de la médaille

Plusieurs horticulteurs ont sélectionné des plants mâles, car ceux-ci ne produisaient pas de fruits qui sont considérés comme une nuisance chez certaines plantes. Le revers de la médaille, c'est leur participation aux allergies printanières et estivales.

Les habitats des arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers

SOLEIL

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

CONIFÈRES

Juniperus sabina

GENÉVRIER SABINE

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'Arcadia'**

GENÉVRIER SABINE 'ARCADIA'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert gris clair, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Blue Danube' (J. s. 'Blaua Donau')**

GENÉVRIER SABINE 'BLUE DANUBE'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert gris bleuté, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Buffalo'**

GENÉVRIER SABINE 'BUFFALO'

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 1,80 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'Calgary Carpet' (J. s. 'Monna')**

GENÉVRIER SABINE 'CALGARY CARPET'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Moor-Dense' (J. s. 'Monard')**

GENÉVRIER SABINE 'MOOR-DENSE'

i Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'New Blue' (J. s. 'Tamariscifolia New Blue')**

GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX BLEUES

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleutées, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



***Juniperus sabina* 'Skandia' (J. s. 'Scandia')**

GENÉVRIER SABINE 'SKANDIA'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert sombre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Tamariscifolia' GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX**

2 Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Variegata' GENÉVRIER SABINE PANACHÉ**

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre tachetées de blanc crème, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL

SOL | pauvre | caillouteux | neutre | sec

ARBUSTES

Prunus besseyi

PRUNUS BESSEYI

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpre noir, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Yucca filamentosa

YUCCA FILAMENTEUX

3 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, piquantes, vert bleuté, portant des filaments blancs. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Yucca filamentosa* 'Bright Edge' YUCCA FILAMENTEUX 'BRIGHT EDGE'**

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, piquantes, vert bleuté largement bordées de jaune et de crème, portant des filaments blancs. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Yucca flaccida* 'Golden Sword'** YUCCA 'GOLDEN SWORD'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, piquantes, vert bleuté avec une bande jaune au centre. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Yucca flaccida* 'Ivory Tower'** YUCCA 'IVORY TOWER'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, piquantes, vert bleuté. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Yucca glauca YUCCA BAÏONNETTE

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très étroites, persistantes, piquantes, vert bleuté. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement acide | sec

ARBUSTES

Rhus typhina SUMAC DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, puis rouge et jaune mêlés de pourpre et d'orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge cramoisi, persistants. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, très drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Rhus typhina* 'Laciniata' (R. t. 'Dissecta')**
SUMAC DE VIRGINIE À FEUILLES LACINIÉES

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine. Feuilles très découpées, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, très drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Rhus typhina* 'Tiger Eyes' (R. t. 'Bailtiger')**
SUMAC DE VIRGINIE 'TIGER EYES'

I Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine. Jeunes pousses vert chartreuse. Feuilles aux pétioles rouges, très découpées, jaune d'or en été, puis rouge, orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge vif, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Amorpha canescens AMORPHA BLANCHÂTRE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, lâche. Feuillage de texture fine. Feuilles gris argent, puis gris vert en été. Floraison au début de l'été. Fleurs bleu foncé aux étamines orange. Fruits en gousses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.

Caragana roborovsky

CARAGANA DE ROBOROVSKY

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Feuilles vert argenté. Floraison printanière. Fleurs jaune vif. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port globulaire.]

***Genista pilosa* 'Gold Flash'**

GENÊT PILEUX 'GOLD FLASH'

Zone 4a. H. : 15 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux. Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison printanière. Fleurs jaune d'or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Genista pilosa* 'Vancouver Gold'**

GENÊT PILEUX 'VANCOUVER GOLD'

2 Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux. Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune d'or vif. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | neutre | sec

ARBUSTES

***Spiraea media* 'Sericae'**

SPIRÉE SOYEUSE

3 Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.





SOLEIL

SOL | pauvre | léger | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Betula populifolia

BOULEAU À FEUILLES DE PEUPLIER

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant, jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative, blanche, lisse, tachetée de noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Prunus pensylvanica

CERISIER DE PENNSYLVANIE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert jaunâtre, puis rouge violacé vif en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

ROSIER

***Rosa hybrida* série Explorateur 'Alexander MacKenzie'**

ROSIER 'ALEXANDER MACKENZIE'

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port dressé et vigoureux. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage vert moyen luisant. Fleurs en grappes, doubles, rouge foncé à rouge moyen, parfumées. Floraison continue. Résistant au blanc et à la tache noire. N'attire pas cicadelles et tenthredes.

***Rosa hybrida* série Explorateur 'Captain Samuel Holland'**

ROSIER SARMENTEUX 'CAPTAIN SAMUEL HOLLAND'

1 Zone 3b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage vert foncé luisant. Petites fleurs en grappes, doubles, rouge violacé, au parfum très léger. Floraison continue. Résiste au blanc et à la tache noire. Résistant aux insectes.

***Rosa hybrida* série Explorateur 'Charles Albanel'**

ROSIER 'CHARLES ALBANEL'

Zone 2b. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Branches arquées. Tiges plutôt épineuses. Feuillage, vert foncé semi-mat. Grandes fleurs, doubles, rouge moyen à mauve, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant à la tache noire et au blanc.

***Rosa hybrida* série Explorateur 'David Thompson'**

ROSIER 'DAVID THOMPSON'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port large. Feuillage vert brillant. Fleurs semi-doubles à doubles, rose foncé à rouge clair, parfumées. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'Frontenac'

ROSIER 'FRONTENAC'

Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs réunies en grappes, semi-doubles, rose foncé, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'George Vancouver'

ROSIER 'GEORGE VANCOUVER'

Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port érigé et large. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs abondantes, doubles, rouge foncé à rouge, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance au blanc ou à la tache noire.

Rosa hybrida série Explorateur 'Henry Hudson'

ROSIER 'HENRY HUDSON'

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port compact, très drageonnant. Feuilles gaufrées, vert foncé. Abondantes fleurs, doubles, blanches, étamines jaunes voyantes au centre. Parfum de clou de girofle. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'Jens Munk'

ROSIER 'JENS MUNK'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges érigées très épineuses. Petites feuilles, vert clair, gaufrées. Fleurs en grappes, semi-doubles, roses à étamines jaunes, au parfum épicé. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance à la tache noire et au blanc.

Rosa hybrida série Explorateur 'John Cabot'

ROSIER SARMENTEUX 'JOHN CABOT'

Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Longues tiges, très vigoureuses. Feuillage vert semi-lustré. Fleurs réunies en grappes, doubles, rose foncé, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance à la tache noire et au blanc.

Rosa hybrida série Explorateur 'John Davis'

ROSIER 'JOHN DAVIS'

Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Longues tiges arquées. Feuillage vert, semi-lustré. Fleurs en grappes, doubles, roses, au parfum épicé. Floraison à la fin du printemps. Très bonne résistance au blanc et à la tache noire.

Rosa hybrida série Explorateur 'Lambert Closse'

ROSIER 'LAMBERT CLOSSE'

Zone 4b. H. : 85 cm. L. : 85 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs doubles, roses, rose plus pâle à plein épanouissement. Floraison continue. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'Louis Jolliet'

ROSIER 'LOUIS JOLLIET'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port évasé large. Feuillage vert lustré. Fleurs en grappes, doubles, roses, au parfum épicé. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'Marie-Victorin'

ROSIER 'MARIE-VICTORIN'

2 Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, doubles, pêche à rose pâle, étamines jaunes, décoratives. Floraison continue. Très bonne résistance aux maladies.

SOLEIL
SOL | pauvre | léger | neutre | frais et bien drainé

Rosa hybrida série Explorateur 'Quadra'

ROSIER 'QUADRA'

Zone 3b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port vigoureux. Longues tiges arquées. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, rouge foncé, peu parfumées. Floraison continue. Très bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'Royal Edward' ROSIER 'ROYAL EDWARD'

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port semi-nain. Feuillage vert brillant. Fleurs en grappes, semi-doubles, rose moyen à rose pâle, aux étamines jaunes. Floraison répétée. Bonne résistance au blanc et à la tache noire.

Rosa hybrida série Explorateur 'Simon Fraser' ROSIER 'SIMON FRASER'

Zone 3b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port nain. Tiges peu épineuses. Feuillage vert foncé, semi-lustré. Fleurs en grappes, simples à semi-doubles, roses et aux étamines jaunes, au parfum léger. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur 'William Baffin'

ROSIER SARMENTEUX 'WILLIAM BAFFIN'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Longues tiges, très érigées. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes, semi-doubles rouge moyen, étamines jaunes décoratives, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Très résistant à la tache noire et au blanc.

Rosa hybrida série Explorateur 'William Booth'

ROSIER 'WILLIAM BOOTH'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port lâche. Feuillage vert foncé, teinté de pourpre. Fleurs en grappes, simples ou semi-doubles, rouge foncé à rouge moyen. Floraison continue. Très bonne résistance aux maladies.

SOLEIL
SOL | pauvre | léger | neutre | humide

ARBUSTES

Spiraea alba

SPIRÉE BLANCHE D'AMÉRIQUE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea latifolia

SPIRÉE À FEUILLES LARGES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, bleu gris dessous. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



SOLEIL

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | sec

ARBUSTES

Genista tinctoria

GENÊT DES TEINTURIERS

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Genista tinctoria* 'Royal Gold'**

GENÊT DES TEINTURIERS 'ROYAL GOLD'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune d'or. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

CONIFÈRES

Pinus resinosa

PIN ROUGE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé luisant, odorantes. Fruits en cônes bruns. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus resinosa* 'Don Smith'**

PIN ROUGE 'DON SMITH'

2 Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus, compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair luisant, odorantes. Fruits en cônes pourpres, puis bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus resinosa* 'Morel'**

PIN ROUGE 'MOREL'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle, odorantes. Fruits en cônes bruns. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus rigida* 'Sand Beach'**

PITCHPIN DU NORD 'SAND BEACH'

Zone 5a. H. : 4,50 m. L. : 2,00 m. Port semi-étalé. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.



SOLEIL

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Betula pendula (*B. verrucosa*; *B. alba*)

BOULEAU EUROPÉEN

Zone 2b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port oblong, étroit. Branches érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé luisant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions de sol.

Betula pendula 'Crimson Frost' BOULEAU EUROPÉEN 'CRIMSON FROST'

Zone 2b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port oblong, étroit. Branches érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture fines. Feuilles rouges luisantes, devenant pourpre foncé, puis rouge vin et orangé en automne. Écorce décorative blanc argenté. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance aux insectes. Plante sensible aux conditions de sol.

Betula pendula 'Gracilis' (*B. p.* 'Laciniata') BOULEAU EUROPÉEN À FEUILLES LACINIÉES

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port arrondi irrégulier, semi-pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions de sol.

Betula pendula 'Purpurea' BOULEAU EUROPÉEN À FEUILLES POURPRES

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles pourpre foncé, puis vert bronze en été et rougissantes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions de sol.

Betula pendula 'Royal Frost' BOULEAU EUROPÉEN 'ROYAL FROST'

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge vin au printemps et en été, bronze en automne. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Assez bonne résistance aux insectes.

Betula pendula 'Youngii' BOULEAU EUROPÉEN PLEUREUR

1 Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 9,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions de sol.

Betula platyphylla japonica BOULEAU DU JAPON

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles rougeâtres au débourrement, puis vertes et jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanche et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).

Betula platyphylla japonica 'Whitespire'
BOULEAU DU JAPON 'WHITESPIRE'

Zone 5b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port plutôt pyramidal. Feuillage de texture fine. Feuilles rougeâtres au débournement, puis vertes et finalement jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanche et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Betula pendula 'Trost's Dwarf' BOULEAU NAIN À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, jaunes en automne. Écorce décorative verte. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier.]

CONIFÈRES

Picea sitchensis 'Tenas' ÉPINETTE DE SITKA 'TENAS'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | humide

ARBRES

Betula papyrifera BOULEAU À PAPIER

Plante indigène. Zone 2a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative, blanche à maturité. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | très acide | sec

ARBUSTES

Myrica pensylvanica CIRIER DE PENNSYLVANIE

2 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, grisâtres dessous, odorantes. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits grisâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

CONIFÈRES

***Pinus banksiana* (*P. divaricata*)** PIN GRIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert jaunâtre, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus banksiana* 'Manomet'** PIN GRIS 'MANOMET'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire devenant pyramidal, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert émeraude, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Pinus banksiana* 'Schoodic'** PIN GRIS 'SCHOODIC'

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits bruns, résineux. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Calluna vulgaris* 'Alba Erecta'** BRUYÈRE COMMUNE 'ALBA ERRECTA'

1 Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison en été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Allegro'** BRUYÈRE COMMUNE 'ALLEGRO'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison en été. Fleurs rouge foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Boskoop'** BRUYÈRE COMMUNE 'BOSKOOFF'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaunes, puis orange et rouge en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs lavande, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Cuprea'** BRUYÈRE COMMUNE 'CUPREA'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaune d'or en été, cuivre en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs violettes, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Darkness'** BRUYÈRE COMMUNE 'DARKNESS'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge cramoisi, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Firefly'** BRUYÈRE COMMUNE 'FIREFLY'

2 Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaune orangé en été qui tourne au rouge brique en hiver. Floraison à la fin de l'été. Fleurs mauve foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.



***Calluna vulgaris* 'H.E. Beale'**

BRUYÈRE COMMUNE 'H.E. BEALE'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à la fin de l'été. Fleurs doubles, roses, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'J.H. Hamilton'**

BRUYÈRE COMMUNE 'J.H. HAMILTON'

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs doubles, rose saumon, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Marleen'**

BRUYÈRE COMMUNE 'MARLEEN'

3 Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison en automne. Boutons blancs. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Multicolor'**

BRUYÈRE COMMUNE 'MULTICOLOR'

Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes à reflets orange et rouge, cuivre en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Spring Cream'**

BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING CREAM'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Spring Torch'**

BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING TORCH'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses crème. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à l'automne. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Calluna vulgaris* 'Tib'**

BRUYÈRE COMMUNE 'TIB'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison en été. Fleurs doubles, rose foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

ROSIERS

***Rosa nitida* 'Métis'**

ROSIER 'MÉTIS'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port étalé. Tiges presque sans épines. Feuilles vert clair, gaufrées, rougissant à l'automne. Fleurs en grappes, semi-doubles, roses, au parfum modéré. Floraison au milieu du printemps. Très résistant aux maladies.



SOLEIL
SOL | pauvre | léger | acide à alcalin | sec

CONIFÈRES

Pinus aristata

PIN À CÔNES ÉPINEUX

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits en cônes épineux, pourpre noir, puis bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL | pauvre | meuble | très alcalin | sec

ARBUSTES

***Cotinus obovatus* (C. americanus)** ARBRE À PERRUQUE D'AMÉRIQUE

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, puis jaune, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé, inflorescences vaporeuses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL | pauvre | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Physocarpus opulifolius PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Physocarpus opulifolius* 'Diabolo' (P. o. 'Monlo')**
 PHYSOCARPE 'DIABOLO'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port semi-pleureur.]

Physocarpus opulifolius 'Luteus' PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER JAUNES

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles verdâtres, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Physocarpus opulifolius 'Nugget' (*P. o.* 'Golden Nugget')

PHYSOCARPE 'NUGGET'

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune brillant. Feuilles vert chartreuse, jaunâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'

PHYSOCARPE 'SUMMER WINE'

1 Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Physocarpus opulifolius 'Tilden Park'

PHYSOCARPE 'TILDEN PARK'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | pauvre | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

CONIFÈRES

Pinus contorta 'Spaan's Dwarf' PIN TORTUEUX 'SPAAN'S DWARF'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port nain, irrégulier. Aiguilles très serrées sur les branches. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus contorta 'Taylor's Sunburst' PIN TORTUEUX 'TAYLOR'S SUNBURST'

2 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune d'or brillant. Aiguilles jaune pâle, puis vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | pauvre | lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Spiraea salicifolia SPIRÉE À FEUILLES DE SAULE

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



SOLEIL

SOL | pauvre | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Salix caprea

SAULE MARSAULT

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons grisâtres, parfumées. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre | lourd | légèrement acide | très humide

ARBRES

***Salix caprea* 'Pendula' (S. c. 'Weeping Sally')**

SAULE MARSAULT PLEUREUR (FEMELLE)

1 Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons argentés. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plant femelle.

***Salix caprea* 'Pendula' (S. c. 'Kilmarnock')**

SAULE MARSAULT PLEUREUR (MÂLE)

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Plant mâle.

SOLEIL

SOL | pauvre | lourd | très acide | humide

ARBRES

Fraxinus nigra

FRÊNE NOIR

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, brun rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fruits abondants (nuisance). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus nigra 'Fall Gold'

FRÊNE NOIR 'FALL GOLD'

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune vif en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus nigra 'Northern Gem'

FRÊNE NOIR 'NORTHERN GEM'

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port ovale large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, puis jaunes tôt en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Fraxinus nigra 'Northern Treasure' FRÊNE NOIR 'NORTHERN TREASURE'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL**SOL | pauvre | lourd | très acide | très humide****ARBUSTES****Salix arenaria**

SAULE RAMPANT ARGENTÉ

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses gris argent. Feuilles gris argent, au dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur.]

Salix repens

SAULE RAMPANT

2 Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert grisâtre, dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons jaunâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL**SOL | pauvre | léger à lourd | légèrement acide | sec****CONIFÈRES****Pinus virginiana** 'Wates Golden'

PIN DE VIRGINIE 'WATES GOLDEN'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert pâle en été et jaune d'or en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

SOLEIL**SOL | pauvre | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé****ARBRES****Quercus coccinea**

CHÊNE ÉCARLATE

3 Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant, pourpre foncé puis rouge écarlate en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Quercus coccinea 'Splendens' CHÊNE ÉCARLATE 'SPLENDENS'

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant. En automne le feuillage pourpre foncé prend une couleur rouge écarlate riche et constante. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEI

SOL | pauvre | léger à lourd | très acide | humide

ARBUSTES

Aronia melanocarpa (*A. nigra*) ARONIE NOIRE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' ARONIE NOIRE 'AUTUMN MAGIC'

I Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noir brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty' (*A. m.* 'Morton')

ARONIE NOIRE 'IROQUOIS BEAUTY'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Aronia melanocarpa 'Viking' ARONIE NOIRE 'VIKING'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches parfumées. Gros fruits noirs et brillants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | humide

ARBUSTES

Myrica gale MYRTE DES MARAIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses brun foncé. Feuilles vert foncé lustré, odorantes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits jaunâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Vaccinium myrtilloides (*V. canadense*)

BLEUET

Plante indigène. Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port bas, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, plus clair en dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc verdâtre. Fruits en baies bleues puis noires, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | très humide

ARBUSTES

Andromeda glaucophylla

ANDROMÈDE GLAUQUE

2

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleutées, grises dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc à rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Andromeda polifolia

ANDROMÈDE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Andromeda polifolia* 'Blue Ice'**

ANDROMÈDE 'BLUE ICE'

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleu argenté, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Andromeda polifolia* 'Nana'**

ANDROMÈDE NAIN

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Betula glandulosa

BOULEAU GLANDULEUX

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Rameaux portant des verrues. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Betula nana

BOULEAU NAIN

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles vert foncé, brillantes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en noix. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.



Ledum groenlandicum (*L. canadense*)

THÉ DU LABRADOR

Plante indigène. Zone 1a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, brunes en dessous, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.

Rhododendron canadense (*Rhodora canadense*)

RHODODENDRON DU CANADA

1 Plante indigène. Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pourpre au cœur blanc, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron canadense alba RHODODENDRON DU CANADA BLANC

Plante indigène. Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Vaccinium macrocarpon CANNEBERGE

Plante indigène. Zone 1a. H. : 30 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies rouges, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | sec à très humide

ARBUSTES

Comptonia peregrina COMPTONIE VOYAGEUSE

2 Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en noix. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Caryopteris x clandonensis 'Arthur Simmonds'
CARYOPTÉRIS 'ARTHUR SIMMONDS'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris argenté, aromatiques. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu poudre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Caryopteris x clandonensis* 'Blue Mist'**

CARYOPTÉRIS 'BLUE MIST'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert argenté, aromatiques. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu poudre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Caryopteris x clandonensis* 'Dark Night'**

CARYOPTÉRIS 'DARK NIGHT'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, argentées dessous. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Caryopteris x clandonensis* 'Kew Blue'**

CARYOPTÉRIS 'KEW BLUE'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, argentées dessous. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Caryopteris x clandonensis* 'Worcester Gold'**

CARYOPTÉRIS 'WORCESTER GOLD'

3 Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Feuilles vert chartreuse, argentées dessous. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu ciel, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Cytisus x kewensis* 'Cyni'**

CYTISE DE KEW 'CYNi'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Cytisus x kewensis* 'Niki'**

CYTISE DE KEW 'NIKi'

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune d'or. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Euonymus nanus

FUSAIN NAIN

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port globulaire. Branches vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, rouge brillant en automne. Fruits rose et rouge. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.

SOLEIL
SOL | plus ou moins riche | caillouteux | légèrement alcalin | sec

Euonymus nanus turkestanicus FUSAIN NAIN DU TURKESTAN

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Branches vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert bleuâtre, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres. Fruits rose et orange. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé.]

Hypericum frondosum (*H. aureum*)
HYPERICUM FRONDOSUM

Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs jaune orange vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Hypericum frondosum 'Sunburst' HYPERICUM FRONDOSUM 'SUNBURST'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Hypericum kalmianum MILLEPERTUIS DE KALM

1 Plante indigène. Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Hypericum kalmianum 'Ames' MILLEPERTUIS DE KALM 'AMES'

Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Tamarix ramosissima (*T. pentandra*)
TAMARIX DE RUSSIE

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert pâle. Floraison estivale. Fleurs roses. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.



***Tamarix ramosissima* 'Pink Cascade'**

TAMARIX DE RUSSIE 'PINK CASCADE'

2 Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert glauque. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Tamarix ramosissima* 'Summer Glow' (T. r. 'Rubra')**

TAMARIX DE RUSSIE 'SUMMER GLOW'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Tiges brun rouge. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert bleuté. Floraison estivale. Boutons pourpres. Fleurs rose pourpre foncé. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

CONIFÈRES

***Juniperus procumbens* 'Nana'**

GENÉVRIER PROSTRÉ NAIN

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale vert bronze. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]

Juniperus virginiana

GENÉVRIER DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Coloration automnale vert pourpre. Fruits bleus. Écorce rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus virginiana* 'Grey Owl'**

GENÉVRIER DE VIRGINIE 'GREY OWL'

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 3,50 m. Port semi-érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles gris bleuté, devenant vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits gris bleu. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Pinus mugo pumilio

PIN DES MONTAGNES RAMPANT

Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port arrondi.]

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | neutre | sec

ARBUSTES

Buddleia alternifolia

BUDDLEIA À FEUILLES ALTERNES

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, bleutées dessous. Floraison estivale. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Buddleia davidii* 'Black Knight'**

ARBRE AUX PAPILLONS 'BLACK KNIGHT'

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Border Beauty' ARBRE AUX PAPILLONS 'BORDER BEAUTY'

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs mauves, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Charming' ARBRE AUX PAPILLONS 'CHARMING'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Longues fleurs, rose lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Empire Blue' ARBRE AUX PAPILLONS 'EMPIRE BLUE'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs bleu foncé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Île de France' ARBRE AUX PAPILLONS 'ÎLE DE FRANCE'

1 Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs violettes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii série 'Nanho' ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, bleues ou pourpres, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Orchid Beauty' ARBRE AUX PAPILLONS 'ORCHID BEAUTY'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs lavande pâle, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Pink Delight' ARBRE AUX PAPILLONS 'PINK DELIGHT'

2 Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'Royal Red' ARBRE AUX PAPILLONS 'ROYAL RED'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs pourpre rougeâtre, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii 'White Ball' ARBRE AUX PAPILLONS 'WHITE BALL'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles argentées, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Buddleia davidii* 'White Profusion'** ARBRE AUX PAPILLONS 'WHITE PROFUSION'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Buddleia* x *weyeriana* 'Honeycomb'**

BUDDLEIA 'HONEYCOMB'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert argenté, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs jaunes avec un œil orange, originales, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

***Juniperus scopulorum* 'Blue Arrow'** GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE ARROW'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Blue Creeper'** (*J. s.* 'Monam')

GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE CREEPER'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu pâle, odorantes. Coloration automnale bleu intense. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Blue Heaven'**

GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE HEAVEN'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Blue Trail'** GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE TRAIL'

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu argenté intense, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Greenspire'**

GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'GREENSPIRE'

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Moffetii' (J. s. 'Moffet Blue')**

GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MOFFETII'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Montana Green'**

GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MONTANA GREEN'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Moonglow'** GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MOONGLOW'

1 Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 50 cm. Port colonnaire, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleu argenté intense, odorantes. Coloration automnale bleu acier. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



***Juniperus scopulorum* 'Skyrocket'** GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'SKYROCKET'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Tabletop' (J. s. 'Table Top Blue')**
GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'TABLETOP'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Tolleson's Blue Weeping'**
GENÉVRIER DES ROCHEUSES PLEUREUR À FEUILLES BLEUES

Zone 4b. H. : 3,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Tolleson's Green Weeping'**
GENÉVRIER DES ROCHEUSES PLEUREUR

2 Zone 4b. H. : 3,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus scopulorum* 'Wichita Blue'**
GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'WICHITA BLUE'

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | neutre | sec à très humide

ARBUSTES

Hypericum prolificum HYPERICUM PROLIFICUM

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, gris bleu dessous. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune brillant à étamines décoratives. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Daphne cneorum DAPHNÉ CANULÉ

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs roses, parfumées. Fruits jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

Daphne cneorum 'Pygmaea Alba' DAPHNÉ CANULÉ 'PYGMAEA ALBA'

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits jaunes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

Daphne cneorum 'Ruby Glow' DAPHNÉ CANULÉ 'RUBY GLOW'

1 Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs rose foncé, parfumées. Fruits jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | acide à alcalin | sec

CONIFÈRES

Juniperus horizontalis GENÉVRIER HORIZONTAL

Plante indigène. Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' GENÉVRIER HORIZONTAL 'BAR HARBOR'

Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles vert gris bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Juniperus horizontalis 'Blue Acres' GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE ACRES'

2 Zone 2a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses bleues. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE CHIP'

Zone 3b. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, plus élevé au centre, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Coloration automnale bleutée, teintée de pourpre. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port pleureur.]

Juniperus horizontalis 'Blue Forest' GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE FOREST'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, tiges érigées. Feuillage de texture moyenne. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Juniperus horizontalis 'Glomerata' GENÉVRIER HORIZONTAL 'GLOMERATA'

Zone 4a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Bout des branches tordu. Feuillage de texture fine. Écailles vert foncé, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.



***Juniperus horizontalis* 'Hughes'** GENÉVRIER HORIZONTAL 'HUGHES'

Zone 3b. H. : 30 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles bleu argenté clair, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Juniperus horizontalis* 'Icee Blue'** (*J. h.* 'Ice Blue'; *J. h.* 'Monber')

GENÉVRIER HORIZONTAL 'ICEE BLUE'

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles bleu argenté intense, odorantes. Coloration automnale pourpre violacé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Juniperus horizontalis* 'Marcellus'** GENÉVRIER HORIZONTAL 'MARCELLUS'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles gris bleuté, odorantes. Coloration automnale gris bleuté à pourpre. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Juniperus horizontalis* 'Plumosa Compacta'** (*J. h.* 'Andorra Compacta')

GENÉVRIER D'ANDORRE

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,30 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles vert gris, odorantes. Coloration automnale argent et pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Juniperus horizontalis* 'Prince of Whales'**

GENÉVRIER HORIZONTAL 'PRINCE OF WHALES'

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale bleu violacé. Fruits bleu pâle. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]

***Juniperus horizontalis* 'Wiltonii'** (*J. h.* 'Blue Rug')

GENÉVRIER HORIZONTAL 'WILTONII'

Zone 2b. H. : 15 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Écailles bleu argenté intense, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | très alcalin | sec

ARBRES

Ailanthus altissima

FAUX VERNIS DU JAPON

Zone 5a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde, étroit. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé dessus, vert bleuté dessous. Floraison estivale. Fleurs blanc verdâtre (odeur désagréable). Fruits rouge vif. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

CONIFÈRES

Juniperus rigida

GENÉVRIER DU TEMPLE

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Rameaux retombants. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

ROSIERS

***Rosa eglanteria* 'Amy Robsart' (*R. rubiginosa* 'Amy Robsart')**

ROSIER 'AMY ROBSART'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Feuillage vert, coloré en automne. Fleurs simples, rose foncé éclairé de blanc au centre, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges décoratifs.

***Rosa gallica* 'Belle de Crécy'**

ROSIER 'BELLE DE CRÉCY'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port semi-vigoureux. Branches peu épineuses. Feuillage vert bleuté. Fleurs en bouquets, doubles, rose cerise avec des reflets violets, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

***Rosa gallica* 'Cardinal de Richelieu'** ROSIER 'CARDINAL DE RICHELIEU'

1 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port bas. Tiges peu épineuses. Feuillage vert avec des traces de marron. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets argentés et un œil plus clair au centre, très parfumées. Floraison au début de l'été.

***Rosa gallica* 'Ipsilanté'**

ROSIER 'IPSIANTÉ'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant dense. Tiges épineuses rouges. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, mauve au centre, rose plus pâle vers l'extérieur, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps.

***Rosa rubrifolia* (*R. glauca*)**

ROSIER À FEUILLES ROUGES

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Port lâche. Tiges rouge pourpre, sans épines. Feuillage gris pourpre. Fleurs en grappes, simples, rose lilas à base blanche, étamines jaunes. Aucun parfum. Floraison au début du printemps. Fruits rouges, puis pourpres. Bonne résistance aux maladies.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Caragana tragacanthoides

CARAGANA À ÉPINES ROUGES

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges portant des épines rouges. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port tabulaire.]

***Cotinus coggygia* (*Rhus cotinus*)** ARBRE À PERRUQUE

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles gris vert, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotinus coggygia* 'Golden Spirit' (C. c. 'Ancot')**

ARBRE À PERRUQUE 'GOLDEN SPIRIT'

2 Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Tiges rouges. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuilles dorées, rouge orange et corail en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotinus coggygia* 'Grace'**

ARBRE À PERRUQUE 'GRACE'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge vin. Feuilles bronze, puis rouge, orange et jaune en automne. Floraison estivale. Fleurs roses, inflorescences vaporeuses. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotinus coggygia* 'Nordine'**

ARBRE À PERRUQUE 'NORDINE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port élancé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles bronze, jaune orangé en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpres, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotinus coggygia* 'Purpureus'**

ARBRE À PERRUQUE POURPRE

3 Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vertes à reflets pourpres, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotinus coggygia* 'Royal Purple'** ARBRE À PERRUQUE 'ROYAL PURPLE'

Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge pourpre, rouge pourpre intense en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Cotinus coggygia* 'Rubrifolius' (C. c. 'Foliis Purpureis')**

ARBRE À PERRUQUE ROUGE

Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, lâche. Tiges rouge pourpre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge pourpre devenant vert bronze, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpres, inflorescences vaporeuses. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Cotinus coggygria 'Velvet Cloak' ARBRE À PERRUQUE 'VELVET CLOAK'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge pourpre intense, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpres, inflorescences vaporeuses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Cotinus coggygria 'Young Lady' ARBRE À PERRUQUE 'YOUNG LADY'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé, inflorescences vaporeuses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Cotoneaster acutifolius (*C. pekinensis*; *C. lucidus*)

COTONÉASTER DE PÉKIN

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, semi-lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits noirs, puis rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Cotoneaster adpressus praecox (*C. nanshan* ; *C. praecox*)

COTONÉASTER PRÉCOCE RAMPANT

Zone 5a. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouge orangé écarlate. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Elaeagnus angustifolia

OLIVIER DE BOHÈME

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges épineuses. Rameaux argentés. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses argentées. Feuilles gris argenté. Floraison de début d'été. Fleurs jaunâtres, parfumées. Fruits grisâtres. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, diffus.]

Elaeagnus commutata

CHALEF ARGENTÉ

Plante indigène. Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles argentées. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits argentés. Écorce décorative, brun rougeâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Elaeagnus x 'Quicksilver'

CHALEF 'QUICKSILVER'

I Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges argentées. Feuilles argenté intense. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune pâle, très parfumées. Fruits argentés. Écorce décorative, brun rougeâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Genista lydia

GENÊT DE LYDIE

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux. Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison printanière. Fleurs jaune d'or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.



Halimodendron halodendron

HALIMODENDRON

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris vert, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs mauves. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]

Hippophae rhamnoides

ARGOUSIER FAUX-NERPRUN

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plante dioïque. Fruits jaune orangé. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Hippophae rhamnoides* 'Leikora'** ARGOUSIER FAUX-NERPRUN 'LEIKORA'

2

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plante femelle. Fruits jaune orangé. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Hippophae rhamnoides* 'Pollmix'** ARGOUSIER FAUX-NERPRUN 'POLLIMIX'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plant mâle. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Prunus tenella* 'Fire Hill'**

AMANDIER 'FIRE HILL'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert grisâtre, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose rouge, brillantes, abondantes. Fruits jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Robinia hispida

ROBINIER À POILS RUDES

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges tortueuses. Rameaux rouges couverts de poils. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé. Fruits en gousses persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris, les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Shepherdia canadensis

SHEPHERDIA DU CANADA

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles grises au printemps, gris vert en été, pourprés en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle. Fruits rouges, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

Tamarix parviflora

TAMARIX À PETITES FEUILLES

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vertes. Floraison au début de l'été. Fleurs roses. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Gleditsia triacanthos inermis

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Fruits en longues gousses persistantes. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Emerald Cascade'**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'EMERALD CASCADE'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port pleureur. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune beurre en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Fairview'**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'FAIRVIEW'

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Imperial' (G. t. i. 'Impcole')**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'IMPERIAL'

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune et cuivre en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Prairie Silk' (G. t. i. 'Dursan')**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'PRAIRIE SILK'

I Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port irrégulier. Branches horizontales. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Rubylace'**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'RUBYLACE'

Zone 5b. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles petites, vert bronze, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante sensible.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Shademaster'**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SHADEMASTER'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port en forme de vase, branches érigées. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.



***Gleditsia triacanthos inermis* 'Skyline' (G. t. i. 'Skycole')**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SKYLINE'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Spectrum' (G. t. i. 'Speczam')**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SPECTRUM'

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, aplati, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune doré. Petites feuilles jaunes tout l'été. Feuillage jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Gleditsia triacanthos inermis* 'Sunburst' (G. t. i. 'Suncole')**

FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SUNBURST'

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, aplati, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles petites, vert chartreuse, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Morus alba

MÛRIER BLANC

2 Zone 3b. H. : 10 m. L. : 15 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Morus alba* 'Chapparral'**

MÛRIER BLANC 'CHAPPARAL'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Morus alba* 'Greenwave'**

MÛRIER BLANC 'GREENWAVE'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Morus alba* 'Macrophylla'**

MÛRIER BLANC 'MACROPHYLLA'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert clair. Fruits violet, rose et blanc. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Morus alba* 'Pendula'**

MÛRIER BLANC 'PENDULA'

3 Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Morus latifolia 'Spirata'

MÛRIER ZIGZAG

1 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches en zigzag. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Pyrus salicifolia 'Pendula'

POIRIER D'ORNEMENT PLEUREUR

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Parfois épineux. Feuillage de texture fine. Feuilles gris argenté, plus vertes en été. Floraison au début du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits argentés. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Ulmus carpiniifolia

ORME À FEUILLES DE CHARME

Zone 5a. H. : 30 m. L. : 15 m. Port conique large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Amorpha fruticosa (*A. pubescens*) FAUX INDIGO

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison au début d'été. Fleurs pourpre bleuté. Fruits en gousses, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.

Symphoricarpos* x *doorenbosii 'Amethyst' (S. x d. 'Kordes')

SYMPHORINE 'AMETHYST'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rose pourpre foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos* x *doorenbosii 'Magic Berry'

SYMPHORINE 'MAGIC BERRY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits roses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos* x *doorenbosii 'Marleen' (S. x d. 'Ariso')

SYMPHORINE 'MARLEEN'

2 Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté foncé, vert bleuté clair dessous. Floraison estivale. Fleurs rose pâle. Fruits rose pourpre brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos* x *doorenbosii 'Mother of Pearl'

SYMPHORINE 'MOTHER OF PEARL'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits blanc perle, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos orbiculatus* 'Foliis Variegatis'**
(*S. o.* 'Variegatus'; *S. o.* 'Bowles' Golden Variegated')

SYMPHORINE À FEUILLES RONDES PANACHÉES

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos orbiculatus* 'Taff's Silver Edge'**
(*S. o.* 'Albovariegatus'; *S. o.* 'Argenteovariegatus')

SYMPHORINE À FEUILLES RONDES 'TAFF'S SILVER EDGE'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, bordées de blanc crème. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge rosé, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Ulmus minor* 'Jacqueline Hillier'** ORME 'JACQUELINE HILLIER'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, placées comme en écailles, brunes en automne et persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

Juniperus communis

GENÉVRIER COMMUN

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, grisâtres dessous, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus communis* 'Berkshire'** GENÉVRIER COMMUN 'BERKSHIRE'

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, nain, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, gris argenté dessous, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus communis* 'Gnom'** GENÉVRIER COMMUN 'GNOM'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (dermatite).



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

***Juniperus communis* 'Gold Cone'** GENÉVRIER COMMUN 'GOLD CONE'

1 Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 15 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune d'or. Aiguilles piquantes, jaune à jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale, jaune teinté de bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus communis* 'Green Carpet'**

GENÉVRIER COMMUN 'GREEN CARPET'

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert brillant, odorantes. Coloration automnale vert foncé à violacé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus communis* 'Hornibrookii'**

GENÉVRIER COMMUN 'HORNIBROOKII'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, très compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, grisâtres dessous, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus communis* 'Repanda'** GENÉVRIER COMMUN 'REPANDA'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair brillant, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus communis* 'Sentinel' (J. c. 'Pencil Point')**

GENÉVRIER COMMUN 'SENTINEL'

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 30 cm. Port conique, très étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert clair, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus communis* 'Suecica'** GENÉVRIER DE SUÈDE

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert bleu, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).



1



2



3

ROSIERS

Rosa pimpinellifolia altaica ROSIER PIMPRENELLE ALTAICA

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Branches brunes, très épineuses. Feuillage vert grisâtre. Grandes fleurs solitaires, simples, jaune primevère, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits brun à noir. Très résistant aux insectes et maladies.

***Rosa pimpinellifolia* 'Frühlingsmorgen'** ROSIER PIMPRENELLE 'FRÜHLINGSMORGEN'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches arquées. Feuillage vert grisâtre. Fleurs simples, jaune primevère au centre et rose cerise sur l'extérieur des pétales, étamines marron décoratives, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits marron à l'automne.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | humide

ARBRES

***Salix interior* (*Salix exigua*)** SAULE À FEUILLES ÉTROITES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Tiges verdâtres. Jeunes feuilles gris argenté, puis vert argenté et vert bronze en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons jaunâtres. Écorce brun rougeâtre teintée de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

***Salix matsudana* 'Golden Curls'** SAULE DE PÉKIN 'GOLDEN CURLS'

3

Zone 5a. H. : 9,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges jaune doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Salix matsudana* 'Scarlet Curls'** SAULE DE PÉKIN 'SCARLET CURLS'

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Nouvelles pousses rouges. Tiges jaune doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Salix matsudana* 'Tortuosa'** SAULE DE PÉKIN TORTUEUX

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi irrégulier. Tiges vertes, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

ARBUSTES

Prunus depressa CERISIER DÉPRIMÉ

Plante indigène. Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits rouges puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Spiraea betulifolia aemiliana SPIRÉE À FEUILLES DE BOULEAU AEMILIANA

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert gris. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea betulifolia 'Thor' SPIRÉE À FEUILLES DE BOULEAU 'THOR'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles bleu vert, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Vitex agnus castus ARBRE AUX POIVRES

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles gris bleuté, aromatiques. Floraison à la fin de l'été. Fleurs bleu lavande, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

Juniperus conferta 'Blue Pacific' GENÉVRIER DU LITTORAL 'BLUE PACIFIC'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleutées, odorantes. Coloration automnale verte. Fruits noir pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Juniperus conferta 'Silver Mist' GENÉVRIER DU LITTORAL 'SILVER MIST'

Zone 5a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert argenté, odorantes. Coloration automnale bleu vert. Fruits noir pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Pinus mugo 'Big Tuna' PIN DES MONTAGNES 'BIG TUNA'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo 'Gnom' PIN DES MONTAGNES 'GNOM'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense devenant pyramidal large avec l'âge. Feuillage de texture moyenne. Pousse très décorative. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo 'Honeycomb' PIN DES MONTAGNES 'HONEYCOMB'

I Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges dorées en hiver. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo 'Mops' PIN DES MONTAGNES 'MOPS'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses décoratives. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.



Pinus mugo mughus

PIN DES MONTAGNES NAIN

Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Paul's Dwarf'**

PIN DES MONTAGNES 'PAUL'S DWARF'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, aplati dessus. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Pot O' Gold'**

PIN DES MONTAGNES 'POT O' GOLD'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges jaunes pendant l'hiver et avant la croissance printanière. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Sherwood Compact'**

PIN DES MONTAGNES 'SHERWOOD COMPACT'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, petites, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Slowmound'**

PIN DES MONTAGNES 'SLOWMOUND'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Tannenbaum'**

PIN DES MONTAGNES 'TANNENBAUM'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Teeny'**

PIN DES MONTAGNES 'TEENY'

2 Zone 2a. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port miniature, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'White Bud'**

PIN DES MONTAGNES 'WHITE BUD'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Bourgeons blancs tout l'hiver. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus thunbergii* 'Thunderhead'**

PIN NOIR JAPONAIS 'THUNDERHEAD'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 3,00 m. Port érigé, globulaire, large, irrégulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons blancs en hiver. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold'

SUREAU DORÉ PLUMEUX 'SUTHERLAND GOLD'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d'or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus racemosa 'Goldfinch' SUREAU DORÉ PLUMEUX 'GOLDFINCH'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d'or brillant. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Shepherdia argentea (*Elaeagnus argentea*)

SHEPHERDIA ARGENTÉ

Zone 2a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles argentées sur les deux faces. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge écarlate à orangé, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

PLANTES GRIMPANTES

Lonicera x tellmanniana

CHÈVREFEUILLE TELLMANNIANA

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, jaune orangé, parfumées. Floraison estivale. Fruits orange. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec

ARBRES

Robinia pseudoacacia

ROBINIER FAUX-ACACIA

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison en début d'été. Fleurs blanches en grappes parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Robinia pseudoacacia 'Frisia' ROBINIER FAUX-ACACIA 'FRISIA'

Zone 5b. H. : 9,00 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles jaunes au printemps, en été et à l'automne. Floraison en début d'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Robinia pseudoacacia* 'Purple Crown'**

ROBINIER FAUX-ACACIA 'PURPLE CROWN'

Zone 4b. H. : 9,00 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison en début d'été. Fleurs pourpres, très parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Robinia pseudoacacia* 'Purple Robe'**

ROBINIER FAUX-ACACIA 'PURPLE ROBE'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert bleuté, jaune clair en automne. Floraison en début d'été. Fleurs lavande, parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera'**

ROBINIER FAUX-ACACIA 'UMBRACULIFERA'

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port rond, régulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Fleurs rares. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

ARBUSTES

***Robinia pseudoacacia* 'Tortuosa' (R. p. 'Twist Baby')**

ROBINIER TORTUEUX

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, très irrégulier. Jeunes pousses épineuses. Tiges tortueuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, frisées, jaune clair en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Lonicera caerulea edulis

CAMÉRISIER BLEU

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits noir bleuâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Rhus glabra

VINAIGRIER

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge écarlate brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge pourpre vif, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Rhus glabra* 'Laciniata'**

VINAIGRIER À FEUILLES LACINIÉES

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, puis rouge écarlate brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge pourpre vif, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Sambucus pubens

SUREAU PUBESCENT

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits en baies rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique.

ROSIERS

Rosa rugosa 'Agnes'

ROSIER RUGUEUX 'AGNES'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé et lâche. Tiges épineuses. Fleurs doubles, jaune chamois ou jaune ambré, au fort parfum fruité. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa alba

ROSIER RUGUEUX À FLEURS BLANCHES

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs simples, blanc pur, étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Belle Poitevine'

ROSIER RUGUEUX 'BELLE POITEVINE'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs en grappes, semi-doubles à doubles, rose moyen, aux étamines jaune très pâle, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa série 'Grootendorst'

ROSIER RUGUEUX SÉRIE 'GROOTENDORST'

Zone 3a. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs en grappes, doubles, roses, rouges ou blanches, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Magnifica'

ROSIER RUGUEUX MAGNIFIQUE

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Grandes fleurs, en grosses grappes, semi-doubles, rose foncé, aux étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa série 'Max Graf'

ROSIER RUGUEUX SÉRIE 'MAX GRAF'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port en couvre-sol. Tiges rampantes, très épineuses. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, simples, rose clair, rouge lumineux ou blanc pur, au léger parfum de pomme. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Mrs John McNabb'

ROSIER RUGUEUX 'MRS JOHN McNABB'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs semi-doubles, blanches avec de légers reflets roses et des étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Robusta'

ROSIER RUGUEUX 'ROBUSTA'

1 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs simples, rouges, aux étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Schneezwerg'

ROSIER RUGUEUX 'SCHNEEZWERG'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs semi-doubles, blanc pur, aux étamines jaunes au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.



Rosa rugosa 'Will Alderman'

ROSIER RUGUEUX 'WILL ALDERMAN'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs doubles, rose lilas, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | humide

CONIFÈRES

Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis'

FAUX-CYPRÈS BLANC 'ANDELYENSIS'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides 'Blue Sport'

FAUX-CYPRÈS BLANC 'BLUE SPORT'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Rameaux filiformes. Feuilles en écailles bleues, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides 'Ericoides' FAUX-CYPRÈS BLANC 'ERICOIDES'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert grisâtre, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides 'Glauca Pendula'

FAUX-CYPRÈS BLANC PLEUREUR

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large, irrégulier. Bout des tiges retombant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles bleutées, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides 'Heatherbun'

FAUX-CYPRÈS BLANC 'HEATHERBUN'

2

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides 'Meth Dwarf'

FAUX-CYPRÈS BLANC 'METH DWARF'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port conique. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles gris bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis thyoides* 'Rubicon' (C. t. 'Red Star')**

FAUX-CYPRÈS BLANC 'RUBICON'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles vert grisâtre, odorantes. Coloration automnale prune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

***Cotoneaster microphyllus* 'Thymifolius'**

COTONÉASTER HORIZONTAL À FEUILLES DE THYM

Zone 5b. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, petites, rouge orange en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge vif. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Euonymus hamiltonianus* 'Indian Summer'**

FUSAIN DE L'HIMALAYA 'INDIAN SUMMER'

1 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge intense en automne. Fruits rouge rosé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.

***Euonymus hamiltonianus* 'Red Elf'**

FUSAIN DE L'HIMALAYA 'RED ELF'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Fruits rose foncé et rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.

***Euonymus hamiltonianus* 'Winter Glory'**

FUSAIN DE L'HIMALAYA 'WINTER GLORY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, vert jaunâtre en automne. Fruits roses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.



CONIFÈRES

Pinus cembra

PIN CEMBRO

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus cembra 'Blue Mound'

PIN CEMBRO 'BLUE MOUND'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu-tées, brillantes, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus cembra 'Compacta Glauca'

PIN CEMBRO 'COMPACTA GLAUCA'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleutées, brillantes, gris bleuté dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus cembra 'Nana'

PIN CEMBRO NAIN

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Cercis canadensis

GAINIER DU CANADA

2 Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

GAINIER DU CANADA 'FOREST PANSY'

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge pourpre, donnant des feuilles rondes, vert bronze, jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs rose pourpre. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Cercis canadensis 'Lavender Twist' (C. c. 'Covey')

GAINIER DU CANADA 'LAVENDER TWIST'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Corylus colurna

NOISETIER DE BYZANCE

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Corylus colurna 'Te Terra Red' NOISETIER DE BYZANCE POURPRE

1 Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé en été et en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Sorbus intermedia ALISIER DE SUÈDE

Zone 4. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

Syringa julianae 'Hers' LILAS PLEUREUR 'HERS'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, finement découpées. Floraison au début de l'été. Fleurs mauve pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa reticulata 'Golden Eclipse' LILAS DU JAPON 'GOLDEN ECLIPSE'

2 Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 3,50 m. Port ovoïde compact. Feuillage de texture dense. Nouvelles feuilles vertes au centre plus foncé. Feuilles vert foncé au bord jaune doré. Floraison en début d'été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Syringa reticulata 'Ivory Silk' LILAS DU JAPON 'IVORY SILK'

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif brillant, grisâtres dessous. Floraison en début d'été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Tilia tomentosa 'Satin Shadow' (*T. t.* 'Sashazam') TILLEUL ARGENTÉ 'SATIN SHADOW'

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia x euclora TILLEUL DE CRIMÉE

Zone 4b. H. : 17 m. L. : 7,00 m. Port conique large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert foncé, glauques dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison de début d'été. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Callicarpa bodinieri giraldii 'Profusion' CALLICARPA DE GIRALD 'PROFUSION'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, puis jaune et violacé en automne. Floraison en fin d'été. Fleurs rose lilas. Fruits violets, très luisants, abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster dammeri COTONÉASTER DE DAMMER

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Cotoneaster dammeri* 'Coral Beauty'** COTONÉASTER DE DAMMER 'CORAL BEAUTY'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Cotoneaster dammeri* 'Eichholz'** COTONÉASTER DE DAMMER 'EICHOLZ'

3 Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert clair, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Gros fruits rouge carmin. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Cotoneaster dammeri* 'Skogholm'** (*C. d.* 'Skogholmen')
COTONÉASTER DE DAMMER 'SKOGHOLM'

Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, hâtifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Crataegus monogyna* 'Compacta'** (*C. m.* 'Inermis Compacta')
AUBÉPINE NAINNE

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Pas d'épines. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Rares fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

***Forsythia* x 'Boucle d'or'** (*F.* x 'Courtacourt')
FORSYTHIA 'BOUCLE D'OR'

Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Fiesta'** FORSYTHIA 'FIESTA'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Forsythia* x 'Golden Times'** FORSYTHIA 'GOLDEN TIMES'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert et jaune tachetées de rose. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

***Forsythia* x 'Happy Centennial'** FORSYTHIA 'HAPPY CENTENNIAL'

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Maluch'** FORSYTHIA 'MALUCH'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Marée d'Or' (F. x 'Courtasol')**

FORSYTHIA 'MARÉE D'OR'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pamplemousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Meadowlark'** FORSYTHIA 'MEADOWLARK'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Minigold (F. x 'Flojor')** FORSYTHIA 'MINIGOLD'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Minigold Fiesta'** FORSYTHIA 'MINIGOLD FIESTA'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'New Hampshire Gold'** FORSYTHIA 'NEW HAMPSHIRE GOLD'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Northern Gold'** FORSYTHIA 'NORTHERN GOLD'

1 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune doré. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde.]

***Forsythia ovata* 'Ottawa'** FORSYTHIA PRÉCOCE 'OTTAWA'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Sunrise'** FORSYTHIA 'SUNRISE'

2 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Petites fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Week End' (F. x 'Courtalyn')**

FORSYTHIA 'WEEK END'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligustrum vulgare* 'Cheyenne'**

TROËNE 'CHEYENNE'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert olive, brillantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

***Ligustrum vulgare* 'Lodense'**

TROËNE 'LODENSE'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

***Lonicera xylosteum* 'Compacta' (L. x 'Emerald Mound'; L. x 'Nana')**

CHÈVREFEUILLE NAIN

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, jaunes aux reflets pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc jaunâtre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste aux maladies.

Prunus tomentosa

CERISIER TOMENTEUX

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert mat, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge foncé, comestibles. Écorce décorative rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Prunus* x *cistena

PRUNIER DES SABLES POURPRE

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi. Rameaux rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits violet foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Syringa x 'Agincourt Beauty'

LILAS HYBRIDE 'AGINCOURT BEAUTY'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Albert F. Holden'

LILAS HYBRIDE 'ALBERT F. HOLDEN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé à revers argenté, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Avalanche'

LILAS HYBRIDE 'AVALANCHE'

1

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Belle de Nancy'

LILAS HYBRIDE 'BELLE DE NANCY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Burgundy Queen'

LILAS HYBRIDE 'BURGUNDY QUEEN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière hâtive. Fleurs pourpres, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Charles Joly'

LILAS HYBRIDE 'CHARLES JOLY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs doubles, rouge pourpre au revers plus clair (bicolore), très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier.]



Syringa x 'Dappled Dawn'

LILAS HYBRIDE 'DAPPLED DAWN'

2 Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mauve pâle, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Syringa x 'Edward J. Gardner'

LILAS HYBRIDE 'EDWARD J. GARDNER'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs roses, doubles, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Angel White'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ANGEL WHITE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Asessippi'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ASESSIPPI'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Churchill'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'CHURCHILL'

3 Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Excel'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'EXCEL'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs bleu lilas, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Lavender Lady'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'LAVENDER LADY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lavande, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x *hyacinthiflora* 'Maiden's Blush'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MAIDEN'S BLUSH'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa x hyacinthiflora* 'Mount Baker'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MOUNT BAKER'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa x hyacinthiflora* 'Pocahontas'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'POCAHONTAS'

1 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs violet foncé, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa* x 'Josée'**

LILAS HYBRIDE 'JOSÉE'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière, puis plusieurs fois au cours de l'été. Boutons rose foncé. Fleurs rose pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Syringa* x 'Katherine Havemeyer'**

LILAS HYBRIDE 'KATHERINE HAVEMEYER'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs doubles, bleu lavande rosé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Syringa* x 'Krasavitsa Moskvyy' (S. x 'Beauté de Moscou'; S. x 'Beauty of Moscow')**

LILAS HYBRIDE 'KRASAVITSA MOSKVY'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons argentés. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x laciniata* (*S. persica* 'Laciniata')**

LILAS À FEUILLES EN DENTELLE

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vert tendre. Floraison tôt au printemps. Boutons rose foncé. Fleurs lilas, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Syringa* x 'Little Boy Blue'**

LILAS HYBRIDE 'LITTLE BOY BLUE'

2 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs bleu ciel, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x 'Marie Frances'**

LILAS HYBRIDE 'MARIE FRANCES'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 1,75 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.



***Syringa* x 'Michel Buchner'**

LILAS HYBRIDE 'MICHEL BUCHNER'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs lavande, abondantes, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Syringa* x 'Miss Ellem Willmott'**

LILAS HYBRIDE 'MISS ELLEM WILLMOTT'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x 'Madame Lemoine'**

LILAS HYBRIDE 'MADAME LEMOINE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Syringa* x 'Monge'**

LILAS HYBRIDE 'MONGE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs, rouge pourpre foncé, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x 'Mrs Edward Harding'**

LILAS HYBRIDE 'MRS EDWARD HARDING'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs doubles, rose pourpre, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x 'Nadezha'**

LILAS HYBRIDE 'NADEZHA'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs bleu pâle, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x 'Paul Thirion'**

LILAS HYBRIDE 'PAUL THIRION'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, aux différents tons de rose, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Syringa x 'Pink Elizabeth'

LILAS HYBRIDE 'PINK ELIZABETH'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Prairie Petite'

LILAS HYBRIDE 'PRAIRIE PETITE'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Président Grevy'

LILAS HYBRIDE 'PRÉSIDENT GREVY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs doubles, bleu mauve, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Président Poincaré'

LILAS HYBRIDE 'PRÉSIDENT POINCARÉ'

1 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, rose très foncé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Primrose'

LILAS HYBRIDE 'PRIMROSE'

2 Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons jaune foncé. Fleurs jaune pâle, puis blanc crème, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.



Syringa x 'Prodige'

LILAS HYBRIDE 'PRODIGE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Sensation'

LILAS HYBRIDE 'SENSATION'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs rouge pourpre, bordées de blanc argenté, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Slater's Elegance'

LILAS HYBRIDE 'SLATER'S ELEGANCE'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grosses fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Souvenir de Ludwig Spaeth' (S. x 'Andenken an Ludwig Späth')

LILAS HYBRIDE 'SOUVENIR DE LUDWIG SPAETH'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Fleurs rose violacé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Tinkerbelle' (S. x 'Bailbelle')

LILAS HYBRIDE 'TINKERBELLE'

3 Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rouge vin. Fleurs rose foncé, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port arrondi, régulier.]

Syringa x 'Wedgewood Blue'

LILAS HYBRIDE 'WEDGEWOOD BLUE'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose lilas. Fleurs bleues, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa reticulata

LILAS DU JAPON

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert brillant, grisâtres dessous. Floraison au début de l'été. Fleurs blanc crème. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde.]

Syringa vulgaris

LILAS COMMUN

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

PLANTES GRIMPANTES

Clematis akebioides

CLÉMATITE AKEBIOIDES

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles, rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Fleurs jaunes à reflets rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Helsingborg'**

CLÉMATITE DES ALPES 'HELSINGBORG'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs simples, pourpre foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Pamela Jackman'** CLÉMATITE DES ALPES 'PAMELA JACKMAN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs simples, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Rosy O'Grady'** CLÉMATITE DES ALPES 'ROSY O'GRADY'

1 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, rose pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Ruby'**

CLÉMATITE DES ALPES 'RUBY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose tendre nuancé de rouge. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Willy'**

CLÉMATITE DES ALPES 'WILLY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs simples, rose pâle et à lignes rougeâtres. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis florida sieboldiana* (C. f. 'Sieboldii' ; C. x 'Bicolor')**

CLÉMATITE BICOLORE

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs parfumées aux pétales blancs et aux étamines groupées, violet pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Clematis tangutica* 'Aureolin'** CLÉMATITE TANGUTICA 'AUREOLIN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune citron. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Elios'** CLÉMATITE TANGUTICA 'ELIOS'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune vif. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Golden Tiara' (C. t. 'Kugotia')**

CLÉMATITE TANGUTICA 'GOLDEN TIARA'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune vif avec des étamines violet foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



***Clematis tangutica* 'My Angel' (C. t. 'Engelina')**

CLÉMATITE TANGUTICA 'MY ANGEL'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune brillant à l'intérieur, rouge brun à l'extérieur. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Radar Love' CLÉMATITE TANGUTICA 'RADAR LOVE'**

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x *jouiniana* 'Mrs Robert Brydon'**

CLÉMATITE 'MRS ROBERT BRYDON'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu ciel. Floraison à la fin de l'été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante toxique.

ROSIERS

***Rosa moyesii* 'Eddie's Jewel' ROSIER 'EDDIE'S JEWEL'**

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port lâche. Branches épineuses, rougeâtres. Feuillage vert bleuté. Fleurs semi-doubles, rouge brique pâle, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge orangé.

***Rosa moyesii* 'Geranium' ROSIER 'GERANIUM'**

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes simples, rouge cramoisi, étamines jaune crème très voyantes, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge orangé, très décoratifs.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

***Sorbus aucuparia* SORBIER DES OISEAUX**

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Sorbus aucuparia* 'Asplenifolia' SORBIER DES OISEAUX À FEUILLES DÉCOUPÉES**

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Sorbus aucuparia 'Cardinal Royal' (S. a. 'Michred')

SORBIER DES OISEAUX 'CARDINAL ROYAL'

■ Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge clair, persistants. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

SORBIER DES OISEAUX FASTIGIÉ

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ondulées, vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

Sorbus aucuparia 'Pendula'

SORBIER DES OISEAUX PLEUREUR

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

Sorbus aucuparia 'Rossica'

SORBIER DES OISEAUX 'ROSSICA'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits gros, rouge foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

ARBUSTES

Corylus americana

NOISETIER D'AMÉRIQUE

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Cotoneaster horizontalis

COTONÉASTER HORIZONTAL

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, glauques dessous, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster horizontalis 'Hessei' COTONÉASTER HORIZONTAL DE HESSE

Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées, rouge vin en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Cotoneaster horizontalis *perpusillus*

COTONÉASTER HORIZONTAL NAIN

Zone 5a. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, glauques dessous, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Cotoneaster horizontalis* 'Variegatus'**

COTONÉASTER HORIZONTAL PANACHÉ

Zone 5a. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, bordées de blanc, rouge orange en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Kolkwitzia amabilis

KOLKWITZIA AIMABLE

2 Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dressé, puis arqué. Feuillage de texture dense. Feuilles vert grisâtre, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé. Fruits jaune brun. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Kolkwitzia amabilis* 'Pink Cloud'** KOLKWITZIA AIMABLE 'PINK CLOUD'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dressé, puis arqué. Feuillage de texture dense. Feuilles vert grisâtre, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle, abondantes. Fruits jaune brun. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lonicera maximowiczii sachalinensis

CHÈVREFEUILLE DE SAKHALINE

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Prunus cerasifera* 'Hessei'**

PRUNUS 'HESSEI'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles bronze, bordées de blanc crème, jaune et rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpre noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

***Prunus cerasifera* 'Newport'**

PRUNUS 'NEWPORT'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles pourpre foncé, rougeâtres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pâle à blanc, parfumées. Fruits pourpres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]

Rubus idaeus

RONCE DU MONT IDA

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs verdâtres. Fruits rouges, comestibles. Croissance très envahissante. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Spiraea x arguta

SPIRÉE ARGUTA

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port gracieux. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc pur, avec un centre plus foncé et des étamines légèrement rosées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea x cinerea* 'Grefsheim' (*Spiraea x arguta* 'Graciosa')**

SPIRÉE 'GREFSHEIM'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port gracieux, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc pur, avec un centre plus foncé et des étamines légèrement rosées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa microphylla* 'Superba'**

LILAS SUPERBE

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]

***Syringa patula* 'Miss Kim' (*S. velutina* 'Miss Kim')**

LILAS DE MANDCHOURIE 'MISS KIM'

1 Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, pourpres en automne. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs lilas, puis blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, régulier.]

Syringa villosa

LILAS DUVETÉUX

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs rose lilas, virant au rose pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Viburnum x carlcephalum

VIORNE CARLCEPHALUM

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanc pur, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]



CONIFÈRES

Abies alba 'Pendula'

SAPIN COMMUN PLEUREUR

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, branches secondaires pleureuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Abies concolor

SAPIN BLANC DU COLORADO

2 Zone 4b. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Abies concolor 'Compacta'

SAPIN BLANC DU COLORADO COMPACT

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Larix kaempferi (*L. leptolepis*)

MÉLÈZE DU JAPON

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix kaempferi 'Blue Ball'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE BALL'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu pâle. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire.]

Larix kaempferi 'Blue Dwarf'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE DWARF'

3 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu intense. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]

Larix kaempferi 'Blue Rabbit'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE RABBIT'

Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix kaempferi 'Diane' (*L. k.* 'Diana'; *L. k.* 'Diana Contorta'; *L. k.* 'Contorta')

MÉLÈZE DU JAPON 'DIANE'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, tortillées, vert bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix kaempferi 'Jakobsen's Pyramid'

MÉLÈZE DU JAPON 'JAKOBSEN'S PYRAMID'

Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Larix kaempferi 'Nana' MÊLÈZE DU JAPON NAIN

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix kaempferi 'Pendula' (L. k. 'Inversa') MÊLÈZE DU JAPON PLEUREUR

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix kaempferi 'Stiff Weeping' MÊLÈZE DU JAPON 'STIFF WEEPING'

1 Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port pleureur étroit. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix x eurolepis MÊLÈZE DE DUNKLED

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Rameaux jaunes. Feuillage de texture fine. Rameaux et ramilles pendants. Aiguilles caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune d'or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix x eurolepis 'Varied Directions' MÊLÈZE 'VARIED DIRECTIONS'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, étalé. Branche principale horizontale dans une direction. Rameaux jaunes, retombants. Feuillage de texture fine. Rameaux et ramilles pendants. Aiguilles caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune d'or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus flexilis 'Extra Blue' PIN FLEXIBLE 'EXTRA BLUE'

2 Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu intense, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus flexilis 'Glauca Pendula' PIN FLEXIBLE 'GLAUCA PENDULA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier (avec tuteur). Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté intense, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus flexilis 'Pendula' PIN FLEXIBLE PLEUREUR

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier (avec tuteur). Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus flexilis 'Vanderwolf Pyramid' PIN FLEXIBLE 'VANDERWOLF PYRAMID'

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, régulier, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus peuce PIN DE MACÉDOINE

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits verts, résineux, devenant bruns. Écorce rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.



***Pseudotsuga menziesii* 'Carnefix Weeping'**

SAPIN DE DOUGLAS 'CARNEFIX WEEPING'

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii* 'Emerald Twister' (*P. m.* 'Torquis')**

SAPIN DE DOUGLAS 'EMERALD TWISTER'

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port érigé, large très irrégulier. Tiges principale et secondaires tortueuses. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii glauca* SAPIN DE DOUGLAS BLEU**

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles bleutées, odorantes. Fleurs rougeâtres. Fruits bruns, pendants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii* 'Loggerhead'**

SAPIN DE DOUGLAS 'LOGGERHEAD'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étalé, rampant, plat sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii* 'Pendula' SAPIN DE DOUGLAS PLEUREUR**

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

PLANTES GRIMPANTES

***Ampelopsis brevipedunculata* 'Elegans'**

AMPÉLOPSIS ÉLÉGANT

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses. Feuilles vertes teintées de rose et de crème. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits bleus. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Lonicera x 'Mandarin' CHÈVREFEUILLE 'MANDARIN'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Fleurs tubulaires, orange mandarine et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Lonicera japonica 'Aureoreticulata' CHÈVREFEUILLE DU JAPON 'AUREORETICULATA'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes veinées de jaune. Fleurs tubulaires, jaune à blanc, parfumées. Floraison estivale. Fruits pourpre noir. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Lonicera japonica 'Halliana' CHÈVREFEUILLE DU JAPON 'HALLIANA'

Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, jaune crème, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Lonicera periclymenum 'Belgica Select'

CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'BELGICA SELECT'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Boutons rouge violacé. Fleurs tubulaires, blanches, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Lonicera periclymenum 'Harlequin' (L. p. 'Sherlite')

CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'HARLEQUIN'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert, rose et crème. Feuilles vertes largement bordées de crème. Fleurs tubulaires, jaune et rose, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Lonicera periclymenum 'Serotina' CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'SEROTINA'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Boutons rouge violacé. Fleurs tubulaires, crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Wisteria floribunda 'Lawrence' GLYCINE 'LAWRENCE'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Wisteria sinensis GLYCINE DE CHINE

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert foncé. Fleurs violacées, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Wisteria sinensis* 'Blue Sapphire'** GLYCINE DE CHINE 'BLUE SAPPHIRE'

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu violacé, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

ROSIERS

***Rosa hybrida* 'Dornröschen'** ROSIER ARBUSTIF 'DORNRÖSCHEN'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, rose saumon, parfumées. Floraison printanière. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* série 'Flower Carpet'** ROSIER ARBUSTIF SÉRIE 'FLOWER CARPET'

Zone 5b. H. : 50 à 90 cm. L. : 90 cm à 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges arquées. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, simples ou semi-doubles ; roses, rouges, jaunes ou blanches. Parfum léger. Floraison estivale. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Immensee'** ROSIER ARBUSTIF 'IMMENSEE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé. Fleurs en grandes grappes, simples, rose pâle, puis blanches à pleine ouverture. Parfum intense. Floraison printanière, abondante. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* série 'Meidiland'** ROSIER ARBUSTIF SÉRIE 'MEIDILAND'

Zone 5b. H. : 50 à 90 cm. L. : 1,10 à 1,80 m. Port en couvre-sol. Tiges plus ou moins arquées et rampantes, souvent très épineuses. Feuilles vert foncé luisant ou semi-luisant. Petites fleurs réunies en bouquets, simples, semi-doubles ou doubles ; roses, rouges ou blanches suivant le cultivar. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* Musks 'Ballerina'** ROSIER 'BALLERINA'

Zone 5b. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant, dense. Fleurs en grappes, simples, rose pâle et rose plus foncé et à base blanche. Aucun parfum. Floraison continue. Petits fruits orange, décoratifs.

***Rosa hybrida* Musks 'Buff Beauty'** ROSIER 'BUFF BEAUTY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port vigoureux et large. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes, doubles, jaunes avec des reflets abricot, moyennement parfumées. Floraison au début de l'été.

***Rosa hybrida* Musks 'Mozart'** ROSIER 'MOZART'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port vigoureux et buissonnant. Tiges arquées. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes, très nombreuses, simples, rouge carmin avec un œil blanc au centre, moyennement parfumées. Floraison au début de l'été puis sporadiquement par la suite.

***Rosa hybrida* 'Palmengarten Frankfurt'**
ROSIER ARBUSTIF 'PALMENGARTEN FRANKFURT'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant ou couvre-sol. Tiges longues et souples. Fleurs en grappes, semi-doubles, rose foncé, bien parfumées. Floraison estivale. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Prairie Joy'** ROSIER ARBUSTIF 'PRAIRIE JOY'

Zone 2b. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port évasé. Feuillage dense, vert foncé lustré. Fleurs réunies en grappes, doubles, roses. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Rosy Cushion'** ROSIER ARBUSTIF 'ROSY CUSHION'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port arqué, souple. Feuilles vert foncé, très lustrées. Petites fleurs en grappes, simples, rose pâle à rebord rose foncé, au parfum léger. Floraison printanière. Très résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Swany'

ROSIER ARBUSTIF 'SWANY'

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, en couvre-sol. Feuillage bronze et lustré. Fleurs en grappes, doubles, blanc pur, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

SOLEIL**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé****ARBRES****Betula albo-sinensis**

BOULEAU BLANC DE CHINE

Zone 5b. H. : 20 m. L. : 13 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaune doré en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brune aux reflets orange. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

Betula utilis jacquemontii

BOULEAU DE JACQUEMONT

1 Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture fine. Pousses duveteuses, puis rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs en longs chatons. Écorce décorative blanc pur, s'exfoliant, même chez les jeunes sujets. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Carya cordiformis

CARYER CORDIFORME

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 22 m. Port globulaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert jaunâtre luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus pennsylvanica

FRÊNE ROUGE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 9,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, vert foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits abondants et persistants (nuisance). Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus pennsylvanica 'Bergeson' FRÊNE ROUGE 'BERGESON'

Zone 4a. H. : 12 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, vert foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Pas de fruits. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyenne. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus pennsylvanica 'Cimmaron' (*F. p.* 'Cimmzam')

FRÊNE ROUGE 'CIMMARON'

2 Zone 3a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge rouille en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus pennsylvanica 'Foothills' (*F. p.* 'Heuver')

FRÊNE ROUGE 'FOOTHILLS'

Zone 2a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, vert foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Fraxinus pennsylvanica* 'Johnson'** (*F. p.* 'Leprechaun')

FRÊNE ROUGE 'JOHNSON'

Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles vertes, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Fraxinus pennsylvanica* 'Harlequin'** FRÊNE ROUGE 'HARLEQUIN'

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, étroit, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, bordées de blanc crème, puis jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Fraxinus pennsylvanica* 'Marshall's Seedless'**

FRÊNE ROUGE 'MARSHALL'S SEEDLESS'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, brillantes, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Fraxinus pennsylvanica* 'Patmore'** FRÊNE ROUGE 'PATMORE'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique étroit, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Fraxinus pennsylvanica* 'Ruby'** (*F. p.* 'Prairie Spire')

FRÊNE ROUGE 'RUBY'

Zone 3a. H. : 16 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, semi-brillantes, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Fraxinus pennsylvanica* 'Summit'** FRÊNE ROUGE 'SUMMIT'

3

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, semi-brillantes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits abondants et persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Prunus serotina

CERISIER TARDIF

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses brunâtres. Feuilles vert foncé brillant, puis jaune orangé en automne. Floraison de début d'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges puis noirs, persistants. Écorce décorative et odorante. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

ARBUSTES

Acer palmatum

ÉRABLE DU JAPON

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Atropurpureum'

ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES POURPRES

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge clair au printemps, plus foncé en été. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Bloodgood'

ÉRABLE DU JAPON 'BLOODGOOD'



Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge sang. Feuilles rouge foncé, puis rouge pourpre intense. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Crimson Queen'

ÉRABLE DU JAPON 'CRIMSON QUEEN'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Dissectum'

ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Branches et rameaux verts. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

ÉRABLE DU JAPON 'DISSECTUM GARNET'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles pourpre très foncé, orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Inabashidare'

ÉRABLE DU JAPON 'INABASHIDARE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles découpées, rouge pourpre, puis rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Red Dragon'

ÉRABLE DU JAPON 'RED DRAGON'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre très foncé, puis rouge brillant en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Red Pygmy'

ÉRABLE DU JAPON 'RED PYGMY'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture moyenne. Feuilles découpées, rouge marron, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Seiryû'

ÉRABLE DU JAPON 'SEIRYÛ'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuillage de texture fine. Feuilles découpées, vertes, puis jaunes ou rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Amelanchier laevis

AMÉLANCHIER GLABRE

Plante indigène. Zone 3b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert bleuté, rouge orangé en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge à pourpre foncé, hâtifs. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde.]

Chaenomeles speciosa

COGNASSIER À FLEURS

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs rouge écarlate. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Geisha Girl'

COGNASSIER À FLEURS 'GEISHA GIRL'

2 Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rose pêche. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Rubra'

COGNASSIER À FLEURS ROUGES

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge écarlate, semi-doubles. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Toyo-Nishiki'

COGNASSIER À FLEURS 'TOYO-NISHIKI'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, très lustrées. Floraison printanière. Fleurs rouge et blanc ; rose et rouge ; ou rouge et blanc. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.



SOLEIL
SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Chaenomeles x superba* 'Crimson and Gold'**

COGNASSIER SUPERBE 'CRIMSON AND GOLD'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-étalé. Tiges épineuses. Pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs rouge foncé avec des étamines jaunes au centre. Fruits jaunes, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Chaenomeles x superba* 'Fire Dance'**

COGNASSIER SUPERBE 'FIRE DANCE'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges épineuses. Pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge feu. Fruits jaunes, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Chaenomeles x superba* 'Knap Hill Scarlet'**

COGNASSIER SUPERBE 'KNAP HILL SCARLET'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge clair. Fruits verts, comestibles, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Chamaecytisus purpureus* (*Cytisus purpureus*)**

CYTISE À FLEURS POURPRES

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Kerria japonica

CORÊTE DU JAPON

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Kerria japonica* 'Golden Guinea'** CORÊTE DU JAPON 'GOLDEN GUINEA'

1 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune d'or. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.



Kerria japonica 'Picta'

CORÈTE DU JAPON PANACHÉE

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes bordées ou tachetées de blanc, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Kerria japonica 'Pleniflora'

CORÈTE DU JAPON À FLEURS DOUBLES

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs doubles, jaune d'or. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Magnolia stellata (M. kobus stellata) MAGNOLIA ÉTOILÉ

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia stellata 'Pink Star'

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'PINK STAR'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia stellata 'Royal Star'

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'ROYAL STAR'

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en forme d'étoiles, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia stellata 'Waterlily'

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'WATERLILY'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia x soulangiana

MAGNOLIA DE SOULANGE

3 Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, teintées de rose à l'extérieur, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia x soulangiana 'Rustica Rubra'

MAGNOLIA DE SOULANGE 'RUSTICA RUBRA'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose foncé à l'extérieur, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia x 'Susan'

MAGNOLIA 'SUSAN'

Zone 5b. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Sorbus koehneana

SORBIER DE KOEHNE

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, d'abord chocolat puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blanc ivoire. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Spiraea x billardii* 'Triumphans' (S. *pseudosalicifolia* 'Triumphans')**

SPIRÉE 'TRIUMPHANS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea thunbergii

SPIRÉE DE THUNBERG

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea thunbergii* 'Fugino Pink' SPIRÉE DE THUNBERG 'FUGINO PINK'**

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, rouge et orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pâle. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea thunbergii* 'Mellow Yellow' (S. t. 'Ogon')**

SPIRÉE DE THUNBERG 'MELLOW YELLOW'

I Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaunes teintées de rouge. Feuilles jaunes, ensuite vert jaunâtre, puis rose, orange et rouge en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea thunbergii* 'Mount Fuji' SPIRÉE DE THUNBERG 'MOUNT FUJI'**

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses. Feuilles vertes bordées de blanc, parfois tachetées de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa x prestoniae* 'Agnes Smith' LILAS DE PRESTON 'AGNES SMITH'**

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au milieu de l'été. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Alice Rose Foster' LILAS DE PRESTON 'ALICE ROSE FOSTER'**

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Coral' LILAS DE PRESTON 'CORAL'**

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs rose clair, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Donald Wyman' LILAS DE PRESTON 'DONALD WYMAN'**

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs roses puis violet pourpre, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé.]



***Syringa x prestoniae* 'Hiawatha'** LILAS DE PRESTON 'HIAWATHA'

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs rouge bleuté, aux reflets violets, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Isabella'** LILAS DE PRESTON 'ISABELLA'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs rose lilas, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

***Syringa x prestoniae* 'James Mac Farlane'**

LILAS DE PRESTON 'JAMES MAC FARLANE'

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé puis rose tendre, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Minuet'** LILAS DE PRESTON 'MINUET'

2 Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Boutons pourpre clair. Fleurs violet pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

***Syringa x prestoniae* 'Miss Canada'** LILAS DE PRESTON 'MISS CANADA'

3 Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Boutons rouges. Fleurs rose brillant, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Red Wine'** LILAS DE PRESTON 'RED WINE'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Boutons rose foncé. Fleurs rose clair, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa x prestoniae* 'Royalty'** LILAS DE PRESTON 'ROYALTY'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Boutons violet foncé. Fleurs bleu lilas devenant roses, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Viburnum x rhytidophylloides* 'Alleghany'**

VIORNE 'ALLEGHANY'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert très foncé, grises dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge brillant, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Weigela middendorffiana

WEIGELA DE MIDDENDORF

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris.

CONIFÈRES

***Abies lasiocarpa* 'Compacta'**

SAPIN DE L'OUEST COMPACT

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fleurs pourpre foncé, puis bruns. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Abies lasiocarpa* 'Green Globe'**

SAPIN DE L'OUEST 'GREEN GLOBE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, à la tige centrale érigée. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Oregon Blue Weeping'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'OREGON BLUE WEEPING'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles bleutées, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Glauca'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA BLEUTÉ

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Jubilee'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'JUBILEE'

I Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, étroit. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert clair, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Pendula'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA PLEUREUR

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Chamaecyparis nootkatensis* 'Strict Weeping'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'STRICT WEeping'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, très étroit. Feuillage de texture légère. Branches retombantes, peu nombreuses. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Blue Feathers'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'BLUE FEATHERS'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles gris bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Fernspray Gold'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FERNSPRAY GOLD'

2 Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune très intense. Feuilles en écailles jaune citron, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Filicoides'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FILICOIDES'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles vert brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Kosteri'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'KOSTERI'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port nain, pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Nana Gracilis'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'NANA GRACILIS'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Nana'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI NAIN

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port nain, globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Larix decidua

MÉLÈZE D'EUROPE

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d'or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Larix decidua 'Horstmann Recurved'

MÉLÈZE D'EUROPE 'HORSTMANN RECURVED'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Branches tortueuses. Rameaux retombants tortueux. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d'or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix decidua 'Pendula'

MÉLÈZE D'EUROPE PLEUREUR

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port pleureur, large. Feuillage de texture fine. Rameaux et ramilles pendants. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d'or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix decidua 'Pulii' (L. d. 'Poulii'; L. d. 'Pulii')

MÉLÈZE D'EUROPE 'PULII'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port pleureur, étroit. Rameaux jaunes. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d'or. Croissance lente. Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile.

Picea abies

ÉPINETTE DE NORVÈGE

Zone 2b. H. : 25 m. L. : 10 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Picea abies 'Aarburg'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'AARBURG'

Zone 2b. H. : 4,50 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Tige centrale érigée. Branches pleureuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Acrocona'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'ACROCONA'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, large. Branches horizontales. Rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert clair, odorantes. Coloration automnale, vert foncé. Fleurs roses. Chez les jeunes plants, fruits violet pourpre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.



***Picea abies* 'Cincinnata'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CINCINNATA'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Rameaux pendant des branches. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert pâle, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Clanbrassiliana Stricta'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CLANBRASSILIANA STRICTA'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé brillant, piquantes, odorantes. Bourgeons brun cannelle en hiver. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.

***Picea abies* 'Cobra'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'COBRA'

1 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Tige principale pleureuse. Branches en étages, peu nombreuses. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Cupressina'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CUPRESSINA'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Picea abies* 'Elegantissima'** ÉPINETTE DE NORVÈGE PANACHÉE

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanc crème. Aiguilles piquantes, tachetées de jaune tournant au vert pâle, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Formanek'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'FORMANEK'

2 Zone 3b. H. : 25 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port pleureur.]

***Picea abies* 'Hillside Upright'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'HILLSIDE UPRIGHT'

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port colonnaire, étroit, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert très foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Inversa'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'INVERSA'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Branches et rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert tendre. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Little Gem'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'LITTLE GEM'

3 Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port arrondi.]

***Picea abies* 'Mucronata'** ÉPINETTE DE NORVÈGE 'MUCRONATA'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, dense, irrégulier, large. Feuillage de texture dense. Bourgeons décoratifs. Aiguilles piquantes, vert bleuté foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea abies* 'Nidiformis'** ÉPINETTE DE NORVÈGE NID D'OISEAU

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert tendre. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Picea abies 'Ohlendorff'

ÉPINETTE D'OHLENDORF

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Bourgeons brun orangé. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Pendula'

ÉPINETTE DE NORVÈGE PLEUREUSE

1 Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur. Tige principale semi-érigée. Branches secondaires retombantes. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Pendula Major'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'PENDULA MAJOR'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tige principale érigée. Branches secondaires retombantes, peu nombreuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Pendula Monstrosa'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'PENDULA MONSTROSA'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-pleureur, régulier. Tige principale érigée. Branches secondaires retombantes, bien réparties. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Pumila'

ÉPINETTE DE NORVÈGE NAIN

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire compact, s'élargissant avec l'âge. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Repens'

ÉPINETTE DE NORVÈGE RAMPANTE

Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Pousses érigées. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Rubra Spicata'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'RUBRA SPICATA'

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge sang. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Picea abies 'Sherwood Compact'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'SHERWOOD COMPACT'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, compact, étroit, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Picea abies 'Tabuliformis'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'TABULIFORMIS'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dessus toujours plat. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies 'Virgata'

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'VIRGATA'

2 Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur. Tige centrale érigée. Branches horizontales. Rameaux retombants. Peu branchu. Feuillage de texture fine. Aiguilles piquantes, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.



***Picea abies* 'Witch's Brood'**

ÉPINETTE DE NORVÈGE 'WITCH'S BROOD'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Bourgeons bruns très voyants. Aiguilles piquantes, vert tendre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea pungens

ÉPINETTE DU COLORADO

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert à glauque, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Baby Blues Eyes'**

ÉPINETTE DU COLORADO 'BABY BLUES EYES'

3 Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Bakerii'**

ÉPINETTE BLEUE DE BAKER

Zone 2b. H. : 16 m. L. : 4,00 m. Port conique, légèrement irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles piquantes, bleues toute l'année, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Blue Pearl'**

ÉPINETTE DU COLORADO 'BLUE PEARL'

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu perle intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Fastigiata'**

ÉPINETTE DU COLORADO FASTIGIÉE

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleues, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Fat Albert'**

ÉPINETTE DU COLORADO 'FAT ALBERT'

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Glauca'**

ÉPINETTE BLEUE DU COLORADO

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses très bleutées. Aiguilles piquantes, glauque à vert, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Picea pungens* 'Glauca Globosa'** ÉPINETTE BLEUE NAIN

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier devenant pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu argenté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, régulier.]

***Picea pungens* 'Glauca Pendula' (P. p. 'Pendula')** ÉPINETTE BLEUE PLEUREUSE

Zone 3a. H. : 1,70 m. L. : 1,00 m. Port pleureur, irrégulier. Tige principale semi-érigée. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles piquantes, glauques, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Hoopsii'** ÉPINETTE BLEUE DE HOOPSE

■ Zone 2b. H. : 15 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu très intense, toute l'année, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Iseli Fastigiata'** ÉPINETTE BLEUE 'ISELI FASTIGIATE'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu acier, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Iseli Foxtail'** ÉPINETTE BLEUE 'ISELI FOXTAIL'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges plus ou moins tordues. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Koster'** ÉPINETTE BLEUE DE KOSTER

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu argenté. Aiguilles piquantes, bleues, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Mesa Verde'** ÉPINETTE DU COLORADO 'MESA VERDE'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Mission Blue'** ÉPINETTE BLEUE 'MISSION BLUE'

Zone 3a. H. : 16 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu brillant, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Moerheimii'** ÉPINETTE BLEUE DE MOERHEIM

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, glauque bleuté, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.



***Picea pungens* 'Montgomery' (*P. p.* 'R.H. Montgomery')**

ÉPINETTE BLEUE 'MONTGOMERY'

Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, gris bleu, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Mrs Cesarini'**

ÉPINETTE DU COLORADO 'MRS CESARINI'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert tendre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Procumbens'**

ÉPINETTE BLEUE RAMPANTE

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier.]

***Picea pungens* 'Royal Knight'**

ÉPINETTE BLEUE 'ROYAL KNIGHT'

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 6,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu argenté, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Saint Mary's Broom' ÉPINETTE BLEUE 'SAINT MARY'S BROOM'**

2

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, régulier, plat sur le dessus avec l'âge. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleues, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Shilo Weeping'**

ÉPINETTE DU COLORADO 'SHILO WEEPING'

3

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur. Tige principale érigée, Branches et rameaux pleureurs. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu acier, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Picea pungens* 'Thomsen' (*P. p.* *Thompseni* ; *P. p.* 'Thompsen')**

ÉPINETTE BLEUE DE THOMSEN

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu argenté intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Picea pungens 'Thume' (*P. p.* 'Thuem') ÉPINETTE DU COLORADO 'THUME'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu très intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

Picea pungens 'Tiffin' ÉPINETTE DU COLORADO 'TIFFIN'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Pinus densiflora 'Globosa' PIN ROUGE JAPONAIS GLOBE

1 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, dense. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus densiflora 'Little Christopher' PIN ROUGE JAPONAIS 'LITTLE CHRISTOPHER'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert brillant, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus densiflora 'Oculus Draconis' PIN ROUGE JAPONAIS 'OCULUS DRACONIS'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes tachetées de jaune, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus densiflora 'Pendula' PIN ROUGE JAPONAIS PLEUREUR

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur (avec tuteur), dense. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes, femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Pinus densiflora 'Soft Green' PIN ROUGE JAPONAIS 'SOFT GREEN'

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, plat au dessus. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert brillant, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.



***Pinus nigra* 'Hornbrookiana'** PIN NOIR 'HORNIBROOKIANA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.

***Pinus parviflora* 'Glauca Nana'** PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ NAIN

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Glauca'** PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Goldilocks'** PIN BLANC JAPONAIS 'GOLDILOCKS'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles droites ou tordues, bleutées tachetées de jaune, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Tempelhof'** PIN BLANC JAPONAIS 'TEMPELHOF'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, ouvert. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus strobus PIN BLANC

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté marquées de points blancs, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Blue Shag'** PIN BLANC 'BLUE SHAG'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Pinus strobus* 'Contorta' (P. s. 'Torulosa')**

PIN BLANC TORTUEUX

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches et rameaux tortueux. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, argentées dessous, tordues, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Golden Candles'** PIN BLANC 'GOLDEN CANDLES'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, pyramidal. Jeunes pousses jaunes. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Nana'** PIN BLANC NAIN

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair bleuté. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,75 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Pinus strobus 'Pendula'

PIN BLANC PLEUREUR

Zone 4b. H. : 70 cm. L. : 3,00 m. Port bas aux branches rampantes. Tiges tortueuses. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur.]

Pinus strobus 'Pygmaea'

PIN BLANC 'PYGMAEA'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes légèrement bleutées, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Pinus strobus 'Sea Urchin'

PIN BLANC 'SEA URCHIN'



Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleutées, grises dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Pinus strobus 'White Mountain'

PIN BLANC 'WHITE MOUNTAIN'

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu poudre, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus sylvestris

PIN SYLVESTRE

Zone 2b. H. : 18 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal, puis large et arrondi. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus sylvestris 'Albyn Prostrata' (*P. s.* 'Albyn'; *P. s.* 'Albyn's')

PIN SYLVESTRE 'ALBYN PROSTRATA'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

Pinus sylvestris 'Aurea'

PIN SYLVESTRE DORÉ

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert jaunâtre en été, jaunes en hiver, jaune pâle au printemps, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus sylvestris 'Beuvronensis'

PIN SYLVESTRE 'BEUVRONENSIS'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus sylvestris 'Bonna'

PIN SYLVESTRE 'BONNA'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, bleu argenté, odorantes. Écorce brun cannelle. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus sylvestris 'Fastigiata'

PIN SYLVESTRE FASTIGIÉ

Zone 5b. H. : 7,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, bleu vert, odorantes. Écorce rouge. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.



***Pinus sylvestris* 'Glauca Nana'** PIN SYLVESTRE GLAUQUE NAIN

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne. Pousses bleu argenté intense. Aiguilles piquantes, bleu glauque, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi.]

***Pinus sylvestris* 'Globosa Viridis'** PIN SYLVESTRE 'GLOBOSA VIRIDIS'

2 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, légèrement tordues, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus sylvestris* 'Hillside Creeper'** PIN SYLVESTRE 'HILLSIDE CREEPER'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, puis jaunâtres en hiver, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus sylvestris* 'Mitsch Weeping'** PIN SYLVESTRE 'MITSCH WEEPING'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port semi-érigé. Branches tordues, semi-pleureuses. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus sylvestris* 'Repens'** PIN SYLVESTRE RAMPANT

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert bleuté intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus sylvestris* 'Viridis Compacta'** PIN SYLVESTRE 'VIRIDIS COMPACTA'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, dense. Tiges tordues. Feuillage de texture fine. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus sylvestris* 'Watereri'** PIN SYLVESTRE 'WATERERI'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal puis arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses gris bleuté. Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Écorce orangée. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Taxus cuspidata* 'Aurescens'** IF DU JAPON DORÉ

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Aiguilles jaunâtres devenant vertes. Coloration automnale vert foncé. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Taxus cuspidata 'Dwarf Bright Gold' (T. c. 'Bright Gold')

IF DU JAPON 'DWARF BRIGHT GOLD'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles jaune d'or. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

PLANTES GRIMPANTES

Celastrus scandens

BOURREAU DES ARBRES

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge (sur les plants femelles). Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plant mâle allergène (troubles respiratoires).

Celastrus orbiculatus 'Diana'

BOURREAU DES ARBRES 'DIANA'

1 Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs femelles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Celastrus orbiculatus 'Hercules'

BOURREAU DES ARBRES 'HERCULES'

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs mâles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Plant allergène (troubles respiratoires).

Clematis virginiana

CLÉMATITE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs sur les plants femelles. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

ROSIERS

Rosa acicularis

ROSIER ACICULAIRE

Plante indigène. Zone 1b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, drageonnant. Tiges épineuses. Feuillage vert mat. Fleurs solitaires, simples, roses, moyennement parfumées. Floraison au printemps.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Sambucus canadensis 'Aurea'

SUREAU DU CANADA DORÉ

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert brillant. Feuilles jaune à jaune verdâtre toute la saison. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus canadensis 'Maxima'

SUREAU DU CANADA 'MAXIMA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).



PLANTES GRIMPANTES

***Wisteria macrostachya* 'Aunt Dee'** GLYCINE 'AUNT DEE'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Fleurs lilas pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Paxistima canbyi (*Pachistima canbyi*)

PACHISTIMA DE CANBY

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,25 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | sec à très humide

ARBUSTES

Vaccinium corymbosum

BLEUET EN CORYMBE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Tiges gris brun. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, jaune orange à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies bleu foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Exochorda x macrantha* 'The Bride'** EXOCHORDE 'THE BRIDE'

3 Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, semi-pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

Juniperus pingii

GENÉVRIER PINGII

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Rameaux pleureurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes, odorantes. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

***Juniperus squamata* 'Blue Carpet'** GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'BLUE CARPET'

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles très piquantes, bleu argenté intense, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus squamata* 'Blue Star'** GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'BLUE STAR'

1 Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles très piquantes, bleu argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]

***Juniperus squamata* 'Holger'** GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'HOLGER'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunâtres. Aiguilles très piquantes, bleutées, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus squamata* 'Meyeri'** GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'MEYERI'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, très irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles très piquantes, bleu argenté, odorantes. Coloration automnale rougeâtre. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | humide

CONIFÈRES

Thuja standishii

CÈDRE DU JAPON

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert pâle, grisâtres dessous, odorantes. Coloration automnale. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | très alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Cornus mas

CORNOUILLER MÂLE

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

***Cornus mas* 'Aurea'**

CORNOUILLER MÂLE DORÉ

2 Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaunes, vert chartreuse en été. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

***Cornus mas* 'Variegata'**

CORNOUILLER MÂLE PANACHÉ

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | sec

ROSIERS

***Rosa x centifolia* 'Fantin-Latour'**

ROSIER 'FANTIN-LATOURE'

3 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches peu épineuses. Feuillage vert foncé, semi-mat. Boutons rose foncé. Fleurs en grappes, doubles, rose pâle doux, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

***Rosa x centifolia* 'Prolifera de Redouté'**

ROSIER 'PROLIFERA DE REDOUTÉ'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges vert très foncé. Épines brunes. Feuillage vert foncé grisâtre. Fleurs simples, rose profond clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

***Rosa x centifolia* 'Rose de Meaux'**

ROSIER 'ROSE DE MEAUX'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact et érigé. Tiges à grosses épines. Feuillage vert sombre. Petites fleurs doubles, rose argenté, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Gloire des Mousseux'

ROSIER 'GLOIRE DES MOUSSEUX'

■ Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port compact, régulier. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen, mousseux. Boutons peu mousseux. Fleurs doubles, rose pâle, plus foncé au centre, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Henri Martin'

ROSIER 'HENRI MARTIN'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port très gracieux. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen, odorant. Boutons légèrement mousseux. Fleurs en grappes, doubles, rouge cramoisi clair avec des reflets pourpres, réunies par trois ou quatre, parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Nuits de Young'

ROSIER 'NUITS DE YOUNG'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port compact, régulier. Tiges sans épines. Feuillage vert foncé. Boutons légèrement mousseux, pourpres. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets grenats et aux étamines jaunes visibles, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x damascena 'Botzaris'

ROSIER 'BOTZARIS'

Zone 3b. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs doubles, blanc crème, très parfumées. Floraison au début de l'été.

Rosa x damascena 'Madame Hardy' ROSIER 'MADAME HARDY'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, vigoureux. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes, doubles, blanc pur avec un œil vert au centre. Délicat parfum de citron. Floraison au début de l'été.

Rosa foetida bicolor (R. f. 'Austrian Copper')

ROSIER FÉTIDE BICOLORE

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage vert pâle. Fleurs simples, orange cuivré brillant, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Acer campestre

ÉRABLE CHAMPÊTRE

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune orange en automne. Fruits en samares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

SORBIER À FEUILLES DE CHÊNE

Zone 4a. H. : 8,00 m. L. : 2,50 m. Port colonnaire compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

ARBUSTES

Spiraea prunifolia 'Plena'

SPIRÉE PRUINEUSE À FLEURS DOUBLES

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, jaune orange à pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, doubles. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Spiraea trilobata* 'Swan Lake'** SPIRÉE 'SWAN LAKE'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Viburnum sargentii VIERNE DE SARGENT

Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum sargentii* 'Onondaga'** VIERNE DE SARGENT 'ONONDAGA'

2 Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses marron foncé. Feuilles vert très foncé, jaune rougeâtre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé.]

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Viburnum lantana VIERNE COMMUNE

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis noirs. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum lantana* 'Mohican'** VIERNE COMMUNE 'MOHICAN'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | très humide

ARBRES

Betula nigra

BOULEAU NOIR

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus, glauques dessous, devenant jaunes à l'automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc et rose teintée de noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Betula nigra* 'Heritage'**

BOULEAU NOIR 'HERITAGE'

1 Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus, glauques dessous, devenant jaunes à l'automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc et saumon, teintée de noir, même jeune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Salix babylonica* 'Crispa'**

SAULE PLEUREUR À FEUILLES CRISPÉES

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port pleureur. Rameaux verts. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, enroulées sur elles-mêmes, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Betula nigra* 'Fox Valley' (*B. n.* 'Little King')**

BOULEAU NOIR 'FOX VALLEY'

Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative orange et brun qui s'exfolie. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste aux insectes. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Rhamnus frangula* 'Asplenifolia'**

BOURDAINE À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, très découpées, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges, puis noirs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique (fruits) et allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | très humide

ARBUSTES

Salix cinerea 'Tricolor' (S. c. 'Variegata')

SAULE CENDRÉ TRICOLEURE

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Jeunes tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouges teintées de rose. Feuilles vertes panachées de blanc crème, de jaune et de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier.]

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | lourd | acide à alcalin | humide

ARBUSTES

Viburnum dentatum

VIORNE DENTÉE

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum 'Autumn Jazz' (V. d. 'Ralph Senior')

VIORNE DENTÉE 'AUTUMN JAZZ'

2 Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, puis jaune, orange et rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum 'Blue Muffin' (V. d. 'Christom')

VIORNE DENTÉE 'BLUE MUFFIN'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum 'Chicago Lustre' (V. d. 'Synnestvedt')

VIORNE DENTÉE 'CHICAGO LUSTRE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum 'Perle Bleue' VIORNE DENTÉE 'PERLE BLEUE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Acer tataricum

ÉRABLE DE TARTARIE

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Pyracantha* x 'Yukon Belle'**

BUISSON ARDENT 'YUKON BELLE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vertes, lustrées. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, à odeur désagréable. Fruits rouge orangé, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Potentilla fruticosa

POTENTILLE FRUTESCENTE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Abbotswood'** POTENTILLE 'ABBOTSWOOD'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vert bleuté, foncées. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Coronation Triumph'**

POTENTILLE 'CORONATION TRIUMPH'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vert foncé. Floraison estivale et automnale. Fleurs jaune clair. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Floppy Disk' POTENTILLE 'FLOPPY DISK'

1 Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Fleurs rose soutenu. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Gold Carpet' (*P. f.* 'Goldteppich')
POTENTILLE 'GOLD CARPET'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles gris vert. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune d'or. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' POTENTILLE 'GOLDFINGER'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Grandes fleurs jaune d'or, abondantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Goldstar' POTENTILLE 'GOLDSTAR'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port semi-érigé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune d'or. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Jackman' (*P. f.* 'Jackman's Variety')
POTENTILLE DE JACKMAN

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs jaune d'or. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

Potentilla fruticosa 'Mango Tango' (*P. f.* 'Uman')
POTENTILLE 'MANGO TANGO'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert lustré. Floraison estivale et automnale. Fleurs orange rouge vif à jaune foncé. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'McKay's White'
POTENTILLE 'MCKAY'S WHITE'

2 Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vert gris. Floraison estivale et automnale. Fleurs blanc crème. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Mount Everest'
POTENTILLE 'MOUNT EVEREST'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Orange Whisper'
POTENTILLE 'ORANGE WHISPER'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Petites fleurs orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Potentilla fruticosa 'Orangeade' POTENTILLE 'ORANGEADE'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs orange foncé. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Pink Whisper' POTENTILLE 'PINK WHISPER'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, ovoïde. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches teintées de rose foncé. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Red Robin' (*P. f.* 'Marrob')

POTENTILLE 'RED ROBIN'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouges tournant à l'orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Snowbird' POTENTILLE 'SNOWBIRD'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, cuivre en automne. Floraison estivale et automnale. Fleurs semi-doubles, blanches. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Sundance' POTENTILLE 'SUNDANCE'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs doubles, jaunes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Yellow Bird' POTENTILLE 'YELLOW BIRD'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, lustrées. Floraison estivale. Fleurs semi-doubles, jaune d'or. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Yellow Gem' POTENTILLE 'YELLOW GEM'

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Grandes fleurs jaunes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

ROSIERS

Rosa x alba 'Blush Hip' ROSIER 'BLUSH HIP'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, vigoureux. Feuillage vert, coriace. Fleurs doubles, rose clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x alba 'Pompon Blanc Parfait' ROSIER 'POMPON BLANC PARFAIT'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage fin, lisse, vert clair à reflets cendrés. Fleurs doubles, blanc à léger reflet lilas.

Rosa x alba 'White Rose of York' ROSIER 'WHITE ROSE OF YORK'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage dense, vert à reflets gris bleuté. Fleurs semi-doubles à doubles, blanc immaculé satin et aux étamines jaune d'or, très parfumées. Floraison printanière. Fruits ovales, rouge écarlate.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | sec

CONIFÈRES

Juniperus davurica 'Expansa' GÉNÉVRIER DAVURICA 'EXPANSA'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert clair à reflets bleutés, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite). Pour jardinier averti.

ROSIERS

Rosa multiflora ROSIER MULTIFLORE

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 3,00 m. Port lâche. Tiges sans épines. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes, simples, blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges. Souvent utilisé comme porte-greffe.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Pyrus calleryana 'Aristocrat' POIRIER 'ARISTOCRAT'

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, rouge brillant en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Pyrus calleryana 'Bradford' POIRIER 'BRADFORD'

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal, puis arrondi. Sans épines. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, puis rouge pourpre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Pyrus calleryana 'Chanticleer' POIRIER 'CHANTICLEER'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Sans épines. Feuilles vertes, lustrées, rouge brillant avec des reflets pourpres en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Pyrus calleryana 'Redspire' POIRIER 'REDSPIRE'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port colonnaire large. Sans épines. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, puis jaune orange en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Pyrus calleryana 'Capital' POIRIER 'CAPITAL'

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, rouge pourpre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

ARBUSTES

Berberis thunbergii 'Cherry Bomb' (*B. t.* 'Monomb')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CHERRY BOMB'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouge pourpre. Feuilles rouge cramoisi, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Concorde' ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CONCORDE'

1 Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge pourpre velouté, verdâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Emerald Carrousel' (*B. t.* 'Tara')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'EMERALD CARROUSEL'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé avec une ligne jaune autour de la feuille, rouge mauve en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Jade Carrousel' (*B. t.* 'Bailgreen')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'JADE CARROUSEL'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert pâle. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Rose Glow' (*B. t.* 'Ida')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROSE GLOW'

Zone 4a. H. : 1,40 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouges tachetées de rose et de rose pâle. Feuillage pourpre rosé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge rosé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Royal Burgundy' (*B. t.* 'Gentry')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL BURGUNDY'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge vin, rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vin. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Royal Cloak' ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL CLOAK'

2 Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, semi-pleureur. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles rouge pourpre foncé, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.



***Berberis thunbergii* 'Ruby Carrousel'** (*B. t.* 'Bailone')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'RUBY CARROUSEL'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,10 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles pourpre foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Hibiscus syriacus* 'Aphrodite'**

MAUVE EN ARBRE 'APHRODITE'

3

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose foncé avec un œil rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Diana'**

MAUVE EN ARBRE 'DIANA'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs simples, blanches. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Minerva'**

MAUVE EN ARBRE 'MINERVA'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose lavande au cœur rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Oiseau Bleu' (*H. s.* 'Blue Bird')**

MAUVE EN ARBRE 'OISEAU BLEU'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, bleu ciel. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Red Heart'**

MAUVE EN ARBRE 'RED HEART'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, blanches au cœur écarlate. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Rosalbane'**

MAUVE EN ARBRE 'ROSALBANE'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rose mauve. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

***Hibiscus syriacus* 'White Chiffon'** (*H. s.* 'Notwoodtwo')

MAUVE EN ARBRE 'WHITE CHIFFON'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs semi-doubles, blanches. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Hibiscus syriacus* 'Woodbridge'** MAUVE EN ARBRE 'WOODBRIDGE'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose au cœur rouge. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.

***Weigela florida* 'Purpurea'** WEIGELA À FEUILLES POURPRES

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre sombre. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

***Weigela florida* 'Variegata'** WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES

1 Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,75 m. L. : 1,75 m. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

***Weigela florida* 'Variegata Nana'** WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES NAIN

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

CONIFÈRES

Abies koreana SAPIN DE CORÉE

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert brillant, blanchâtres dessous, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Abies koreana* 'Horstmann's Silberlocke'** (*A. k.* 'Silberlocke') SAPIN DE CORÉE 'HORSTMANN'S SILBERLOCKE'

2 Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert brillant, tournant sur elles-mêmes et laissant voir le dessous blanc argenté, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Abies koreana* 'Prostrate Beauty'** SAPIN DE CORÉE 'PROSTRATE BEAUTY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches horizontales. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert brillant, blanchâtres dessous, odorantes. Fruits violacés, hâtifs. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Abies koreana* 'Silver Show'** SAPIN DE CORÉE 'SILVER SHOW'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert brillant, tournant légèrement sur elles-mêmes et laissant voir le dessous blanc argenté, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Abies koreana 'Starker's Dwarf' SAPIN DE CORÉE 'STARKER'S DWARF'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea orientalis 'Shadow's Broom' ÉPINETTE D'ORIENT 'SHADOW'S BROOM'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

ARBRES

Crataegus crus-galli

AUBÉPINE ERGOT DE COQ

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port étalé à cime aplatie. Tiges très épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant, puis orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution.

Crataegus crus-galli inermis

AUBÉPINE ERGOT DE COQ SANS ÉPINES

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port étalé à cime aplatie. Aucune épine. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant, puis orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution.

CONIFÈRES

Thuja occidentalis


CÈDRE DU CANADA

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Boisbriand'

CÈDRE DU CANADA 'BOISBRIAND'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

Thuja occidentalis 'Brabant' CÈDRE DU CANADA 'BRABANT'

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, puis vert éclatant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Caespitosa' CÈDRE DU CANADA 'CAESPITOSA'

Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Danica' CÈDRE DU CANADA 'DANICA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, puis vert émeraude brillant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Dart's Gold' CÈDRE DU CANADA 'DART'S GOLD'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune d'or tout l'été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Degroot's Spire' CÈDRE DU CANADA 'DEGROOT'S SPIRE'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire étroit, en spirale. Feuillage de texture dense. Aiguilles en spirale, vert clair, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Europe Gold' CÈDRE DU CANADA 'EUROPE GOLD'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré tout l'été, odorantes. Coloration automnale rousse, puis vert foncé au printemps. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Filiformis' CÈDRE DU CANADA FILIFORME

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert brillant, vert jaunâtre en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Golden Globe' CÈDRE DU CANADA 'GOLDEN GLOBE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré, jaune foncé en été et en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Hetz Midget' CÈDRE DU CANADA 'HETZ MIDGET'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Holmstrup'** CÈDRE DU CANADA 'HOLMSTRUP'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Little Giant'** CÈDRE DU CANADA 'LITTLE GIANT'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair brillant, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]

***Thuja occidentalis* 'Lutea' (T. o. 'Aurea')**

CÈDRE DU CANADA DORÉ

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune d'or tout l'été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Nigra'** CÈDRE DU CANADA NOIR

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé toute l'année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Pendula'** CÈDRE DU CANADA PLEUREUR

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, rameaux retombants.]

***Thuja occidentalis* 'Pyramidalis' (T. o. 'Brandon')**

CÈDRE DU CANADA PYRAMIDAL

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Sherwood Frost'**

CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD FROST'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair avec des taches de blanc crème, brillantes. Aiguilles vert et blanc crème, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Sherwood Moss'**

CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD MOSS'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Smaragd' (T. o. 'Emerald')**

CÈDRE DU CANADA 'SMARAGD'

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit, très régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert émeraude toute l'année. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Snowtip' CÈDRE DU CANADA 'SNOWTIP'**

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé panachées de blanc, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Thuja occidentalis* 'Spiralis' CÈDRE DU CANADA 'SPIRALIS'**

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses en spirale. Aiguilles vert foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Techny' (T. o. 'Mission')**

CÈDRE DU CANADA 'TECHNY'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé toute l'année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Teddy' CÈDRE DU CANADA 'TEDDY'**

1 Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Thuja occidentalis* 'Tiny Tim' CÈDRE DU CANADA 'TINY TIM'**

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Thuja occidentalis* 'Unicorn' CÈDRE DU CANADA 'UNICORN'**

2 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 90 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert très foncé, odorantes. Coloration automnale vert olive. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Wansdyke Silver'**

CÈDRE DU CANADA 'WANSDYKE SILVER'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port conique compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes panachées de jaune et de crème, odorantes. Coloration automnale jaune cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Wareana Lutescens' (T. o. 'Wareana Aurea')**

CÈDRE DU CANADA 'WAREANA LUTESCENS'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune crème, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Thuja occidentalis* 'Wareana'** (*T. o.* 'Robusta')

CÈDRE DU CANADA 'WAREANA'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert brillant tout l'été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Woodwardii'** CÈDRE DU CANADA EN BOULE

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,30 m. Port globulaire, puis ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Yellow Ribbon'** CÈDRE DU CANADA 'YELLOW RIBBON'

3 Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune orangé. Aiguilles vert clair en été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Lonicera involucrata

CHÈVREFEUILLE À INVOLUCRE

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune orange, teintées de rouge. Fruits pourpre foncé à involucre rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Pieris japonica* 'Variegata'**

ANDROMÈDE DU JAPON PANACHÉE

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanc crème et rose. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'April Dawn' RHODODENDRON 'APRIL DAWN'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé tachetées de vert jaunâtre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'April Mist' RHODODENDRON 'APRIL MIST'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose pâle bordées de rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'April Rose' RHODODENDRON 'APRIL ROSE'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose très foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Black Satin' RHODODENDRON 'BLACK SATIN'

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert pâle, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre à gorge corail, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Northern Star Burst'

RHODODENDRON 'NORTHERN STAR BURST'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres, plus pâles au centre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Olga Mezitt' RHODODENDRON 'OLGA MEZITT'

I Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle tachetées de rouge, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM' (R. x 'P.J. Mezitt')

RHODODENDRON 'PJM'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Compact' RHODODENDRON 'PJM COMPACT'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Grandes feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Elite' RHODODENDRON 'PJM ELITE'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



Rhododendron x 'PJM Regal'

RHODODENDRON 'PJM REGAL'

2 Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Victor'

RHODODENDRON 'PJM VICTOR'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston Pink Diamond'

RHODODENDRON 'WESTON PINK DIAMOND'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs semi-doubles, roses, tachetées d'orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston's Aglo' (R. x 'Aglo')

RHODODENDRON 'WESTON'S AGLO'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, lustrées, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre tachetées de rouge cuivre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Caragana aurantiaca

CARAGANA ORANGÉ

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, lâche. Tiges épineuses. Jeunes pousses rouges. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune orangé. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, diffus.]



SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Acer x freemanii 'Autumn Blaze' ÉRABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE'

1 Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge orange en automne. Fruits peu nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Acer x freemanii 'Autumn Fantasy' ÉRABLE DE FREEMAN 'AUTUMN FANTASY'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge clair en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Catalpa bignonioides 'Nana' CATALPA PARASOL

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes en forme de cœur. Pas de fleurs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Catalpa speciosa CATALPA DE L'OUEST

2 Zone 5a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles en forme de cœur. Floraison estivale. Fleurs en panicules, blanches marquées de jaune et de rouge pourpre, parfumées. Fruits en longues gousses. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus excelsior FRÊNE D'EUROPE

Zone 4b. H. : 13 m. L. : 7,00 m. Port arrondi, irrégulier, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits abondants (nuisance). Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus excelsior 'Pendula' FRÊNE D'EUROPE PLEUREUR

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile.

Juglans cinerea NOYER CENDRÉ

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert jaunâtre. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Culture difficile sous la ramure.

Juglans nigra

NOYER NOIR

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 20 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle, luisantes, odorantes. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Culture difficile sous la ramure.

Juglans regia

NOYER COMMUN

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, odorantes. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Culture difficile sous la ramure.

Malus baccata 'Columnaris'

POMMETIER DE SIBÉRIE COLONNAIRE

Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 1,20 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Boutons blanc crème et rose. Fleurs blanches, parfumées. Fruits jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Sensible à la brûlure bactérienne.

Phellodendron amurense

PHELLODENDRON DE L'AMOUR

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 15 m. Port rond, large et irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, jaune doré et cuivre en automne. Fruits noirs, odorants (nuisance). Écorce décorative gris clair et fissurée. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

Phellodendron amurense 'Macho'

PHELLODENDRON DE L'AMOUR 'MACHO'

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, large et irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, jaune doré et cuivre en automne. Pas de fructification. Écorce décorative gris clair et fissurée. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata

TILLEUL À PETITES FEUILLES

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Chancellor' (T. c. 'Chancole')

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CHANCELLOR'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Tige centrale unique. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Corinthian' (T. c. 'Corzam')

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CORINTHIAN'

Zone 3a. H. : 13 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'De Groot'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'DE GROOT'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Golden Cascade'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GOLDEN CASCADE'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, semi-pleureur. Branches descendantes. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Greenspire'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GREENSPIRE'

I Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Tige centrale forte. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Lico'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'LICO'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Tilia cordata 'Ronald' (*T. c.* 'Norlin')

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'RONALD'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia flavescens 'Dropmore'

TILLEUL 'DROPMORE'

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 7,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, vert foncé, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Prunus sargentii

CERISIER DE SARGENT

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge cuivré. Feuilles vertes, puis orange et rouge écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs simples, parfumées. Fruits rouge foncé brillant. Écorce lisse, à lenticelles horizontales, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Sensible à la pollution.

Prunus sargentii 'Rancho'

CERISIER DE SARGENT 'RANCHO'

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge cuivré. Feuilles vertes, puis orange et rouge écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs simples, parfumées. Fruits rouge foncé brillant. Écorce lisse, à lenticelles horizontales, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Sensible à la pollution.

Ulmus glabra 'Camperdownii'

ORME PLEUREUR

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 9,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).



Ulmus rubra

ORME ROUGE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port élané, plat sur le dessus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Calycanthus fertilis

CALYCANTHE FERTILE

2 Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Corylus avellana

NOISETIER COMMUN

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Corylus avellana* 'Contorta'**

NOISETIER CHINOIS TORTUEUX

Zone 5a. H. : 1,75 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Rameaux spiralées et tortueux. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port globulaire irrégulier.]

***Corylus avellana* 'Rote Zeller' (C. a. 'Rote Zellernut'; C. maxima 'Red Filibert')**

NOISETIER COMMUN 'ROTE ZELLER'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge vin. Feuilles vert pourpre. Floraison tôt au printemps. Fleurs roses, en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Deutzia x lemoinei* 'Compacta'**

DEUTZIA DE LEMOINE COMPACT

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

***Deutzia* x 'Magician'**

DEUTZIA 'MAGICIAN'

3 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses bordées de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Deutzia x 'Mont Rose' DEUTZIA 'MONT ROSE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose lavande. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Pink Minor' DEUTZIA 'PINK MINOR'

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port arrondi. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Pink-a-Boo' (D. x 'Monzia') DEUTZIA 'PINK-A-BOO'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé au cœur blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x rosea DEUTZIA ROSE

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x rosea 'Carminea' DEUTZIA ROSE CARMIN

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs rose carmin. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Forsythia mandshurica 'Vermont Sun' FORSYTHIA 'VERMONT SUN'

1 Zone 4b. H. : 1,75 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge, jaune et bourgogne en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Philadelphus x 'Blizzard' (P. lewisii 'Blizzard') SERINGAT 'BLIZZARD'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Bouquet Blanc' SERINGAT 'BOUQUET BLANC'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, branches arquées. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc laiteux, semi-doubles, abondantes, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Buckley's Quill' SERINGAT 'BUCKLEY'S QUILL'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle. Floraison au début de l'été. Fleurs doubles, blanc pur, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Frosty Morn' (P. x falconeri 'Frosty Morn') SERINGAT 'FROSTY MORN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Innocence'**

SERINGAT 'INNOCENCE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, tachetées de blanc, de crème ou de jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Miniature Snowflake' (P. x 'Dwarf Snowflake')**

SERINGAT 'MINIATURE SNOWFLAKE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, pétales frangés, parfumés. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Minnesota Snowflake'**

SERINGAT 'MINNESOTA SNOWFLAKE'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc vif, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Silver Showers' (P. x 'Silberregen')**

SERINGAT 'SILVER SHOWERS'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Snow Velvet' (P. *lewisii* 'Snow Velvet')**

SERINGAT 'SNOW VELVET'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps et remontante. Grandes fleurs semi-doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Snowbelle'**

SERINGAT 'SNOWBELLE'

3 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs très doubles, blanc pur, très abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

***Philadelphus* x 'Snowgoose'**

SERINGAT 'SNOWGOOSE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Virginal' (*P. x virginalis* 'Virginal')**

SERINGAT BLANC

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]

***Philadelphus* x 'Waterton' (*P. lewisii* 'Waterton')**

SERINGAT 'WATERTON'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus* x 'White Rock' (*P. tomentosus* 'White Rock'; *P. x 'Pekhill')

SERINGAT 'WHITE ROCK'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Yellow Hill'**

SERINGAT 'YELLOW HILL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

PLANTES GRIMPANTES

Humulus lupulus

HOUBLON DÉCORATIF

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Humulus lupulus* 'Aureus'**

HOUBLON DÉCORATIF DORÉ

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d'or puis jaune chartreuse. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.



SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Acer nigrum

ÉRABLE NOIR

Plante indigène. Zone 5b. H. : 30 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement profond et étalé. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Abrite et nourrit les oiseaux.

Celtis occidentalis

MICOCOULIER OCCIDENTAL

Plante indigène. Zone 3b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair lustré, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fruits pourpre foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Acer negundo* 'Flamingo'**

ÉRABLE À GIGUÈRE 'FLAMINGO'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses toute la saison. Feuilles vert tendre bordées de rose pâle puis de blanc crème. Feuillage jaune orangé en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Acer negundo* 'Kelly's Gold'**

ÉRABLE À GIGUÈRE 'KELLY'S GOLD'

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d'or, vert chartreuse en été, puis jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Acer negundo* 'Variegatum'**

ÉRABLE À GIGUÈRE PANACHÉ

1 Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

PLANTES GRIMPANTES

***Clematis viticella* 'Abundance'**

CLÉMATITE VITICELLA 'ABUNDANCE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge foncé à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Blue Belle'**

CLÉMATITE VITICELLA 'BLUE BELLE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Étoile Violette'**

CLÉMATITE VITICELLA 'ÉTOILE VIOLETTE'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs violet pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Kermesina' (C. v. 'Rubra')**

CLÉMATITE VITICELLA 'KERMESINA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge vin foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Minuet'**

CLÉMATITE VITICELLA 'MINUET'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc crème avec une marge magenta. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Polish Spirit'**

CLÉMATITE VITICELLA 'POLISH SPIRIT'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis viticella* 'Purpurea Plena Elegans'**

CLÉMATITE VITICELLA 'PURPUREA PLENA ELEGANS'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, pourpres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | très humide

ARBUSTES

Salix viminalis

OSIER DES VANNIERS

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, régulier. Branches souples, vert olive ou jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons jaunâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | meuble | neutre | sec

ARBUSTES

Hydrangea quercifolia

HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea quercifolia* 'Alice'**

HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'ALICE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea quercifolia* 'Snowflake'** HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'SNOWFLAKE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs doubles en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Gymnocladus dioica

CHICOT DU CANADA

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi étroit, puis étalé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rosées. Feuilles vert vif, puis jaunes en automne. Pétioles persistants sur la plante en automne. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative, grise, qui s'exfolie. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution. Fruits toxiques. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Malus* x 'Brandywine'**

POMMETIER 'BRANDYWINE'

Zone 4. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuilles vert foncé, rehaussées de pourpre. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs rose foncé, très doubles, parfumées. Fruits jaune verdâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au blanc et à la brûlure bactérienne, moyenne à la tavelure et sensible à la rouille.

***Malus* x 'Candied Apple'**

POMMETIER 'CANDIED APPLE'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuilles vertes, rehaussées de rouge. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs roses. Fruits rouge sang vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc et moyenne à la tavelure.

***Malus* x 'Centurion'**

POMMETIER 'CENTURION'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port dressé, presque colonnaire. Feuilles vert pourpre. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rouge rosé. Fruits rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne et au blanc ; bonne à la tavelure et à la rouille.

***Malus* x 'Dolgo'**

POMMETIER 'DOLGO'

Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons blanc rosé. Fleurs blanches. Fruits gros, rouge vif. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la rouille et au blanc ; bonne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.

***Malus* x 'Harvest Gold'**

POMMETIER 'HARVEST GOLD'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port évasé. Feuilles vertes. Floraison à mi-printemps. Boutons rose foncé. Fleurs blanches. Fruits dorés, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Indian Magic' POMMETIER 'INDIAN MAGIC'

1 Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuilles vert foncé et rougeâtre. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé. Fruits d'abord rouges, puis orange, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne et au blanc ; bonne à la rouille et moyenne à la tavelure.

Malus x 'Lollipop' POMMETIER 'LOLLIPOP'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs blanches. Fruits dorés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au blanc ; bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne et à la rouille.

Malus x 'Madonna' POMMETIER 'MADONNA'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé compact. Feuillage bronze puis vert. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, doubles et parfumées. Fruits jaune rougissant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Makamik' POMMETIER 'MAKAMIK'

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuilles rougeâtres puis vert bronze. Floraison printanière. Boutons rouge foncé. Fleurs rose foncé. Fruits rouge clair et orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure et à la rouille ; moyenne au blanc et à la brûlure bactérienne.

Malus x 'Maybride' POMMETIER 'MAYBRIDE'

Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches doubles. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Molten Lava' POMMETIER 'MOLTEN LAVA'

Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 4,50 m. Port pleureur. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs simples, blanches. Fruits rouge orangé. Écorce jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la rouille ; bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne et au blanc.

Malus x 'Royal Beauty' POMMETIER 'ROYAL BEAUTY'

2 Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuilles pourpre à bronze. Floraison printanière. Fleurs rose foncé. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Royal Splendor' POMMETIER 'ROYAL SPLENDOR'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuilles rouge lustré. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.



Malus x 'Rudolph'

POMMETIER 'RUDOLPH'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port érigé, arrondi. Feuilles luisant bronzé toute la saison. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs rouge clair. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Sir Lancelot'

POMMETIER 'SIR LANCELOT'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs blanc pur. Fruits jaune orangé, persistants longtemps. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure ; bonne à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Snowdrift'

POMMETIER 'SNOWDRIFT'

Zone 4. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port dense et symétrique. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Boutons rouge rosé. Fleurs blanches. Fruits orange rougeâtre, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au blanc ; bonne à la tavelure, à la rouille et à la brûlure bactérienne.

Malus x 'Spring Snow'

POMMETIER 'SPRING SNOW'

Zone 4a. H. : 8,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, parfumées. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la rouille et au blanc ; moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.

Malus x 'Sugar Tyme'

POMMETIER 'SUGAR TYME'

3 Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rose pâle. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x 'Thunderchild'

POMMETIER 'THUNDERCHILD'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port en vase. Feuilles pourpre foncé, presque mauves. Floraison printanière. Fleurs simples, roses. Fruits petits, rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc ; bonne à la tavelure.

Malus x 'Wintergold'

POMMETIER 'WINTERGOLD'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, large. Feuilles vertes. Floraison à la mi-printemps. Boutons rose foncé. Fleurs blanches. Fruits jaunes, rehaussés d'orange ou de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la rouille ; bonne au blanc ; moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.

ARBUSTES

Aralia elata

ARALIE DU JAPON

■ Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Branches très épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, parfois envahissant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Calycanthus floridus

ARBRE DE POMPADOUR

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, grisâtres dessous, jaunes en automne. Feuilles odorantes. Floraison printanière. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Deutzia gracilis

DEUTZIA GRACILE

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

***Deutzia gracilis* 'Nikko'**

DEUTZIA GRACILE 'NIKKO'

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port rampant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, doubles, brillantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

***Fraxinus excelsior* 'Crispa'**

FRÊNE À FEUILLAGE CRISPÉ

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles crispées, vert foncé, jaunes en automne. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port arrondi.]

Hydrangea heteromalla

HYDRANGÉE HETEROMALLA

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs jaunes stériles avec des fleurs blanches fertiles. Sèchent sur le plant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Prunus triloba* 'Multiplex'**

FAUX AMANDIER À FLEURS DOUBLES

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs très doubles, rose vif à étamines jaunes. Écorce décorative rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

Sambucus nigra

SUREAU NOIR

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, odorantes (désagréable), jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits en baies noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Aureomarginata'** SUREAU NOIR À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, plus ou moins bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).



***Sambucus nigra* 'Black Beauty' (S. n. 'Gerda')**

SUREAU NOIR 'BLACK BEAUTY'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé toute la saison. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, parfumées (citron). Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Guincho Purple' (S. n. 'Purpurea')**

SUREAU NOIR À FEUILLES POURPRES

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert bronze, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Laciniata'**

SUREAU NOIR À FEUILLES LACINIÉES

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, très découpées, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Marginata' (S. n. 'Albomarginata')**

SUREAU ARGENTÉ

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, panachées d'argent. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Pulverulenta'**

SUREAU NOIR 'PULVERULENTA'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, tachetées de blanc. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Spiraea* x 'Snow White'**

SPIRÉE 'SNOW WHITE'

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea x 'Summersnow'

SPIRÉE 'SUMMERSNOW'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa josikaea

LILAS DE HONGRIE

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous. Floraison au début de l'été. Fleurs mauve violet, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa josikaea 'Holger'

LILAS DE HONGRIE 'HOLGER'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Weigela x 'Bristol Ruby'

WEIGELA 'BRISTOL RUBY'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge carmin. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Bristol Snowflake'

WEIGELA 'BRISTOL SNOWFLAKE'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Carnaval' (W. x 'Carnival'; W. x 'Courtalor')

WEIGELA 'CARNAVAL'

1 Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Grandes fleurs rose très foncé, rose pâle ou blanches, bordées de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'French Lace' (W. x 'Brigela') WEIGELA 'FRENCH LACE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes panachées de jaune. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Java Red'

WEIGELA 'JAVA RED'

2 Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre bronzé. Floraison printanière. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Lucifer' (W. x 'Courtared') WEIGELA 'LUCIFER'

Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge très vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Midnight Wine' (W. x 'Elvera')

WEIGELA 'MIDNIGHT WINE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge vin pourpre. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.



Weigela x 'Minuet'

WEIGELA 'MINUET'

3 Zone 3a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port bas, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vertes aux reflets bronze clair. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose à pourpre, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Nain Rouge' (W. x 'Courtanin'; W. x 'Saphir')

WEIGELA 'NAIN ROUGE'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port compact, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge vif en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges nuancées d'orange, abondantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Pink Delight'

WEIGELA 'PINK DELIGHT'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Pink Princess'

WEIGELA 'PINK PRINCESS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Polka'

WEIGELA 'POLKA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Grandes fleurs rose foncé, rose pastel à l'intérieur, au centre jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Red Prince'

WEIGELA 'RED PRINCE'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

Weigela x 'Ruby Queen'

WEIGELA 'RUBY QUEEN'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge vin foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Rumba'

WEIGELA 'RUMBA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose pourpre à rose foncé, abondantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

SOLEIL
SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Weigela x 'Samba'

WEIGELA 'SAMBA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpres aux reflets verts. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Sunny Princess'

WEIGELA 'SUNNY PRINCESS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs roses, abondantes, légèrement odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Suzanne'

WEIGELA 'SUZANNE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches ou roses, abondantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Tango'

WEIGELA 'TANGO'

I Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Victoria'

WEIGELA 'VICTORIA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge bronzé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'White Knight'

WEIGELA 'WHITE KNIGHT'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été, très remontante. Fleurs blanches à reflets roses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Wine & Roses' (W. x 'Alexandra')

WEIGELA 'WINE & ROSES'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé très intense. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé intense. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.



PLANTES GRIMPANTES

Aristolochia macrophylla (*A. durior*; *A. siphon*)

ARISTOLOCHE

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes en forme de cœur. Fleurs jaunâtres, ressemblant à des pipes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Abrite les oiseaux.

Clematis x 'Anna Louise' (C. 'Evithree')

CLÉMATITE 'ANNA LOUISE'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rouges avec des lignes rouge écarlate. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Arabella'

CLÉMATITE 'ARABELLA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petite fleurs aux pétales étroits, bleutés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Barbara Jackman'

CLÉMATITE 'BARBARA JACKMAN'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs mauves avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Bees Jubilee'

CLÉMATITE 'BEES JUBILEE'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pâle et blanc à étamines brun clair. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Belle of Woking'

CLÉMATITE 'BELLE OF WOKING'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, mauves. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Blue Light'

CLÉMATITE 'BLUE LIGHT'

2 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Blue Ravine'

CLÉMATITE 'BLUE RAVINE'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleues. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Carnaby'

CLÉMATITE 'CARNABY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs simples, blanches à larges bandes roses. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Comtesse de Bouchaud' CLÉMATITE 'COMTESSE DE BOUCHAUD'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Crimson King' CLÉMATITE 'CRIMSON KING'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en étoiles, rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Doctor Ruppel' CLÉMATITE 'DOCTOR RUPPEL'

I Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre, bordées de rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Duchess of Edinburgh' CLÉMATITE 'DUCHESS OF EDINBURGH'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfois simples, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x *durandii* CLÉMATITE DE DURAND

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Elsa Späth' (C. 'Xerxes') CLÉMATITE 'ELSA SPÄTH'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande, étamines rouge chocolat. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ernest Markham' CLÉMATITE 'ERNEST MARKHAM'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rouge pourpre à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Fair Rosamond' CLÉMATITE 'FAIR ROSAMOND'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc crème à étamines rouge très foncé, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Fireworks' CLÉMATITE 'FIREWORKS'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs mauves, à larges lignes rouges. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'General Sikorski' CLÉMATITE 'GENERAL SIKORSKI'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleues à étamines jaune d'or. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Gipsy Queen' CLÉMATITE 'GIPSY QUEEN'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé velouté à étamines pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



***Clematis* x 'Hagley Hybrid' (C. x 'Pink Chiffon')**

CLÉMATITE 'HAGLEY HYBRID'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Haku-ōkan'**

CLÉMATITE 'HAKU-ŌKAN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre à revers crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Henryi'**

CLÉMATITE 'HENRYI'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches, étamines pourprées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'H.F. Young'**

CLÉMATITE 'H.F. YOUNG'

2 Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleues à étamines crème. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Huldine'**

CLÉMATITE 'HULDINE'

3 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches avec des stries roses au revers des pétales. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Jackmanii'**

CLÉMATITE 'JACKMANII'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu violacé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Jackmanii Superba'**

CLÉMATITE 'JACKMANII SUPERBA'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleu violacé foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'John Huxtable'**

CLÉMATITE 'JOHN HUXTABLE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs blanc pur à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'John Warren'**

CLÉMATITE 'JOHN WARREN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pastel, avec des lignes plus foncé au centre des pétales. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Kardynal Wyszynski'** CLÉMATITE 'KARDYNAL WYSZYNSKI'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Ken Donson'** CLÉMATITE 'KEN DONSON'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Lady Betty Balfour'** CLÉMATITE 'LADY BETTY BALFOUR'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin de l'été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis macropetala* 'Blue Bird'** CLÉMATITE 'BLUE BIRD'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu mauve. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis macropetala* 'Jan Lindmark'**
CLÉMATITE 'JAN LINDMARK'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, mauve pourpre. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis macropetala* 'Lagoon' (C. m. 'Blue Lagoon')**
CLÉMATITE 'LAGOON'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis macropetala* 'Maidwell Hall'**
CLÉMATITE 'MAIDWELL HALL'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu très foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis macropetala* 'Markham's Pink'**
CLEMATIS 'MARKHAM'S PINK'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, roses. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Madame Baron Veillard'** CLÉMATITE 'MADAME BARON VEILLARD'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rose lilas. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Madame Grangé'** CLÉMATITE 'MADAME GRANGÉ'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre velouté avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



Clematis x 'Madame Julia Correvon' CLÉMATITE 'MADAME JULIA CORREVEON'

1 Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge vif aux pétales légèrement incurvés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Marie Boisselot' (C. 'Madame Le Coultre')

CLÉMATITE 'MARIE BOISSELOT'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs blanc pur. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Miss Bateman'

CLÉMATITE 'MISS BATEMAN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches aux étamines rouge foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Mrs Cholmondeley'

CLÉMATITE 'MRS CHOLMONDELEY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, bleu pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Mrs. N. Thompson'

CLÉMATITE 'MRS. N. THOMPSON'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre clair avec des lignes pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Multi Blue'

CLÉMATITE 'MULTI BLUE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, bleu acier dessus, argentées dessous, aux étamines très nombreuses. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Niobe'

CLÉMATITE 'NIOBE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge très sombre à étamines jaune clair. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Pink Champagne' (C. 'Kakio')

CLÉMATITE 'PINK CHAMPAGNE'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rose foncé au centre rose pâle, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Pink Fantasy' CLÉMATITE 'PINK FANTASY'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose saumoné. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Proteus' CLÉMATITE 'PROTEUS'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs doubles, parfois semi-doubles ou simples, rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ramona' (C. x 'Hybrida Sieboldii')
CLÉMATITE 'RAMONA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande à étamines rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Rouge Cardinal' CLÉMATITE 'ROUGE CARDINAL'

I Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre foncé, étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Royalty' CLÉMATITE 'ROYALTY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs semi-doubles, parfois simples, mauves. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ruby Glow' CLÉMATITE 'RUBY GLOW'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Serenata' CLÉMATITE 'SERENATA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé à lignes rouge pourpre, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Star of India' CLÉMATITE 'STAR OF INDIA'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Sunset' CLÉMATITE 'SUNSET'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge vif avec une ligne rouge vif intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'The President' CLÉMATITE 'THE PRESIDENT'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Victoria'

CLÉMATITE 'VICTORIA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ville de Lyon'

CLÉMATITE 'VILLE DE LYON'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge carmin, étamines jaune orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Vino' (C. x 'Poulvo')

CLÉMATITE 'VINO'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge rosé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Violet Elizabeth'

CLÉMATITE 'VIOLET ELIZABETH'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Vyvyan Pennell'

CLÉMATITE 'VYVYAN PENNELL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfois semi-doubles, pourpre, mauve et bleu. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Warsaw Nike' (C. x 'Warszawska Nike')


CLÉMATITE 'WARSAW NIKE'

3 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre velouté avec des étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Will Goodwin'

CLÉMATITE 'WILL GOODWIN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande pâle avec des étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



***Lonicera x brownii* 'Dropmore Scarlet'**

CHÈVREFEUILLE 'DROPMORE SCARLET'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, rouge écarlate, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouge orange. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Lonicera x heckrottii* 'Gold Flame'** CHÈVREFEUILLE 'GOLD FLAME'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Boutons floraux rouges. Fleurs tubulaires rose et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

ROSIE

***Rosa hybrida* 'Altissimo'**

ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'ALTISSIMO'

Non rustique. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port grimpant de type floribunda. Feuillage vert foncé. Grandes fleurs en petites grappes, simples, rouge foncé et aux étamines jaunes au centre. Parfum léger. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Apricot Nectar'**

ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'APRICOT NECTAR'

Non rustique. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port plus ou moins érigé. Tiges fortes. Feuillage vert clair lustré. Fleurs en grappes, doubles, en coupe ample, pêche et abricot sur un fond de jaune, très parfumées, à senteur de fruits. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Blaze Improved'**

ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'BLAZE IMPROVED'

Non rustique. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port grimpant de type grandiflora. Feuillage vert semi-luisant. Fleurs en corymbes, semi-doubles, rouges, au parfum léger. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Broadway'**

ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'BROADWAY'

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé étroit. Feuillage vert semi-luisant. Fleurs solitaires, doubles, rose à rose violacé, au centre jaune, parfumées. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Candelabra'**

ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA 'CANDELABRA'

1 Non rustique. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage vert luisant. Fleurs en petites grappes, doubles, orange corail, au parfum léger. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* 'Chicago Peace'**

ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'CHICAGO PEACE'

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé et vigoureux. Tiges plus ou moins épineuses. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs solitaires, doubles, roses, abricot à la base et au centre, moyennement parfumées. Résistant aux maladies.

***Rosa hybrida* série Dr Buck 'Folksinger'**

ROSIER 'FOLKSINGER'

2 Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert moyen teinté de bronze, coriace, luisant. Fleurs en grappes, doubles, jaune pêche foncé, parfumées. Floraison à la fin du printemps, puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies

***Rosa hybrida* série Dr Buck 'Hawkeye Belle'**

ROSIER 'HAWKEYE BELLE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Jeunes pousses teintées de cuivre. Feuillage vert foncé, coriace. Boutons blanc crème. Fleurs en petites grappes, doubles, blanc crème avec des touches de rose azalée et rose d'Orient qui deviennent plus présentes avec l'âge. Parfum doux et intense. Floraison à la fin du printemps, puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies.



Rosa hybrida série Dr Buck 'Summer Wind'

ROSIER 'SUMMER WIND'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé, coriace. Fleurs en petites grappes, simples, parfois semi-doubles, rouge orangé. Parfum de clou de girofle, moyennement épicé. Floraison à la fin du printemps, puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida 'Dublin Bay'

ROSIER GRIMPANT 'DUBLIN BAY'

Non rustique. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port sarmenteux, de type floribunda. Feuillage vert moyen luisant. Fleurs en grappes, doubles, rouge intense, moyennement parfumées. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Fourth of July'

ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'FOURTH OF JULY'

Non rustique. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port sarmenteux de type floribunda. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, semi-doubles, rouges avec des taches longitudinales blanches et aux étamines jaunes voyantes, parfumées. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'George Burns'

ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'GEORGE BURNS'

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé lustré. Grandes fleurs en corymbes, doubles, jaunes avec des striés de rose, rouge et crème. Fort parfum de fruits et de citron. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Gipsy Dancer'

ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'GIPSY DANCER'

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé, buissonnant. Feuillage vert foncé lustré. Fleurs en grappes, doubles aux différents tons d'orange teinté de jaune. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Glowing Peace'

ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'GLOWING PEACE'

3 Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé lustré. Grandes fleurs doubles, jaune d'or et orange cantaloup en mélange au léger parfum de thé. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Hope for Humanity'

ROSIER 'HOPE FOR HUMANITY'

Zone 3b. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port ouvert, croissance lente. Feuillage, vert foncé lustré. Fleurs en grappes, doubles, rouges, au parfum léger. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida 'Illusion'

ROSIER SARMENTEUX 'ILLUSION'

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port sarmenteux. Fleurs en grappes, doubles, rouge vermillon, parfumées. Floraison estivale. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Ilse Krohn Superior'

ROSIER SARMENTEUX 'ILSE KROHN SUPERIOR'

Zone 5b. H. : 3,50 m. L. : 3,00 m. Port sarmenteux. Fleurs doubles, blanches, en forme de rosette, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Résistant aux maladies.

- Rosa hybrida** 'Ingrid Bergman' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'INGRID BERGMAN'
Non rustique. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé, lustré et coriace. Fleurs solitaires, doubles, rouge velouté, très parfumées. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Joseph's Coat' ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'JOSEPH'S COAT'
Non rustique. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port grimpant de type grandiflora. Tiges épineuses. Feuillage vert clair semi-mat. Grandes fleurs en grappes, semi-doubles, jaune orangé avec de larges reflets rouges et de longues étamines centrales, au parfum léger. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Lilian Austin' ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'LILIAN AUSTIN'
Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage vert foncé. Fleurs doubles, rose saumon avec des reflets de jaune et d'orange et des étamines jaunes, au doux parfum fruité. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Love' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'LOVE'
Non rustique. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port érigé, buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert foncé. Fleurs solitaires, doubles, rouge écarlate avec des reflets d'argent sous les pétales, au parfum léger et épicé. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Loving Memory' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'LOVING MEMORY'
Non rustique. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé, buissonnant. Feuillage vert luisant. Boutons pointus. Fleurs solitaires, doubles, rouge cramoisi brillant, bien parfumées. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** miniature 'Anna Ford' ROSIER 'ANNA FORD'
Non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port bas. Feuillage fin, brillant, vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, orange foncé, jaune doré au centre et au parfum léger. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.
- Rosa hybrida** miniature 'Cupcake' ROSIER 'CUPCAKE'
Non rustique. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant. Fleurs en grappes, doubles, rose moyen, au parfum très léger. Très bonne résistance aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Miss All America Beauty' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'MISS ALL AMERICA BEAUTY'
Non rustique. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port érigé, vigoureux, buissonnant. Feuillage vert foncé, coriace, brillant. Grandes fleurs solitaires, doubles, rose foncé, très parfumées. Résistant aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Morden Blush' ROSIER 'MORDEN BLUSH'
Zone 2b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, croissance lente. Fleurs en petites grappes doubles, rose pâle à ivoire, légèrement parfumées. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Morden Cardinette' ROSIER 'MORDEN CARDINETTE'
Zone 3b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port très compact. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, rouge cardinal, au parfum léger. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Morden Ruby' ROSIER 'MORDEN RUBY'
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant et érigé. Fleurs doubles, rouge rubis. Aucun parfum. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
- Rosa hybrida** 'Morden Snow Beauty' ROSIER 'MORDEN SNOW BEAUTY'
Zone 3b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant bas. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, simples, blanches, aux étamines voyantes au centre, peu parfumées. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.



Rosa hybrida 'Morden Sunrise' ROSIER 'MORDEN SUNRISE'

1 Zone 3b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs solitaires, doubles, jaune, rose et abricot en mélange. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida 'Opening Night' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'OPENING NIGHT'

Non rustique. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, robuste, semi-érigé, vigoureux. Boutons cramoisis. Fleurs solitaires, doubles, rouge carmin vif aux pétales veloutés, puis roses à plein épanouissement. Étamines jaune d'or au centre de la fleur, voyantes à pleine ouverture. Parfum léger. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Pascali' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'PASCALI'

Non rustique. H. : 1,90 m. L. : 80 cm. Port très vigoureux. Feuillage vert foncé semi-mat. Fleurs solitaires, doubles, blanc crémeux, au parfum léger. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Paul Neyron' ROSIER HYBRIDE PERPÉTUEL 'PAUL NEYRON'

2 Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert pâle. Très grandes fleurs doubles, en coupe, ressemblant à une pivoine, roses à reflets lilas, très parfumées. Floraison continue. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Play Boy' ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'PLAY BOY'

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port vigoureux. Feuillage vert foncé brillant. Fleurs en grappes, semi-doubles, pétales ondulés, jaune orangé vif avec les bords écarlates et les étamines jaunes voyantes. Parfum léger. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida polyantha 'Orange Triumph' ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'ORANGE TRIUMPH'

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant compact. Feuillage vert brillant. Grosses fleurs en grappes, abondantes, semi-doubles, rouge à orange foncé, bien parfumées. Floraison continue.

Rosa hybrida polyantha 'Sarabande' ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'SARABANDE'

Non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage vert. Fleurs en grappes, semi-doubles, rouge vermillon avec des étamines jaunes très voyantes au centre et au parfum léger. Floraison continue.

Rosa hybrida polyantha 'The Fairy' ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'THE FAIRY'

Non rustique. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Longues tiges très épineuses. Feuillage vert foncé lustré. Petites fleurs en grappes, doubles, rose tendre. Aucun parfum. Floraison continue jusqu'aux gelées. Très bonne résistance au blanc.

SOLEIL
SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Rosa hybrida 'Prima Donna' ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA 'PRIMA DONNA'

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert satiné. Fleurs en petites grappes, doubles, rose fuchsia intense, parfumées. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Pristine' ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'PRISTINE'

Non rustique. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé et vigoureux. Feuillage vert foncé, épais. Fleurs solitaires, blanches avec des reflets roses, doubles, bien parfumées. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Rosarium Ueteresen' ROSIER SARMENTEUX 'ROSARIUM UETERESEN'

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port sarmenteux. Très grandes fleurs, doubles, rose foncé, au parfum léger et doux. Floraison à la fin du printemps. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Scentimental' ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'SCENTIMENTAL'

Non rustique. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port semi-érigé. Fleurs en grappes, très nombreuses, doubles, rose pâle à panachures blanc crème, au fort parfum épicé. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'The Herbalist' ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'THE HERBALIST'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges aux épines rougeâtres. Jeunes pousses vert pâle. Feuillage vert foncé. Fleurs en petites grappes, semi-doubles, rouge foncé aux pétales ondulés et aux étamines jaunes très voyantes. Léger parfum de rose. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Tournament of Roses' ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA 'TOURNAMENT OF ROSES'

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage vert brillant. Fleurs en bouquets, doubles, rose tendre à l'intérieur et rose plus intense à l'extérieur, au parfum légèrement poivré. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Tradescant' ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'TRADESCANT'

1 Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé, compact. Jeunes pousses vert foncé avec des reflets de rouge. Feuillage vert. Boutons rouge foncé. Fleurs en grappes, doubles, rouge velouté avec des reflets noirs. Parfum de rose ancienne. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida 'Winnipeg Parks' ROSIER 'WINNIPEG PARKS'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage vert foncé mat. Fleurs en grappes, doubles, rouge moyen, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida 'Wise Portia' ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'WISE PORTIA'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant compact. Tiges aux petites épines vertes. Jeunes pousses vertes. Feuillage vert semi-mat. Boutons rouge cerise. Fleurs doubles, rouge carmin à pourpre, en coupe. Parfum de rose ancienne. Résistant aux maladies.



SOLEIL

SOL | riche | meuble | neutre | humide

ARBRES

Quercus bicolor

CHÊNE BICOLORE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 17 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert pourpre. Feuilles vert foncé au dessus grisâtre, puis orange doré en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Euonymus europaeus

FUSAIN D'EUROPE

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits rose rouge et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Albus'**

FUSAIN D'EUROPE À FRUITS BLANCS

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Aldenhamensis'**

FUSAIN D'EUROPE 'ALDENHAMENSIS'

2 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge écarlate en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits rose et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Red Cascade' (E. e. 'Red Caps')**

FUSAIN D'EUROPE 'RED CASCADE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port semi-pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert mat, rouges en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Gros fruits rose et rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Hydrangea paniculata* 'Brussels Lace'**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'BRUSSELS LACE'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles jaune beige, fleurs stériles blanches, puis roses. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Burgundy Lace'**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'BURGUNDY LACE'

3 Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en petites panicules blanches, puis roses et finalement rose violacé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Grandiflora'**

HYDRANGÉE PANICULÉE À GRANDES FLEURS

Zone 3b. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules blanches, puis vieux rose. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Hydrangea paniculata* 'Kyushu'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'KYUSHU'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port dressé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles et stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]

***Hydrangea paniculata* 'Limelight'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'LIMELIGHT'

- 1 Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules vert lime. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Pee Wee'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'PEE WEE'

- 2 Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Petites feuilles vertes. Floraison estivale. Petites fleurs stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Pink Diamond' (H. p. 'Interhydia')**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'PINK DIAMOND'

- 3 Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles roses à étamines roses et fleurs stériles blanches puis rose à rose foncé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

***Hydrangea paniculata* 'Ruby' (H. p. 'Angel Blush')**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'RUBY'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules, rose puis rose foncé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Unique'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'UNIQUE'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en grandes panicules blanches, puis roses. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

***Hydrangea paniculata* 'White Moth'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'WHITE MOTH'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches en panicules fertiles, avec quelques fleurs stériles portées par de longs pédoncules. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.



SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Acer saccharum

ÉRABLE À SUCRE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair dessus, plus pâle dessous, rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Acer saccharum* 'Green Mountain'** ÉRABLE À SUCRE 'GREEN MOUNTAIN'

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, brillantes, rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Acer saccharum* 'Monumentale' (A. s. Temple's Upright')**

ÉRABLE À SUCRE 'MONUMENTALE'

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit et régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, rouge à orange en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Aesculus glabra

MARRONNIER GLABRE

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle à verdâtre. Fruits nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Redoute la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.

Carya glabra

CARYER GLABRE

Zone 5a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Carya ovata

CARYER À NOIX DOUCES

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits comestibles. Écorce décorative, grise, s'exfoliant avec l'âge. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Sensible à la pollution. Plante très allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana

FRÊNE D'AMÉRIQUE

Plante indigène. Zone 3b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, devenant pourpre et bronze en automne. Fruits très nombreux (nuisance), persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Autumn Applause' (F. a. 'Jungiger')

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'AUTUMN APPLAUSE'

Zone 3b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, devenant rouge foncé, marron et pourpre en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Autumn Purple'

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'AUTUMN PURPLE'

1 Zone 3b. H. : 16 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, devenant pourpre et acajou en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Manitou'

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'MANITOU'

Zone 4a. H. : 12 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, devenant jaune à pourpre en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Northern Blaze' (F. a. 'Jefnor')

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'NORTHERN BLAZE'

Zone 3a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge foncé à pourpre. Grandes feuilles vertes, devenant pourpre et bronze en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Skyline' (F. a. 'Skycole')

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'SKYLINE'

2 Zone 3b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, devenant orange et rouge en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus americana 'Sparticus' (F. a. 'Sparzam')

FRÊNE D'AMÉRIQUE 'SPARTICUS'

Zone 3b. H. : 17 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, devenant rouge vin avec des reflets bronze en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Liriodendron tulipifera

TULIPIER DE VIRGINIE

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 5 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en lobe tronqué, vert foncé luisant, puis jaunes en automne. Floraison de printemps. Fleurs en forme de tulipe, jaune verdâtre, orangé à la base, très parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.



Quercus alba

CHÊNE BLANC

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port globulaire large. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses, puis gris argent. Feuilles vertes, puis rouge et violet pourpre en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits : glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Quercus robur (Q. pedunculata)

CHÊNE PÉDONCULÉ

Zone 5a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port arrondi, irrégulier. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, brunes en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Quercus robur 'Crimson Spire' (Q. r. 'Crimschmidt')

CHÊNE PÉDONCULÉ 'CRIMSON SPIRE'

3 Zone 5a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, puis rouges en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Quercus robur 'Fastigiata'

CHÊNE PÉDONCULÉ 'FASTIGIATA'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Souvent vendu sous le nom de cultivar 'Skyrocket'. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, puis brunes en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Quercus robur 'Tortuosa'

CHÊNE PÉDONCULÉ TORTUEUX

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Souvent confondu avec le cultivar 'Fastigiata'. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, brunes en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Amelanchier alnifolia

AMÉLANCHIER DE SASKATOON

Plante indigène. Zone 4. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits noirs, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier alnifolia* 'Honeywood'**

AMÉLANCHIER DE SASKATOON 'HONEYWOOD'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits bleu foncé, comestibles, hâtifs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier alnifolia* 'Smoky' (A. a. 'Smokey')**

AMÉLANCHIER DE SASKATOON 'SMOKY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Gros fruits bleu foncé, sucrés, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier* x *grandiflora* (A. *Jamarckii*)**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits noir violet. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier* x *grandiflora* 'Autumn Brilliance'**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'AUTUMN BRILLIANCE'

Zone 4a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, puis jaune, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits rouges. Écorce décorative, grise. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier* x *grandiflora* 'Princess Diana'**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'PRINCESS DIANA'

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits bleu noir. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles japonica

COGNASSIER DU JAPON

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré. Floraison printanière. Fleurs rouge foncé. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris.

***Chaenomeles japonica* 'Sargentii' COGNASSIER DE SARGENT**

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré. Floraison printanière. Fleurs rose saumon. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris.

***Cornus alternifolia* 'Argentea' (C. a. 'Variegata')**

CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES ARGENTÉES

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon originale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc crème, puis pourpre foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Cornus amomum

CORNOUILLER GRACIEUX

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies bleu pâle. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Corylus maxima 'Purpurea'

NOISETIER POURPRE

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles rouge foncé à pourpre, vert bronze en été. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre. Fruits: noix rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Halesia carolina

ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bruns. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hamamelis mollis 'Pallida'

HAMAMÉLIS MOLLIS 'PALLIDA'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune à jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune et rouge, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Hamamelis virginiana

HAMAMÉLIS DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, orange en automne. Floraison automnale. Fleurs jaunâtres, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Heptacodium miconoides

HEPTACODIUM

Zone 4b. H. : 2,70 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison automnale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.

Magnolia x brooklynensis 'Yellow Bird'

MAGNOLIA 'YELLOW BIRD'

Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits roses à graines rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia kobus

MAGNOLIA KOBUS

Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 7,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Fruits roses à graines rouges. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'

MAGNOLIA 'LEONARD MESSEL'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, striées de rose pourpre à l'extérieur, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Magnolia x loebneri* 'Merrill'**

MAGNOLIA 'MERRILL'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Rubus x 'Benenden'* (R. x *tridel* 'Benenden')**

RONCE 'BENENDEN'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

***Sorbaria aitchisonii* (S. *tomentosa angustifolia*)**

SORBARIA D'AITCHISON

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

***Stephanandra incisa* 'Crispa'**

STEPHANANDRA CRISPÉE

Zone 5a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif, puis jaune et rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Stewartia pseudocamellia

STEWARTIA

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Écorce brun, gris et orange, très décorative. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert foncé, puis rouge orange à rouge bronze en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

***Tsuga canadensis* 'Golden Splendor'**

PRUCHE DU CANADA 'GOLDEN SPLENDOR'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune d'or intense. Aiguilles vert jaune, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.



PLANTES GRIMPANTES

Actinidia arguta

KIWI

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes. Fleurs blanches, parfumées. Floraison printanière. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Actinidia arguta* 'Issai'**

KIWI 'ISSAI'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes. Fleurs blanches, parfum léger. Floraison printanière. Fruits comestibles. Plante autoféconde. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Actinidia kolomikta

KIWI KOLOMIKTA

1 Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle (moins coloré) pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

***Actinidia kolomikta* 'Arctic Beauty' KIWI KOLOMIKTA 'ARCTIC BEAUTY'**

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBRES

Acer rubrum

ÉRABLE ROUGE

2 Plante indigène. Zone 3b. H. : 20 m. L. : 16 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

***Acer rubrum* 'Armstrong'**

ÉRABLE ROUGE 'ARMSTRONG'

3 Zone 4b. H. : 15 m. L. : 6,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, devenant rouge orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

***Acer rubrum* 'Autumn Flame'**

ÉRABLE ROUGE 'AUTUMN FLAME'

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

***Acer rubrum* 'Bowhall'**

ÉRABLE ROUGE 'BOWHALL'

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 5,50 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

SOLEIL SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

Acer rubrum 'Morgan'

ÉRABLE ROUGE 'MORGAN'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Acer rubrum 'Northwood'

ÉRABLE ROUGE 'NORTHWOOD'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Acer rubrum 'October Glory'

ÉRABLE ROUGE 'OCTOBER GLORY'

Zone 5a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant, rouge cramoisi en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Acer rubrum 'Red Sunset' (A. r. 'Franksred')

ÉRABLE ROUGE 'RED SUNSET'

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair lustré, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Acer rubrum 'Scanlon'

ÉRABLE ROUGE 'SCANLON'

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 5,50 m. Port colonnaire, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge foncé à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

ARBUSTES

Ilex x 'Sparkleberry'

HOUX 'SPARKLEBERRY'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Nouvelles pousses rougeâtres. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Chionanthus virginicus

ARBRE DE NEIGE



Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune d'or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Cornus sericea (C. stolonifera)

CORNOUILLER STOLONIFÈRE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.



Cornus sericea 'Allemands'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'ALLEMANS'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, longuement bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'Cardinal'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'CARDINAL'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, large. Tiges rouge clair en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge à bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'Flaviramea'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE À TIGES JAUNES

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tige jaune verdâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'Kelseyi'

CORNOUILLER DE KELSEY

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, semi-lustrées, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'Silver and Gold'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'SILVER AND GOLD'

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Tiges jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris vert plus ou moins bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'White Gold'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'WHITE GOLD'

2 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

CONIFÈRES

Metasequoia glyptostroboides

MÉTASÉQUOIA

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert clair. Coloration automnale jaune vieil or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.



SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide

ARBUSTES

Alnus rugosa

AULNE RUGUEUX

Plante indigène. Zone 1a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, blanchâtres en dessous. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Racines fixant l'azote. Transplantation très facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Ilex verticillata

HOUX VERTICILLÉ

Plante indigène. Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Afterglow'**

HOUX VERTICILLÉ 'AFTERGLOW'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits orange à rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Aurantiaca'**

HOUX VERTICILLÉ 'AURANTIACA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits orange devenant jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Berry Nice' (l. v. 'Spriber')**

HOUX VERTICILLÉ 'BERRY NICE'

Zone 5a. H. : 2,25 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge feu, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Cacapon'**

HOUX VERTICILLÉ 'CACAPON'

1 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Early Male'*HOUX VERTICILLÉ 'EARLY MALE'**

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Jim Dandy' (l. v. 'Dwarf Male')*HOUX VERTICILLÉ 'JIM DANDY'**

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Oosterwijk'*HOUX VERTICILLÉ 'OOSTERWIJK'**

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouges, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Red Sprite'*HOUX VERTICILLÉ 'RED SPRITE'**

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Southern Gentlemen'*HOUX VERTICILLÉ 'SOUTHERN GENTLEMEN'**

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Winter Gold'*HOUX VERTICILLÉ 'WINTER GOLD'**

2 Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits jaunes, parfois teintés de rose, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata* 'Winter Red'*HOUX VERTICILLÉ 'WINTER RED'**

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge très vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

SOLEIL**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé****ARBRES*****Betula lenta*****BOULEAU FLEXIBLE**

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brun rougeâtre, aromatique. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fagus grandifolia

HÊTRE À GRANDES FEUILLES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port ovoïde, large et régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, bronze en automne, persistant partiellement en hiver. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative, gris argenté et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé****ARBRES****Maackia amurensis**

MAACKIA DE L'AMOUR

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé. Floraison en mi-été. Fleurs blanc verdâtre, parfumées. Écorce décorative, brun orangé, texturée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Quercus macrocarpa

CHÊNE À GROS FRUITS

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 20 m. Port pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé****ARBRES****Tilia mongolica 'Harvest Gold'**

TILLEUL DE MONGOLIE 'HARVEST GOLD'

Zone 3a. H. : 9,00 m. L. : 7,50 m. Port ovoïde. Bourgeons jaunes. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL**SOL | riche | lourd | légèrement acide | humide****ARBUSTES****Viburnum trilobum**

PIMBINA

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges, comestibles, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi.]

Viburnum trilobum 'Alfredo'

PIMBINA 'ALFREDO'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge brillant en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Viburnum trilobum 'Compactum'

PIMBINA NAIN

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

***Viburnum trilobum* 'Wentworth'** PIMBINA 'WENTWORTH'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Gros fruits jaune rougeâtre à rouge vif, comestibles, abondants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL

SOL | riche | lourd | acide à alcalin | très humide

ARBRES

***Salix alba* 'Tristis'**

SAULE PLEUREUR À ÉCORCE JAUNE

Zone 4a. H. : 18 m. L. : 18 m. Port pleureur à grand développement. Rameaux jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Salix alba* 'Flame'**

SAULE 'FLAME'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Rameaux rouge orange. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune d'or longtemps en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Salix alba* 'Snake' (S. a. 'Dart's Snake')**

SAULE 'SNAKE'

Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant. Rameaux tortueux, orange. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune d'or longtemps en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Acer platanoides

ÉRABLE DE NORVÈGE

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune vif en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits nombreux (nuisance). Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Columnare'**

ÉRABLE DE NORVÈGE COLONNAIRE

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Crimson King'** ÉRABLE DE NORVÈGE 'CRIMSON KING'

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge brun, devenant rouge noir en été. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Acer platanoides 'Crimson Sentry' ÉRABLE DE NORVÈGE 'CRIMSON SENTRY'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge vin. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

Acer platanoides 'Deborah' ÉRABLE DE NORVÈGE 'DEBORAH'

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouges. Feuilles vert bronzé d'où se découpent de nouvelles pousses rouges. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Acer platanoides 'Drummondii' ÉRABLE DE NORVÈGE DE DRUMMOND

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses colorées de rose. Feuilles vertes bordées de blanc. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides 'Emerald Lustre' (A. p. 'Pond')

ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD LUSTRE'

1 Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouges. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Acer platanoides 'Emerald Queen' ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD QUEEN'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Acer platanoides 'Fairview' ÉRABLE DE NORVÈGE 'FAIRVIEW'

2 Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre rougeâtre devenant bronze, puis jaune vif en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides 'Globosum' ÉRABLE DE NORVÈGE 'GLOBOSUM'

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port rond, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge brun, puis rouge vif. Feuilles vertes, jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides 'Parkway' (A. p. 'Columnarbroad')

ÉRABLE DE NORVÈGE 'PARKWAY'

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port conique étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

Acer platanoides 'Princeton Gold' (A. p. 'Prigo')

ÉRABLE DE NORVÈGE 'PRINCETON GOLD'

3 Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d'or brillant au printemps devenant jaune chartreuse en été et jaune foncé en automne. Floraison printanière. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides 'Royal Red' ÉRABLE DE NORVÈGE 'ROYAL RED'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge luisant. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.



***Acer platanoides* 'Schwedleri'** ÉRABLE DE NORVÈGE 'SCHEWDLERI'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge clair au printemps, devenant rouge pourpre, puis vert olive à l'été. Teintes rouges et rousses en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Superform'** ÉRABLE DE NORVÈGE 'SUPERFORM'

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles épaisses, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits pas trop nombreux. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Aesculus x carnea* 'Briotii'** MARRONNIER À FLEURS ROUGES 'BRIOTTII'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, plus ou moins régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, devenant jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits peu nombreux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Redoute la sécheresse. Abrite les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.

***Crataegus laevigata* 'Crimson Cloud'** AUBÉPINE ANGLAISE 'CRIMSON CLOUD'

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, luisantes, orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges au centre blanc, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution. Résiste à la rouille.

Prunus maackii CERISIER DE L'AMOUR

Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en grappes. Fruits rougeâtre foncé. Écorce brun rouge brillant, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

***Tilia x europaea* 'Wratislaviensis'** TILLEUL DE WRATISLAVA

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, jaune d'or au printemps, plus pâle en été et jaune clair en automne. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Spiraea nipponica 'Halward's Silver'

SPIRÉE 'HALWARD'S SILVER'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea nipponica 'June Bride'

SPIRÉE 'JUNE BRIDE'

1 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea nipponica 'Snowmound' (*S. n. tosaensis*)

SPIRÉE 'SNOWMOUND'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, vert bleuâtre en dessous. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Symphoricarpos* x *chenaultii 'Hancock'

SYMPHORINE DE HANCOCK

Zone 5a. H. : 70 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits roses ou rose tacheté de blanc, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).



SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Betula alleghaniensis

BOULEAU JAUNE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative jaune à cuivré. Croissance moyenne. Enracinement très superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Aesculus hippocastanum

MARRONNIER D'INDE

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches avec un centre rouge écarlate. Fruits nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Craint la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

MARRONNIER DE BAUMANN

2

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches avec un centre rouge écarlate. Pas de fruits. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Craint la sécheresse.

ARBUSTES

Viburnum plicatum

VIORNE DU JAPON

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Viburnum plicatum 'Shasta'

VIORNE DU JAPON 'SHASTA'

3

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Branches horizontales. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

VIORNE DU JAPON 'SUMMER SNOWFLAKE'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps et en été. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.



SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Salix x erythroflexuosa (*S. sepulcralis* 'Erythroflexuosa')

SAULE DORÉ TORTUEUX

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Branches tortueuses, jaune et orange. Feuilles vertes, enroulées sur elles-mêmes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]

Syringa x chinensis 'Saugeana' LILAS DE CHINE 'SAUGEANA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | neutre | sec à très humide

ARBUSTES

Spiraea x vanhouttei

SPIRÉE VAN HOUTTE

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert sombre, vert pâle en dessous, puis brun pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea x vanhouttei 'Pink Ice' (*S. x v.* 'Captan')

SPIRÉE VAN HOUTTE 'PINK ICE'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses blanc et vert. Feuilles vert sombre, panachées de blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea x vanhouttei 'Renaissance'

SPIRÉE VAN HOUTTE 'RENAISSANCE'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port en fontaine. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Cercidiphyllum japonicum

ARBRE DE KATSURA

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, puis jaune doré à écarlate en automne. Feuillage odorant à l'automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

ARBRE DE KATSURA PLEUREUR

1 Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, jaune doré écarlate en automne. Feuillage odorant à l'automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

ARBUSTES

Spiraea japonica albiflora (*S. albiflora*; *S. japonica alba*; *S. j.* 'Albiflora')

SPIRÉE DU JAPON BLANCHE

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Alpina' (*S. j.* 'Nana')

SPIRÉE DU JAPON NAIN

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rose clair. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' (*S. x bumalda* 'Anthony Waterer')

SPIRÉE DU JAPON 'ANTHONY WATERER'

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs rose carmin clair. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Bullata' (*S. bullata*)

SPIRÉE DU JAPON 'BULLATA'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, gaufrées. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Candlelight'

SPIRÉE DU JAPON 'CANDLELIGHT'

2 Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune clair brillant. Feuilles vert jaunâtre, rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Coccinea'** SPIRÉE DU JAPON 'COCCINEA'

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Crispa'** SPIRÉE DU JAPON À FEUILLES CRISPÉES

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles vertes, crispées, certaines tachetées de blanc ou de rose. Floraison estivale. Fleurs rose clair carmin. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Dakota Goldcharm' (S. j. 'Mertyann')**

SPIRÉE DU JAPON 'DAKOTA GOLDCHARM'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes teintées de rouge. Floraison tôt au printemps, puis estivale. Fleurs rose pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Dart's Red'** SPIRÉE DU JAPON 'DART'S RED'

I Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Firelight'** SPIRÉE DU JAPON 'FIRELIGHT'

Zone 2b. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses orange vif. Feuilles vert jaunâtre, puis rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rouges. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Flaming Elf'** SPIRÉE DU JAPON 'FLAMING ELF'

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge, orange et jaune. Floraison estivale. Fleurs rose très pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Flaming Mound'** SPIRÉE DU JAPON 'FLAMING MOUND'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuilles orangées, puis jaunes, puis vert tendre, finalement bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Boutons rouges. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Flowering Choice'**

SPIRÉE DU JAPON 'FLOWERING CHOICE'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs prolongées, roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Spiraea japonica* 'Froebelii'**

SPIRÉE DE FROEBEL

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles vert rougeâtre, pourpre bronzé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Gold Mound'**

SPIRÉE DU JAPON 'GOLD MOUND'

Zone 4a. H. : 70 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaunes teintées de rouge. Feuilles jaune d'or, puis jaune lime. Floraison estivale. Fleurs rose pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea* x 'Golden Carpet'**

SPIRÉE 'GOLDEN CARPET'

Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Golden Elf'**

SPIRÉE DU JAPON 'GOLDEN ELF'

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d'or. Floraison estivale. Fleurs rose très pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Golden Princess' (S. j. 'Lisp')**

SPIRÉE DU JAPON 'GOLDEN PRINCESS'

2 Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact et régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d'or. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Goldflame'**

SPIRÉE DU JAPON 'GOLDFLAME'

Zone 2b. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune orangé. Feuilles vert jaunâtre, puis cuivre orangé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouges. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea* x 'Green Carpet'**

SPIRÉE 'GREEN CARPET'

3 Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

Spiraea japonica 'Little Princess' SPIRÉE DU JAPON 'LITTLE PRINCESS'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact, nain. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Floraison estivale. Fleurs rose pâle, abondantes. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Macrophylla' SPIRÉE DU JAPON 'MACROPHYLLA'

I Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge foncé. Grandes feuilles vert brillant. Floraison estivale. Grandes fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Magic Carpet' (S. x 'Walbuma'; S. x 'Magic Carpet') SPIRÉE DU JAPON 'MAGIC CARPET'

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles orange et jaune. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Manon Red Prince' (S. j. 'Manon') SPIRÉE DU JAPON 'MANON RED PRINCE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes teintées de bronze, rouges en automne. Floraison estivale. Fleurs rose foncé à rouge. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Neon Flash' SPIRÉE DU JAPON 'NEON FLASH'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourprées. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouge vif. Fruits bruns, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Shirobana' SPIRÉE DU JAPON 'SHIROBANA'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs toutes roses, toutes blanches, en partie rose ou en partie blanche. Fruits bruns, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea x 'Sparkling Carpet' SPIRÉE 'SPARKLING CARPET'

Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge et jaune. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBRES

Quercus palustris CHÊNE DES MARAIS

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 13 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses, puis gris argent. Feuilles vert vif, vert pâle dessous, tournant du rouge carmin au rouge vin en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



ARBUSTES

Salix geyeriana

SAULE ARGENTÉ

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses argentées. Feuilles vert argenté, vert bronze en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative noire. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dense.]

CONIFÈRES

Abies balsamea

SAPIN BAUMIER

Plante indigène. Zone 3a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits pourpres, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

***Abies balsamea* 'Nana'**

SAPIN BAUMIER NAIN

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

***Abies balsamea* 'Piccolo'**

SAPIN BAUMIER 'PICCOLO'

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons brun rouge. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

***Chamaecyparis pisifera* 'Boulevard'** FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'BOULEVARD'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Compacta'** FAUX-CYPRÈS DE SAWARA COMPACT

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles vertes, légèrement bleutées en dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Curly Tops'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'CURLY TOPS'

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal. Extrémité des tiges tortueuse. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

***Chamaecyparis pisifera* 'Filifera'** FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert grisâtre à glauque, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Filifera Golden Charm'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME 'GOLDEN CHARM'

1 Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles jaune brillant, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Filifera Nana'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME NAIN

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati dessus. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert clair, puis vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Gold Dust'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLD DUST'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vertes largement panachées de jaune doré, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis pisifera* 'Golden Pincushion'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLDEN PINCUSHION'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Plumosa Aurea'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA PLUMEUX DORÉ

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Squarrosa Intermedia' (C. p. 'Dwarf Blue')**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA INTERMEDIA'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port conique, irrégulier. Jeunes pousses tordues. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Squarrosa Lombarts'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA LOMBARTS'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles grises, puis bleues, finalement bronze en automne, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Tzukumo'** FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'TZUKUMO'

2 Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port miniature, compact, dense. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Vintage Gold'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'VINTAGE GOLD'

Zone 4b. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles jaunes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | sec à très humide

ARBUSTES

Liquidambar styraciflua

COPALME D'AMÉRIQUE

3 Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge pourpre foncé en automne. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | très acide | frais et bien drainé

ARBRES

***Quercus rubra* (*Q. borealis*)**

CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port conique large, irrégulier. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat, vert bleuté dessous, puis rouge doré en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

CONIFÈRES

Picea omorika

ÉPINETTE DE SERBIE

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches horizontales. Rameaux retombants. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.



***Picea omorika* 'Nana'**

ÉPINETTE DE SERBIE NAINÉ

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, puis pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert jaunâtre foncé, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Picea omorika* 'Pendula'**

ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE

1 Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tige principale semi-pleureuse. Branches et rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Picea omorika* 'Pendula Burns'**

ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE BURNS

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur étroit. Tige principale érigée, tordue. Branches et rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Picea omorika* 'Pimoko'**

ÉPINETTE DE SERBIE 'PIMOKO'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large, régulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons rougeâtres. Aiguilles vert sombre, argentées dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

CONIFÈRES

Picea mariana

ÉPINETTE NOIRE

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert grisâtre mat, blanches dessous, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea mariana* 'Aurea' (P. m. 'Golden')** ÉPINETTE NOIRE À POUSSES DORÉES

Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 4,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses dorées. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.



***Picea mariana* 'Beissneri'** ÉPINETTE NOIRE 'BEISSNERI'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu vert, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea mariana* 'Ericoides'** ÉPINETTE NOIRE 'ERICOIDES'

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact, dense, plat dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles gris bleu, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

ROSIERS

Rosa blanda ROSIER DU LABRADOR

Plante indigène. Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. Fleurs simples, rose foncé, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge foncé, persistants. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

SOLEIL

SOL | riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Rhododendron* x 'Golden Lights'** AZALÉE 'GOLDEN LIGHTS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs jaune d'or, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Lemon Lights'** AZALÉE 'LEMON LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Mandarin Lights'** AZALÉE 'MANDARIN LIGHTS'

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mandarine avec des reflets orange, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Northern Hi-Lights'** AZALÉE 'NORTHERN HI-LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes, puis bourgogne et pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème coloré de jaune pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Northern Lights'** AZALÉE 'NORTHERN LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Orchid Lights' AZALÉE 'ORCHID LIGHTS'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs roses, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Pink and Sweet' AZALÉES 'PINK AND SWEET'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, puis bronze et pourpre rouge orangé en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose pourpre avec un œil rose foncé et des étamines jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Pink Lights' AZALÉE 'PINK LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, abondantes, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Popsicle' AZALÉE 'POPSICLE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, puis rouge vin en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Rosy Lights' AZALÉE 'ROSY LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vertes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé avec des reflets rouge rosé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Spicy Lights' AZALÉE 'SPICY LIGHTS'

1 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs orange saumoné, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Tri-Lights' AZALÉE 'TRI-LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose foncé. Fleurs rose pourpre, avec des plages blanches et des taches jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Western Lights' AZALÉE 'WESTERN LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, glauques. Floraison prolongée à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston's Innocence'

AZALÉE 'WESTON'S INNOCENCE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vert foncé luisant, puis rouge vin, rouge et jaune en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



Rhododendron x 'Weston's Lollipop' AZALÉE 'WESTON'S LOLLIPOP'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, rouge orangé en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose clair tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'White Lights' AZALÉE 'WHITE LIGHTS'

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rosés. Grandes fleurs blanches à gorge jaune, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL

SOL | riche | tourbeux | très acide | très humide

ARBUSTES

Chamaedaphne calyculata (*Cassandra calyculata*)

CASSANDRE CALICULÉ

3 Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | caillouteux | acide à alcalin | sec

ARBUSTES

Colutea arborescens

BAGUENAUDIER COMMUN

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Fruits en grosses gousses, très décoratives, persistantes. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger | légèrement alcalin | sec

ARBRES

Caragana arborescens 'Pendula' POIS DE SIBÉRIE PLEUREUR

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

***Caragana arborescens* 'Walker'** CARAGANA 'WALKER'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur, étroit. Feuillage de texture très fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle. Écorce décorative vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

ARBUSTES

Caragana arborescens POIS DE SIBÉRIE

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, lâche. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

***Caragana arborescens* 'Lorbergii'** CARAGANA DE LORBERG

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture très fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Écorce décorative, vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur.]

***Caragana arborescens* 'Spring Gold'**
CARAGANA 'SPRING GOLD'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune citron. Feuilles vert lime. Écorce décorative, vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]

***Caragana frutex* 'Globosa'** CARAGANA FRUTESCENT GLOBE

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté mat. Floraison printanière. Fleurs jaune vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 50 cm. Port globulaire, régulier.]

Caragana pygmaea CARAGANA NAIN

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port étalé. Feuillage de texture très fine. Feuilles vert clair. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

Caragana rosea CARAGANA À FLEURS ROUGES

Zone 2a. H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port étalé, arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes teintées de rouge, devenant rouge foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire.]

CONIFÈRES

Pinus nigra austriaca PIN NOIR D'AUTRICHE

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits en cônes bruns. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger | légèrement acide | sec à très humide

ARBRES

Sorbus decora

SORBIER PLAISANT

Plante indigène. Zone 2a. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, puis orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges ou orangés. Écorce décorative bronze. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger | très acide | humide

ARBUSTES

Alnus crispa

AULNE CRISPÉ

Plante indigène. Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses odorantes. Feuilles vertes. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Racines fixant l'azote. Transplantation très facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Ginkgo biloba

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port conique large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Ginkgo biloba* 'Chi Chi'**

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'CHI CHI'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, touffu. Très branchu. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vertes, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Ginkgo biloba* 'Mariken'**

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'MARIKEN'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Ginkgo biloba* 'Pendula'**

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS PLEUREUR

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Ginkgo biloba* 'Princeton Sentry'**

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'PRINCETON SENTRY'

Zone 5b. H. : 12 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Ginkgo biloba 'Tubiformis'**ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'TUBIFORMIS'**

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur, dessus plat. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, qui s'enroule pour former un tube, vert brillant, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Ginkgo biloba 'Umbrella'**ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'UMBRELLA'**

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Sorbus alnifolia**SORBIER DE CORÉE**

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré, grisâtres dessous, puis rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement alcalin | très humide

ARBRES**Acer negundo****ÉRABLE À GIGUÈRE**

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Fruits nombreux et persistants. Croissance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Acer negundo 'Sensation'**ÉRABLE À GIGUÈRE 'SENSATION'**

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, rouges en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



SOLEIL

SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Lonicera* x 'Honey Baby' (L. x 'Novso')**

CHÈVREFEUILLE 'HONEY BABY'

- 1** Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison estivale prolongée. Boutons aux reflets pourpres. Fleurs crème à jaune pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Prunus virginiana

PRUNUS DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 2b. H. : 9,00 m. L. : 6,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits jaunes, rouges, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et fruits verts toxiques.

***Prunus virginiana* 'Canada Red' (P. v. 'Shubert Select')**

PRUNUS DE VIRGINIE 'CANADA RED'

- 2** Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 6,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes devenant et restant pourpres. Nouvelles pousses vertes. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits pourpre foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et fruits verts toxiques.

***Prunus virginiana* 'Shubert' (P. v. 'Schubert')**

PRUNUS DE VIRGINIE 'SHUBERT'

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes devenant pourpres. Nouvelles pousses vertes en été. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits pourpre foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et fruits verts toxiques.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Cotoneaster apiculata

COTONÉASTER APICALE

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouge écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,75 m. L. : 1,00 m. Port semi-pleureur.]

Cotoneaster apiculata 'Tom Thumb' (C. a. 'Little Gem')

COTONÉASTER APICALE 'TOM THUMB'

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant, arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouge écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Lonicera korolkowii 'Abbotsford' CHÈVREFEUILLE 'ABBOTSFORD'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge clair. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au balai de sorcière.

Lonicera korolkowii 'Blue Velvet' CHÈVREFEUILLE 'BLUE VELVET'

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris bleuté. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au balai de sorcière.

Lonicera korolkowii 'Honey Rose' CHÈVREFEUILLE 'HONEY ROSE'

I Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs rouge rosé. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au balai de sorcière.

Lonicera korolkowii zabellii CHÈVREFEUILLE DE ZABEL

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port en vase, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches ou blanc rosé. Fruits rouge clair. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Rhus aromatica SUMAC AROMATIQUE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Rhus aromatica 'Grow Low' SUMAC AROMATIQUE 'GROW LOW'

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Populus canescens 'Tower' PEUPLIER 'TOWER'

Zone 2b. H. : 12 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré dessus, grisâtres dessous, puis jaunes en automne. Pas de fleurs ni de fruits. Croissance rapide. Enracinement traçant. Transplantation facile.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec à très humide

ARBUSTES

Ligustrum x vicaryi

TROËNE DORÉ

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Feuilles jaunâtres. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

***Ligustrum x vicaryi* 'Hillside'**

TROËNE DORÉ 'HILLSIDE'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes largement bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Spiraea fritschiana* 'Chicago Snow' SPIRÉE 'CHICAGO SNOW'**

2

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc pur, virant parfois au rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

CONIFÈRES

***Juniperus chinensis* 'Maney' (J. c. 'Maney')**

GENÉVRIER DE MANEY

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-rampant à tiges érigées, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).





SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Amelanchier canadensis

AMÉLANCHIER DU CANADA

1 Plante indigène. Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orangé en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, étroit.]

***Amelanchier canadensis* 'Ballerina'** AMÉLANCHIER DU CANADA 'BALLERINA'

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde, étroit.]

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Malus sargentii

POMMETIER DE SARGENT

2 Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage vert luisant. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs blanches, simples, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.

Prunus nigra

PRUNIER NOIR

Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port oblong, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches devenant roses, parfumées. Fruits rouge, rouge orangé et jaune. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN

Zone 2a. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

***Prunus padus* 'Commutata'**

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN HÂTIF

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées en grappes. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

***Prunus padus* 'Skinner's Red'**

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN 'SKINNER'S RED'

Zone 3b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert et rouge en été. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées, en grappes. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

***Prunus padus* 'Colorata'**

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN 'COLORATA'

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles pourpres devenant vertes dessus et pourpres dessous. Floraison printanière. Fleurs roses, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

ARBUSTES

***Lonicera x xylosteoides* 'Clavey's Dwarf'**

CHÈVREFEUILLE NAIN DE CLAVEY

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste aux maladies.

***Lonicera x xylosteoides* 'Mini Globe'**

CHÈVREFEUILLE 'MINI GLOBE'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste aux maladies.

Malus x 'Pom'zia' (M. x 'Courtabri') POMMETIER 'POM'ZIA'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs blanches. Fruits orange, persistants. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Malus sargentii* 'Tina' (M. x 'Sargent Tina')**

POMMETIER DE SARGENT NAIN

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage vert luisant. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouge foncé, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur.]

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Salix sachalinensis* 'Sekka'** (*S. udensis* 'Sekka'; *S. u.* 'Setsuka')

SAULE 'SEKKA'

- I** Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches tordues, certaines plates et recourbées, recouvertes de nombreux bourgeons. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant dessus, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

CONIFÈRES

Larix laricina

MÉLÈZE LARICIN

Plante indigène. Zone 1a. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert clair. Coloration automnale jaune. Fleurs femelles rouges. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Larix laricina* 'Blue Weeping'**

MÉLÈZE LARICIN 'BLUE WEEPING'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté intense. Coloration automnale jaune d'or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

***Larix laricina* 'Newport Beauty'**

MÉLÈZE LARICIN 'NEWPORT BEAUTY'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleu intense. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | très humide

ARBUSTES

Cephalanthus occidentalis

CÉPHALANTHE OCCIDENTAL

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanc crème. Fruits persistants. Écorce décorative gris brun. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

***Salix gracilistyla* 'Melanostachys'** (*Salix melanostachys*)

SAULE À CHATONS NOIRS

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rouges et bourgeons noir violacé. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Boutons rouge noir. Fleurs en chatons jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large.]



SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | sec à très humide

PLANTES GRIMPANTES

Campsis radicans

JASMIN TROMPETTE

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Campsis radicans* 'Flamenco'**

JASMIN TROMPETTE 'FLAMENCO'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs rouge foncé. Floraison estivale. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Campsis radicans* 'Flava'**

JASMIN TROMPETTE 'FLAVA'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs jaune brillant. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Campsis radicans* 'Indian Summer' JASMIN TROMPETTE 'INDIAN SUMMER'**

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs orange à rayures rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Campsis x tagliabuana* 'Madame Galen'**

JASMIN TROMPETTE 'MADAME GALEN'

2 Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs rouge orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

***Crataegus x mordenensis* 'Snowbird'**

AUBÉPINE 'SNOWBIRD'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Crataegus viridis* 'Winter King'** AUBÉPINE 'WINTER KING'

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, large. Petites épines. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison au début de l'été. Fleurs simples, blanches, parfumées. Très nombreux fruits rouges persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Populus tremula* 'Erecta'** PEUPLIER TREMBLE FASTIGIÉ

Zone 3b. H. : 16 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé dessus, glauques dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Morton' (U. x 'Accolade')** ORME 'MORTON'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port érigé, rameaux retombants. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Discovery'** ORME 'DISCOVERY'

I Zone 3a. H. : 14 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Homestead'** ORME 'HOMESTEAD'

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la maladie hollandaise de l'orme. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Patriot'** ORME 'PATRIOT'

Zone 4b. H. : 14 m. L. : 10 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Pioneer'** ORME 'PIONEER'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la maladie hollandaise de l'orme. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus* x 'Prospector'** ORME 'PROSPECTOR'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Jeunes pousses orange. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Aronia arbutifolia ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.



***Aronia arbutifolia* 'Brilliant'** (*A. a.* 'Brilliantissima')

ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER 'BRILLIANT'

2 Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Feuilles colorées, persistant longtemps à l'automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges lustrés, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Cornus racemosa* (*C. paniculata*)** CORNOUILLER À GRAPPES

Plante indigène. Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles gris vert, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Euonymus alatus FUSAIN AILÉ

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, violet pourpre et orange en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus alatus* 'Chicago Fire'** (*E. a.* 'Timber Creek')

FUSAIN AILÉ 'CHICAGO FIRE'

3 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, tôt en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus alatus* 'Compactus'** FUSAIN AILÉ NAIN

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge écarlate en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi.]

***Euonymus alatus* 'Fire Ball'** (*E. a.* 'Compactus Select')

FUSAIN AILÉ 'FIRE BALL'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge flamme en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits orange écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

Lonicera morrowii

CHÈVREFEUILLE DE MORROW

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Salix chaenomeloides

SAULE À CHATONS ARGENTÉS

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, irrégulier. Bourgeons et tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs blanches devenant rosées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

CONIFÈRES

***Juniperus chinensis* 'Blaauw' (J. c. 'Blaauwii')**

GENÉVRIER DE BLAUW

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port évasé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, gris bleu foncé mat, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bleus, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Blue Alps' GENÉVRIER DE CHINE 'BLUE ALPS'**



Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tige centrale forte. Branches latérales retombantes avec l'âge. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses teintées de bronze. Aiguilles piquantes, bleu acier brillant, odorantes. Coloration automnale bleu foncé. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Blue Point' GENÉVRIER DE CHINE 'BLUE POINT'**

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, légèrement bleutées, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Fairview' GENÉVRIER DE CHINE 'FAIRVIEW'**

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Mounbatten' GENÉVRIER DE CHINE 'MOUNBATTEN'**

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles très piquantes, vert grisâtre, odorantes. Fruits bleus, abondants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Ontario Green'**

GENÉVRIER DE CHINE 'ONTARIO GREEN'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles très piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).



***Juniperus chinensis* 'Robusta Green'**

GENÉVRIER DE CHINE 'ROBUSTA GREEN'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, asymétrique. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Coloration automnale vert foncé. Fruits bleus. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'San José'**

GENÉVRIER DE CHINE 'SAN JOSÉ'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert grisâtre, odorantes. Coloration automnale vert clair. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus chinensis sargentii

GENÉVRIER DE SARGENT

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale gris vert. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Shimpaku'**

GENÉVRIER DE CHINE 'SHIMPAKU'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses piquantes, gris vert. Aiguilles vert mat, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Spartan'**

GENÉVRIER DE CHINE 'SPARTAN'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, régulier, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Coloration automnale vert foncé. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus chinensis* 'Variegated Kaizuka' (J. c. 'Torulosa Variegata')**

GENÉVRIER DE CHINE TORTUEUX PANACHÉ

2 Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, très irrégulier. Tiges se dégageant du reste du feuillage. Feuillage de texture légère. Aiguilles vert foncé, panachées de jaune crème, odorantes. Fruits bleus. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Juniperus x media* 'Angelica Blue'**

GENÉVRIER HYBRIDE 'ANGELICA BLUE'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 5,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleu intense, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media 'Gold Coast' (J. x m. 'Aurea')

GÉNÉVRIER HYBRIDE 'GOLD COAST'

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune d'or. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Gold Star' (J. x m. 'Bakaurea')

GÉNÉVRIER HYBRIDE 'GOLD STAR'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune d'or tout l'été. Aiguilles vert bleuté à reflets jaunes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Golden Glow' GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLDEN GLOW'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or éclatant toute la belle saison, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media 'Hetzii'

GÉNÉVRIER HYBRIDE 'HETZII'

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Coloration automnale violacée. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media 'Matthew's Blue' GENÉVRIER HYBRIDE 'MATTHEW'S BLUE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu acier, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media 'Mint Julep' (J. x m. 'Monlep'; J. x m. 'Seagreen')

GÉNÉVRIER HYBRIDE 'MINT JULEP'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert menthe brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Old Gold'

GÉNÉVRIER HYBRIDE 'OLD GOLD'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses dorées. Aiguilles vieil or, odorantes. Coloration automnale jaune foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Pfitzeriana'

GÉNÉVRIER DE PFITZER

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'

GÉNÉVRIER DE PFITZER DORÉ

Zone 4a. H. : 1,30 m. L. : 2,50 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune doré. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale verte. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus x media* 'Pfitzeriana Compacta'**

GENÉVRIER DE PFITZER COMPACT

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus x media* 'Pfitzeriana Glauca'**

GENÉVRIER DE PFITZER BLEU

Zone 4b. H. : 1,30 m. L. : 2,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus x media* 'Pfitzeriana Gold Lace'**

GENÉVRIER DE PFITZER 'GOLD LACE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus x media* 'Saybrook Gold' GENÉVRIER HYBRIDE 'SAYBROOK GOLD'**

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or brillant tournant au jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale jaune bronze. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Picea glauca* (*P. alba*; *P. canadensis*) ÉPINETTE BLANCHE**

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Alberta Globe' ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA EN BOULE**

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Coerulea' ÉPINETTE BLANCHE À FEUILLES BLEUTÉES**

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses très colorées. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Conica' (*P. g. albertiana* 'Conica')**

ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Densata' ÉPINETTE BLANCHE 'DENSATA'**

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

Picea glauca 'Echiniformis' ÉPINETTE BLANCHE 'ECHINIFORMIS'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca 'Jean's Dilly' ÉPINETTE BLANCHE 'JEAN'S DILLY'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair, tortueuses. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca 'North Star' ÉPINETTE BLANCHE 'NORTH STAR'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Picea glauca 'Pendula' ÉPINETTE BLANCHE PLEUREUSE

1 Zone 3a. H. : 10 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur, étroit. Tige centrale érigée, branches retombantes. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Picea glauca 'Pixie' ÉPINETTE BLANCHE 'PIXIE'

Zone 4a. H. : 60 m. L. : 30 cm. Port conique, régulier, miniature, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé à reflets bleutés, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca 'Rainbow's End' ÉPINETTE BLANCHE 'RAINBOW'S END'

2 Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune doré. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca 'Sander's Blue' ÉPINETTE BLANCHE 'SANDER'S BLUE'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleues puis vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL

OL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

ARBRES

Crataegus phaenopyrum AUBÉPINE DE WASHINGTON

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Nombreuses petites épines. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé brillant, rouge orangé en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs simples, blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Populus alba 'Pyramidalis' PEUPLIER ARGENTÉ PYRAMIDAL

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé dessus, blanchâtres dessous, puis jaune d'or en automne. Écorce décorative blanc grisâtre. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Plante allergène (troubles respiratoires).



Populus balsamifera

PEUPLIER BAUMIER

Plante indigène. Zone 2a. H. : 25 m. L. : 20 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fruits nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Populus x berolinensis

PEUPLIER DE BERLIN

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Populus nigra* 'Italica'**

PEUPLIER D'ITALIE

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune doré en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel produisant des rejets. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Populus nigra* 'Thevestina'**

PEUPLIER DE THÉVESSA

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fruits peu nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel produisant des rejets. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

***Salix* x 'Northern Fountains'**

SAULE PLEUREUR 'NORTHERN FOUNTAINS'

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port pleureur. Jeunes branches jaune doré. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert luisant. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Salix* x 'Prairie Cascade'**

SAULE 'PRAIRIE CASCADE'

3 Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pleureur. Jeunes branches jaune doré. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Cornus alba* (*C. tatarica*)**

CORNOUILLER BLANC

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Cornus alba* 'Aurea'**

CORNOUILLER DORÉ

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge et jaune. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d'or puis jaune pâle, jaune foncé en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

Cornus alba 'Bud's Yellow'

CORNOUILLER BLANC 'BUD'S YELLOW'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Cream Cracker'

CORNOUILLER BLANC 'CREAM CRACKER'

I Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge pourpre. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes, bordées de jaune. Feuilles vertes bordées de crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Elegantissima' (C. a. 'Argenteomarginata')

CORNOUILLER ARGENTÉ

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris bleuté, largement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Cornus alba 'Gouchaultii'

CORNOUILLER DE GOUCHAULT

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses tachetées de rose. Feuilles vertes panachées de jaune, puis jaune verdâtre. Fruits en baies bleu pâle. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Ivory Halo' (C. a. 'Bailhalo')

CORNOUILLER BLANC 'IVORY HALO'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé légèrement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Kesselringii'

CORNOUILLER DE KESSELRING

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches pourpre foncé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Siberian Pearls'

CORNOUILLER BLANC 'SIBERIAN PEARLS'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge clair. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

CORNOUILLER DE SIBÉRIE PANACHÉ

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture dense. Feuilles gris vert, bordées de blanc, puis rouge carmin en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

Cornus alba 'Sibirica' (C. a. 'Korall')

CORNOUILLER DE SIBÉRIE

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Touch of Elegance' (C. a. 'Staltouch')

CORNOUILLER BLANC 'TOUCH OF ELEGANCE'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, marginées de blanc, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Variegata'

CORNOUILLER BLANC PANACHÉ

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus pumila

CORNOUILLER NAIN

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourprées. Feuilles vertes teintées de pourpre. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Salix discolor

SAULE DISCOLORE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles vertes, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

Salix hookeriana 'Clastop'

SAULE DE HOOKER 'CLASTOP'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé, brillantes, grisâtres en dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en gros chatons. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Salix koriyanagi 'Rubykins'

SAULE 'RUBYKINS'

2 Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses rose pâle. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).





SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | très humide

ARBRES

Populus x canadensis 'Eugenei' (*P. x euramericana* 'Eugenei')

PEUPLIER 'EUGENEI'

Zone 2a. H. : 30 m. L. : 10 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Populus x canadensis 'Prairie Sky' (*P. x euramericana* 'Prairie Sky')

PEUPLIER 'PRAIRIE SKY'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Populus x canadensis 'Robusta' (*P. x euramericana* 'Robusta')

PEUPLIER 'ROBUSTA'

Zone 3a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vertes, jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Populus x canadensis 'Souixland' (*P. x euramericana* 'Souixland')

PEUPLIER 'SOUIXLAND'

1 Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vertes, jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Salix purpurea 'Gracilis' (*S. p.* 'Nana') SAULE ARCTIQUE NAIN

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Rameaux pourpre foncé. Feuilles vert grisâtre, glauques dessous, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative gris verdâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]

Salix purpurea 'Pendula' SAULE ARCTIQUE PLEUREUR

2 Zone 2b. H. : 50 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux pourpre foncé. Feuilles vert grisâtre, glauques dessous, puis jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative gris verdâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port pleureur.]

SOLEIL

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Ribes odoratum

GADELIER ODORANT

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits noirs, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Rubus thibetanus* (R. t. 'Silver Fern')**

RONCE DU TIBET

3 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses, grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très découpées, gris argenté. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

CONIFÈRES

Juniperus sabina

GENÉVRIER SABINE

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'Arcadia'**

GENÉVRIER SABINE 'ARCADIA'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert gris clair, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Blue Danube' (J. s. 'Blaue Donau')**

GENÉVRIER SABINE 'BLUE DANUBE'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert gris bleuté, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Buffalo'**

GENÉVRIER SABINE 'BUFFALO'

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 1,80 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'Calgary Carpet' (J. s. 'Monna')**

GENÉVRIER SABINE 'CALGARY CARPET'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Moor-Dense' (J. s. 'Monard')**

GENÉVRIER SABINE 'MOOR-DENSE'

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).

***Juniperus sabina* 'New Blue' (J. s. 'Tamariscifolia New Blue')**

GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX BLEUES

1 Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleutées, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Tamariscifolia' GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX**

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus sabina* 'Variegata' GENÉVRIER SABINE PANACHÉ**

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre tachetées de blanc crème, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement acide | sec

ARBUSTES

***Rhus typhina* 'Laciniata' (R. t. 'Dissecta')**

SUMAC DE VIRGINIE À FEUILLES LACINIÉES

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine. Feuilles très découpées, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, très drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | léger | neutre | frais et bien drainé

ROSIERS

***Rosa hybrida* série Explorateur 'David Thompson'**

ROSIER 'DAVID THOMPSON'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port large. Feuillage vert brillant. Fleurs semi-doubles à doubles, rose foncé à rouge clair, parfumées. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.

***Rosa hybrida* série Explorateur 'George Vancouver'**

ROSIER 'GEORGE VANCOUVER'

2 Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port érigé et large. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs abondantes, doubles, rouge foncé à rouge, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance au blanc ou à la tache noire.



Rosa hybrida série Explorateur 'Jens Munk'

ROSIER 'JENS MUNK'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges érigées très épineuses. Petites feuilles, vert clair, gaufrées. Fleurs en grappes, semi-doubles, roses à étamines jaunes, au parfum épicé. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance à la tache noire et au blanc.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | léger | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Calluna vulgaris 'Alba Erecta'

BRUYÈRE COMMUNE 'ALBA ERECTA'

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison en été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Allegro'

BRUYÈRE COMMUNE 'ALLEGRO'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison en été. Fleurs rouge foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Boskoop'

BRUYÈRE COMMUNE 'BOSKOOP'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaunes, puis orange et rouge en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs lavande, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Cuprea'

BRUYÈRE COMMUNE 'CUPREA'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaune d'or en été, cuivre en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs violettes, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Darkness'

BRUYÈRE COMMUNE 'DARKNESS'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge cramoisi, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Firefly'

BRUYÈRE COMMUNE 'FIREFLY'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaune orangé en été qui tourne au rouge brique en hiver. Floraison à la fin de l'été. Fleurs mauve foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'H.E. Beale' BRUYÈRE COMMUNE 'H.E. BEALE'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à la fin de l'été. Fleurs doubles, roses, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'J.H. Hamilton' BRUYÈRE COMMUNE 'J.H. HAMILTON'

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs doubles, rose saumon, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Marleen' BRUYÈRE COMMUNE 'MARLEEN'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison en automne. Boutons blancs. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Multicolor' BRUYÈRE COMMUNE 'MULTICOLOR'

Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes à reflets orange et rouge, cuivre en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Spring Cream' BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING CREAM'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Spring Torch' BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING TORCH'

I Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses crème. Feuilles persistantes, vertes. Floraison à l'automne. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris 'Tib' BRUYÈRE COMMUNE 'TIB'

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vertes. Floraison en été. Fleurs doubles, rose foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Physocarpus opulifolius PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' PHYSOCARPE 'DART'S GOLD'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles jaunes en été, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Physocarpus opulifolius* 'Diabolo' (P. o. 'Monlo')**

PHYSOCARPE 'DIABOLO'

2 Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port semi-pleureur.]

***Physocarpus opulifolius* 'Luteus'** PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER JAUNES

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles verdâtres, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Physocarpus opulifolius* 'Nugget' (P. o. 'Golden Nugget')**

PHYSOCARPE 'NUGGET'

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune brillant. Feuilles vert chartreuse, jaunâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Physocarpus opulifolius* 'Summer Wine'**


PHYSOCARPE 'SUMMER WINE'

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Physocarpus opulifolius* 'Tilden Park'**

PHYSOCARPE 'TILDEN PARK'

3 Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.





OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

CONIFÈRES

***Pinus contorta* 'Spaan's Dwarf'** PIN TORTUEUX 'SPAAN'S DWARF'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port nain, irrégulier. Aiguilles très serrées sur les branches. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus contorta* 'Taylor's Sunburst'** PIN TORTUEUX 'TAYLOR'S SUNBURST'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune d'or brillant. Aiguilles jaune pâle, puis vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Sciadopitys verticillata SCIADOPITYS VERTICILLATA

1 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | lourd | très acide | très humide

ARBUSTES

Salix arenaria SAULE RAMPANT ARGENTÉ

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses gris argent. Feuilles gris argent, au dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur.]

Salix repens SAULE RAMPANT

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert grisâtre, dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons jaunâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | léger à lourd | très acide | humide

ARBUSTES

***Aronia melanocarpa* (A. nigra)** ARONIE NOIRE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Aronia melanocarpa* 'Autumn Magic'** ARONIE NOIRE 'AUTUMN MAGIC'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noir brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Aronia melanocarpa* 'Iroquois Beauty' (A. m. 'Morton')** ARONIE NOIRE 'IROQUOIS BEAUTY'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Aronia melanocarpa* 'Viking'** ARONIE NOIRE 'VIKING'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches parfumées. Gros fruits noirs et brillants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | très humide

ARBUSTES

***Ledum groenlandicum* (L. canadense)** THÉ DU LABRADOR

2 Plante indigène. Zone 1a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, brunes en dessous, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

***Hypericum frondosum* (H. aureum)** HYPERICUM FRONDOSUM

Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs jaune orange vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Hypericum frondosum* 'Sunburst'** HYPERICUM FRONDOSUM 'SUNBURST'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Hypericum kalmianum MILLEPERTUIS DE KALM

Plante indigène. Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Hypericum kalmianum* 'Ames'** MILLEPERTUIS DE KALM 'AMES'

Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Cytisus x kewensis* 'Cyni'** CYTISE DE KEW 'CYNÍ'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Cytisus x kewensis* 'Niki'** CYTISE DE KEW 'NIKI'

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune d'or. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | neutre | sec à très humide

ARBUSTES

Hypericum prolificum HYPERICUM PROLIFICUM

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, gris bleu dessous. Floraison au début de l'été. Feurs jaune brillant à étamines décoratives. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Daphne cneorum DAPHNÉ CANULÉ

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs roses, parfumées. Fruits jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

***Daphne cneorum* 'Pygmaea Alba'** DAPHNÉ CANULÉ 'PYGMAEA ALBA'

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits jaunes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

***Daphne cneorum* 'Ruby Glow'** DAPHNÉ CANULÉ 'RUBY GLOW'

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs rose foncé, parfumées. Fruits jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | acide à alcalin | sec

CONIFÈRES

***Juniperus horizontalis* 'Limeglow' (J. h. 'Noslg')**

GENÉVRIER HORIZONTAL 'LIMEGLOW'

Zone 3b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port évasé, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune chartreuse brillant. Écailles vert jaunâtre, odorantes. Coloration automnale pourpre et orangé. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Juniperus horizontalis* 'Mother Lode'**

GENÉVRIER HORIZONTAL 'MOTHER LODE'

Zone 4a. H. : 25 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles jaune brillant, odorantes. Coloration automnale jaune bronze. Fruits bleu pâle. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | très alcalin | sec

CONIFÈRES

Juniperus rigida

GENÉVRIER DU TEMPLE

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Rameaux retombants. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

ROSIERS

***Rosa eglanteria* 'Amy Robsart' (R. rubiginosa 'Amy Robsart')**

ROSIER 'AMY ROBSART'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Feuillage vert, coloré en automne. Fleurs simples, rose foncé éclairé de blanc au centre, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges décoratifs.

***Rosa gallica* 'Belle de Crécy'**

ROSIER 'BELLE DE CRÉCY'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port semi-vigoureux. Branches peu épineuses. Feuillage vert bleuté. Fleurs en bouquets, doubles, rose cerise avec des reflets violets, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

***Rosa gallica* 'Cardinal de Richelieu' ROSIER 'CARDINAL DE RICHELIEU'**

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port bas. Tiges peu épineuses. Feuillage vert avec des traces de marron. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets argentés et un œil plus clair au centre, très parfumées. Floraison au début de l'été.

Rosa gallica 'Ipsilanté'

ROSIER 'IPSIANTÉ'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant dense. Tiges épineuses rouges. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, mauve au centre, rose plus pâle vers l'extérieur, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps.

Rosa rubrifolia (*R. glauca*)

ROSIER À FEUILLES ROUGES

1 Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Port lâche. Tiges rouge pourpre, sans épines. Feuillage gris pourpre. Fleurs en grappes, simples, rose lilas à base blanche, étamines jaunes. Aucun parfum. Floraison au début du printemps. Fruits rouges, puis pourpres. Bonne résistance aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec****ARBUSTES****Caragana tragacanthoides**

CARAGANA À ÉPINES ROUGES

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges portant des épines rouges. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port tabulaire.]

Cotinus coggygria 'Golden Spirit' (*C. c.* 'Ancot')

ARBRE À PERRUQUE 'GOLDEN SPIRIT'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Tiges rouges. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuilles dorées, rouge orange et corail en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Cotoneaster acutifolius (*C. pekinensis*; *C. lucidus*)

COTONÉASTER DE PÉKIN

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, semi-lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits noirs, puis rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Halimodendron halodendron

HALIMODENDRON

2 Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris vert, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs mauves. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]

Prunus tenella 'Fire Hill'

AMANDIER 'FIRE HILL'

3 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert grisâtre, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose rouge, brillantes, abondantes. Fruits jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Morus alba

MÛRIER BLANC

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 15 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Morus alba 'Chapparl'

MÛRIER BLANC 'CHAPPARAL'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Morus alba 'Greenwave'

MÛRIER BLANC 'GREENWAVE'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Morus alba 'Macrophylla'

MÛRIER BLANC 'MACROPHYLLA'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert clair. Fruits violet, rose et blanc. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Morus alba 'Pendula'

MÛRIER BLANC 'PENDULA'

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré. Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.



CONIFÈRES

Juniperus communis 'Compressa' GÉNÉVRIER COMMUN 'COMPRESSA'

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 15 cm. Port érigé, très étroit, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert clair, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (dermatite).

Juniperus communis 'Depressa Aurea'

GÉNÉVRIER COMMUN 'DEPRESSA AUREA'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Branches horizontales aux extrémités retombantes. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune pâle. Aiguilles piquantes, jaune doré et vert sombre à reflets bleus, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

ROSIERS

Rosa pimpinellifolia altaica ROSIER PIMPRENELLE ALTAICA

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Branches brunes, très épineuses. Feuillage vert grisâtre. Grandes fleurs solitaires, simples, jaune primevère, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits brun à noir. Très résistant aux insectes et maladies.

Rosa pimpinellifolia 'Frühlingsmorgen'

ROSIER PIMPRENELLE 'FRÜHLINGSMORGEN'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches arquées. Feuillage vert grisâtre. Fleurs simples, jaune primevère au centre et rose cerise sur l'extérieur des pétales, étamines marron décoratives, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits marron à l'automne.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Salix matsudana 'Golden Curls' SAULE DE PÉKIN 'GOLDEN CURLS'

Zone 5a. H. : 9,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges jaune doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Salix matsudana 'Scarlet Curls' SAULE DE PÉKIN 'SCARLET CURLS'

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Nouvelles pousses rouges. Tiges jaune doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Salix matsudana 'Tortuosa' SAULE DE PÉKIN TORTUEUX

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi irrégulier. Tiges vertes, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

ARBUSTES

Salix interior (*Salix exigua*)

SAULE À FEUILLES ÉTROITES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Tiges verdâtres. Jeunes feuilles gris argenté, puis vert argenté et vert bronze en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons jaunâtres. Écorce brun rougeâtre teintée de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec

ARBRES

Robinia pseudoacacia 'Frisia'

ROBINIER FAUX-ACACIA 'FRISIA'

Zone 5b. H. : 9,00 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles jaunes au printemps, en été et à l'automne. Floraison en début d'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

ROSIERS

Rosa rugosa 'Agnes'

ROSIER RUGUEUX 'AGNES'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé et lâche. Tiges épineuses. Fleurs doubles, jaune chamois ou jaune ambré, au fort parfum fruité. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa alba

ROSIER RUGUEUX À FLEURS BLANCHES

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs simples, blanc pur, étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Belle Poitevine'

ROSIER RUGUEUX 'BELLE POITEVINE'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs en grappes, semi-doubles à doubles, rose moyen, aux étamines jaune très pâle, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa série 'Grootendorst'

ROSIER RUGUEUX SÉRIE 'GROOTENDORST'

Zone 3a. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs en grappes, doubles, roses, rouges ou blanches, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Magnifica'

ROSIER RUGUEUX MAGNIFIQUE

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Grandes fleurs, en grosses grappes, semi-doubles, rose foncé, aux étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa série 'Max Graf'

ROSIER RUGUEUX SÉRIE 'MAX GRAF'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port en couvre-sol. Tiges rampantes, très épineuses. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes, simples, rose clair, rouge lumineux ou blanc pur, au léger parfum de pomme. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Mrs John McNabb' ROSIER RUGUEUX 'MRS JOHN McNABB'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs semi-doubles, blanches avec de légers reflets roses et des étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Robusta' ROSIER RUGUEUX 'ROBUSTA'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs simples, rouges, aux étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Schneezwerg' ROSIER RUGUEUX 'SCHNEEZWERG'

1 Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs semi-doubles, blanc pur, aux étamines jaunes au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa 'Will Alderman' ROSIER RUGUEUX 'WILL ALDERMAN'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées, vert clair. Fleurs doubles, rose lilas, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Fothergilla major

FOTHERGILLA ROBUSTE

2 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Fothergilla major 'Mount Airy' FOTHERGILLA ROBUSTE 'MOUNT AIRY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert bleuté, glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | sec

CONIFÈRES

Pinus cembra

PIN CEMBRO

3 Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus cembra 'Blue Mound' PIN CEMBRO 'BLUE MOUND'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu-tées, brillantes, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.



***Pinus cembra* 'Compacta Glauca'** PIN CEMBRO 'COMPACTA GLAUCA'

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu-tées, brillantes, gris bleuté dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus cembra* 'Nana'** PIN CEMBRO NAIN

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Corylus colurna NOISETIER DE BYZANCE

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Corylus colurna* 'Te Terra Red'** NOISETIER DE BYZANCE POURPRE

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé en été et en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Sorbus intermedia ALISIER DE SUÈDE

Zone 4. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Syringa julianae* 'Hers'** LILAS PLEUREUR 'HERS'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, finement découpées. Floraison au début de l'été. Fleurs mauve pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa reticulata* 'Golden Eclipse'** LILAS DU JAPON 'GOLDEN ECLIPSE'

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 3,50 m. Port ovoïde compact. Feuillage de texture dense. Nouvelles feuilles vertes au centre plus foncé. Feuilles vert foncé au bord jaune doré. Floraison en début d'été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Syringa reticulata 'Ivory Silk' LILAS DU JAPON 'IVORY SILK'

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif brillant, grisâtres dessous. Floraison en début d'été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Tilia* x *euchlora TILLEUL DE CRIMÉE

Zone 4b. H. : 17 m. L. : 7,00 m. Port conique large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert foncé, glauques dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison de début d'été. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia tomentosa 'Satin Shadow' (*T. t.* 'Sashazam') TILLEUL ARGENTÉ 'SATIN SHADOW'

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Callicarpa bodinieri giraldii 'Profusion' CALLICARPA DE GIRALD 'PROFUSION'

1 Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, puis jaune et violacé en automne. Floraison en fin d'été. Fleurs rose lilas. Fruits violets, très luisants, abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster dammeri COTONÉASTER DE DAMMER

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster dammeri 'Eicholz' COTONÉASTER DE DAMMER 'EICHOLZ'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert clair, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Gros fruits rouge carmin. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Forsythia* x 'Boucle d'Or'** (*F.* x 'Courtacourt') FORSYTHIA 'BOUCLE D'OR'

Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Golden Times'** FORSYTHIA 'GOLDEN TIMES'

2 Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert et jaune tachetées de rose. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Happy Centennial'** FORSYTHIA 'HAPPY CENTENNIAL'

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Forsythia* x 'Maluch'**

FORSYTHIA 'MALUCH'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Marée d'Or' (F. x 'Courtasol')**

FORSYTHIA 'MARÉE D'OR'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pamplemousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Meadowlark'**

FORSYTHIA 'MEADOWLARK'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Minigold (F. x 'Flojor)'**

FORSYTHIA 'MINIGOLD'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'New Hampshire Gold'**

FORSYTHIA 'NEW HAMPSHIRE GOLD'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Northern Gold'**

FORSYTHIA 'NORTHERN GOLD'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune doré. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde.]

***Forsythia ovata* 'Ottawa'**

FORSYTHIA PRÉCOCE 'OTTAWA'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Forsythia* x 'Sunrise'**

FORSYTHIA 'SUNRISE'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Petites fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Forsythia x 'Week End' (F. x 'Courtalyn') FORSYTHIA 'WEEK END'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Philadelphus coronarius 'Aureus' SERINGAT DORÉ

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune vif. Feuilles vert jaunâtre, légèrement odorantes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

Syringa x 'Agincourt Beauty' LILAS HYBRIDE 'AGINCOURT BEAUTY'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Albert F. Holden' LILAS HYBRIDE 'ALBERT F. HOLDEN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé à revers argenté, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Avalanche' LILAS HYBRIDE 'AVALANCHE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Belle de Nancy' LILAS HYBRIDE 'BELLE DE NANCY'

■ Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Burgundy Queen' LILAS HYBRIDE 'BURGUNDY QUEEN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière hâtive. Fleurs pourpres, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Charles Joly' LILAS HYBRIDE 'CHARLES JOLY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs doubles, rouge pourpre au revers plus clair (bicolore), très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Dappled Dawn' LILAS HYBRIDE 'DAPPLED DAWN'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mauve pâle, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]



1



2



3

***Syringa* x 'Edward J. Gardner'**

LILAS HYBRIDE 'EDWARD J. GARDNER'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs roses, doubles, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Syringa* x *hyacinthiflora* 'Angel White'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ANGEL WHITE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa* x *hyacinthiflora* 'Asessippi'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ASESSIPPI'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa* x *hyacinthiflora* 'Churchill'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'CHURCHILL'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa* x *hyacinthiflora* 'Excel'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'EXCEL'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs bleu lilas, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa* x *hyacinthiflora* 'Lavender Lady'**

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'LAVENDER LADY'

3 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lavande, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Syringa x hyacinthiflora 'Maiden's Blush'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MAIDEN'S BLUSH'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x hyacinthiflora 'Mount Baker'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MOUNT BAKER'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x hyacinthiflora 'Pocahontas'

LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'POCAHONTAS'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs violet foncé, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x 'Katherine Havemeyer' LILAS HYBRIDE 'KATHERINE HAVEMEYER'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs doubles, bleu lavande rosé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Krasavitsa Moskvj' (S. x 'Beauté de Moscou'; S. x 'Beauty of Moscow')

LILAS HYBRIDE 'KRASAVITSA MOSKVY'

I Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons argentés. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Little Boy Blue' LILAS HYBRIDE 'LITTLE BOY BLUE'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs bleu ciel, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Marie Frances' LILAS HYBRIDE 'MARIE FRANCES'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 1,75 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Michel Buchner' LILAS HYBRIDE 'MICHEL BUCHNER'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs, lavande, abondantes, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]



Syringa x 'Miss Ellem Willmott'

LILAS HYBRIDE 'MISS ELLEM WILLMOTT'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Madame Lemoine'

LILAS HYBRIDE 'MADAME LEMOINE'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Monge'

LILAS HYBRIDE 'MONGE'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs, rouge pourpre foncé, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Mrs Edward Harding'

LILAS HYBRIDE 'MRS EDWARD HARDING'

3 Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs doubles, rose pourpre, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Nadezha'

LILAS HYBRIDE 'NADEZHA'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs bleu pâle, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Paul Thirion'

LILAS HYBRIDE 'PAUL THIRION'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, aux différents tons de rose, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Pink Elizabeth'

LILAS HYBRIDE 'PINK ELIZABETH'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Syringa x 'Prairie Petite'

LILAS HYBRIDE 'PRAIRIE PETITE'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'President Grevy'

LILAS HYBRIDE 'PRESIDENT GREVY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs doubles, bleu mauve, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Président Poincaré'

LILAS HYBRIDE 'PRÉSIDENT POINCARÉ'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, rose très foncé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Primrose'

LILAS HYBRIDE 'PRIMROSE'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons jaune foncé. Fleurs jaune pâle, puis blanc crème, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Prodige'

LILAS HYBRIDE 'PRODIGE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Sensation'

LILAS HYBRIDE 'SENSATION'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Boutons roses foncé. Fleurs rouge pourpre, bordées de blanc argenté, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Slater's Elegance'

LILAS HYBRIDE 'SLATER'S ELEGANCE'

1 Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière. Grosses fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Souvenir de Ludwig Spaeth' (S. x 'Andenken an Ludwig Späth')

LILAS HYBRIDE 'SOUVENIR DE LUDWIG SPAETH'

2 Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison printanière tardive. Fleurs rose violacé, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x 'Tinkerbelle' (S. x 'Bailbelle')

LILAS HYBRIDE 'TINKERBELLE'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rouge vin. Fleurs rose foncé, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port arrondi, régulier.]

Syringa vulgaris

LILAS COMMUN

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x 'Wedgewood Blue'

LILAS HYBRIDE 'WEDGEWOOD BLUE'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair vif. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose lilas. Fleurs bleues, très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

ROSIERS

Rosa moyesii 'Eddie's Jewel'

ROSIER 'EDDIE'S JEWEL'

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port lâche. Branches épineuses, rougeâtres. Feuillage vert bleuté. Fleurs semi-doubles, rouge brique pâle, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge orangé.

Rosa moyesii 'Geranium'

ROSIER 'GERANIUM'

3 Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes simples, rouge cramoisi, étamines jaune crème très voyantes, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge orangé, très décoratifs.





OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Sorbus aucuparia

SORBIER DES OISEAUX

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Sorbus aucuparia* 'Asplenifolia'**

SORBIER DES OISEAUX À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Sorbus aucuparia* 'Cardinal Royal' (S. a. 'Michred')**

SORBIER DES OISEAUX 'CARDINAL ROYAL'

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge clair, persistants. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

***Sorbus aucuparia* 'Fastigiata'**

SORBIER DES OISEAUX FASTIGIÉ

1 Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ondulées, vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Sorbus aucuparia* 'Pendula'**

SORBIER DES OISEAUX PLEUREUR

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

***Sorbus aucuparia* 'Rossica'**

SORBIER DES OISEAUX 'ROSSICA'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits gros, rouge foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

ARBUSTES

***Cotoneaster horizontalis* 'Hessei'**

COTONÉASTER HORIZONTAL DE HESSE

Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées, rouge vin en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Corylus americana

NOISETIER D'AMÉRIQUE

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires)

Lonicera maximowiczii sachalinensis

CHÈVREFEUILLE DE SAKHALINE

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Syringa microphylla* 'Superba'**

LILAS SUPERBE

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]

***Syringa villosa* 'Aurea'**

LILAS DUVETÉUX DORÉ

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d'or, puis vert chartreuse. Floraison estivale. Fleurs rose lilas, virant au rose pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Viburnum x carlcephalum

VIORNE CARLCEPHALUM

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanc pur, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

CONIFÈRES

***Abies alba* 'Pendula'**

SAPIN COMMUN PLEUREUR

2 Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, branches secondaires pleureuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Abies concolor

SAPIN BLANC DU COLORADO

Zone 4b. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Abies concolor 'Compacta'

SAPIN BLANC DU COLORADO COMPACT

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Larix kaempferi (*L. leptolepis*)

MÉLÈZE DU JAPON

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix kaempferi 'Blue Ball'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE BALL'

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu pâle. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire.]

Larix kaempferi 'Blue Dwarf'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE DWARF'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu intense. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]

Larix kaempferi 'Blue Rabbit'

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE RABBIT'

Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune, puis orange. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Larix kaempferi 'Diane' (*L. k.* 'Diana'; *L. k.* 'Diana Contorta'; *L. k.* 'Contorta')

MÉLÈZE DU JAPON 'DIANE'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, tortillées, vert bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix kaempferi 'Jakobsen's Pyramid'

MÉLÈZE DU JAPON 'JAKOBSEN'S PYRAMID'

Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Larix kaempferi 'Nana'

MÉLÈZE DU JAPON NAIN



Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.



***Larix kaempferi* 'Pendula' (L. k. 'Inversa')**

MÉLÈZE DU JAPON PLEUREUR

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

***Larix kaempferi* 'Stiff Weeping' MÉLÈZE DU JAPON 'STIFF WEEPING'**

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port pleureur étroit. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

***Pinus peuce* PIN DE MACÉDOINE**

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits verts, résineux, devenant bruns. Écorce rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pseudotsuga menziesii* 'Carnefix Weeping' SAPIN DE DOUGLAS 'CARNEFIX WEEPING'**

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii* 'Emerald Twister' (P. m. 'Torquis') SAPIN DE DOUGLAS 'EMERALD TWISTER'**

2 Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port érigé, large très irrégulier. Tiges principale et secondaires tortueuses. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii glauca* SAPIN DE DOUGLAS BLEU**

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles bleutées, odorantes. Fleurs rougeâtres. Fruits bruns, pendants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Pseudotsuga menziesii* 'Loggerhead' SAPIN DE DOUGLAS 'LOGGERHEAD'**

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étalé, rampant, plat sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Pseudotsuga menziesii 'Pendula' SAPIN DE DOUGLAS PLEUREUR

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

PLANTES GRIMPANTES

Lonicera x 'Mandarin' CHÈVREFEUILLE 'MANDARIN'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Fleurs tubulaires, orange mandarine et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

ROSIERS

Rosa hybrida Musks 'Ballerina' ROSIER 'BALLERINA'

Zone 5b. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant, dense. Fleurs en grappes, simples, rose pâle et rose plus foncé et à base blanche. Aucun parfum. Floraison continue. Petits fruits orange, décoratifs.

Rosa hybrida Musks 'Buff Beauty' ROSIER 'BUFF BEAUTY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port vigoureux et large. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes, doubles, jaunes avec des reflets abricot, moyennement parfumées. Floraison au début de l'été.

Rosa hybrida Musks 'Mozart' ROSIER 'MOZART'



Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port vigoureux et buissonnant. Tiges arquées. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes, très nombreuses, simples, rouge carmin avec un cœur blanc au centre, moyennement parfumées. Floraison au début de l'été puis sporadiquement par la suite.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Betula utilis jacquemontii BOULEAU DE JACQUEMONT

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture fine. Pousses duveteuses, puis rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs en longs chatons. Écorce décorative blanc pur, s'exfoliant, même chez les jeunes sujets. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Carya cordiformis CARYER CORDIFORME

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 22 m. Port globulaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Acer palmatum ÉRABLE DU JAPON

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Acer palmatum* 'Atropurpureum'** ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES POURPRES

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge clair au printemps, plus foncées en été. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Bloodgood'** ÉRABLE DU JAPON 'BLOODGOOD'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge sang. Feuilles rouge foncé, puis rouge pourpre intense. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Crimson Queen'** ÉRABLE DU JAPON 'CRIMSON QUEEN'

2 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Dissectum'** ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Branches et rameaux verts. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, vertes, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Dissectum Garnet'** ÉRABLE DU JAPON 'DISSECTUM GARNET'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles pourpre très foncé, orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Inabashidare'** ÉRABLE DU JAPON 'INABASHIDARE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles découpées, rouge pourpre, puis rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Acer palmatum* 'Red Dragon'** ÉRABLE DU JAPON 'RED DRAGON'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre très foncé, puis rouge brillant en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Acer palmatum 'Red Pygmy' ÉRABLE DU JAPON 'RED PYGMY'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture moyenne. Feuilles découpées, rouge marron, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum 'Seiryû' ÉRABLE DU JAPON 'SEIRYÛ'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuillage de texture fine. Feuilles découpées, vertes, puis jaunes ou rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Chaenomeles speciosa COGNASSIER À FLEURS

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs rouge écarlate. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Geisha Girl' COGNASSIER À FLEURS 'GEISHA GIRL'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rose pêche. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Rubra' COGNASSIER À FLEURS ROUGES

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge écarlate, semi-doubles. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa 'Toyo-Nishiki' COGNASSIER À FLEURS 'TOYO-NISHIKI'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, très lustrées. Floraison printanière. Fleurs rouge et blanc ; rose et rouge ou rouge et blanc. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chamaecytisus purpureus (*Cytisus purpureus*)

CYTISE À FLEURS POURPRES

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Magnolia sieboldii MAGNOLIA DE SIEBOLD

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière, puis un peu par la suite. Fleurs blanches, au cœur marron et aux étamines roses, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia x soulangiana MAGNOLIA DE SOULANGE

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, teintées de rose à l'extérieur, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.



***Magnolia x soulangiana* 'Rustica Rubra'**

MAGNOLIA DE SOULANGE 'RUSTICA RUBRA'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose foncé à l'extérieur, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

***Magnolia stellata* (*M. kobus stellata*)**

MAGNOLIA ÉTOILÉ

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Magnolia stellata* 'Pink Star'**

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'PINK STAR'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Magnolia stellata* 'Royal Star'**

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'ROYAL STAR'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en forme d'étoiles, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Magnolia stellata* 'Waterlily'**

MAGNOLIA ÉTOILÉ 'WATERLILY'

1 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia x 'Susan'

MAGNOLIA 'SUSAN'

Zone 5b. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Sorbus koehneana

SORBIER DE KOEHNE

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, d'abord chocolat puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blanc ivoire. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Sorbus reducta

SORBIER MINIATURE

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, puis bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits roses, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Spiraea thunbergii

SPIRÉE DE THUNBERG

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea thunbergii* 'Fugino Pink'**

SPIRÉE DE THUNBERG 'FUGINO PINK'

1

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, rouge et orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pâle. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea thunbergii* 'Mount Fuji'**

SPIRÉE DE THUNBERG 'MOUNT FUJI'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses. Feuilles vertes bordées de blanc, parfois tachetées de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Syringa meyeri* 'Palibin' (*S. palibiniana*)**

LILAS DE CORÉE NAIN

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs lilas clair à lilas rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]

***Syringa meyeri* 'Snowstorm'**

LILAS DE CORÉE NAIN À FLEURS BLANCHES

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Boutons roses. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.

***Viburnum* x *rhytidophylloides* 'Alleghany'**

VIORNE 'ALLEGHANY'

2

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert très foncé, grises dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge brillant, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Weigela middendorffiana

WEIGELA DE MIDDENDORF

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris.

CONIFÈRES

***Abies lasiocarpa* 'Compacta'**

SAPIN DE L'OUEST COMPACT

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fruits pourpre foncé, puis bruns. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.



***Abies lasiocarpa* 'Green Globe'** SAPIN DE L'OUEST 'GREEN GLOBE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, à la tige centrale érigée. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Aurea' (C. n. 'Lutea')**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA DORÉ

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles en écailles jaune verdâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Oregon Blue Weeping'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'OREGON BLUE WEeping'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles bleutées, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Glaucua'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA BLEUTÉ

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Jubilee'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'JUBILEE'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, étroit. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert clair, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Pendula'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA PLEUREUR

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis nootkatensis* 'Strict Weeping'**

FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'STRICT WEeping'

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, très étroit. Feuillage de texture légère. Branches retombantes, peu nombreuses. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

***Chamaecyparis obtusa* 'Blue Feathers'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'BLUE FEATHERS'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles gris bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Crippsii'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'CRIPPSII'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, large, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles jaune doré, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Fernspray Gold'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FERNSPRAY GOLD'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune très intense. Feuilles en écailles jaune citron, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Filicoides'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FILICOIDES'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles vert brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Kosteri'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'KOSTERI'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port nain, pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Nana'** FAUX-CYPRÈS D'HINOKI NAIN

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port nain, globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Nana Aurea' (C. o. 'Aurea Nana')**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI DORÉ NAIN

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles jaunes sur un fond vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Nana Gracilis'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'NANA GRACILIS'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis obtusa* 'Saffron Spray'**

FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'SAFFRON SPRAY'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vertes. Feuilles en écailles vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Pinus nigra* 'Hornibrookiana'** PIN NOIR 'HORNIBROOKIANA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.

***Pinus parviflora* 'Glauca'** PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Glauca Nana'** PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ NAIN

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Goldilocks'** PIN BLANC JAPONAIS 'GOLDILOCKS'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles droites ou tordues, bleutées tachetées de jaune, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus parviflora* 'Tempelhof'** PIN BLANC JAPONAIS 'TEMPELHOF'

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, ouvert. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus strobus PIN BLANC

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté marquées de points blancs, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Blue Shag'** PIN BLANC 'BLUE SHAG'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Pinus strobus* 'Contorta' (P. s. 'Torulosa')**
PIN BLANC TORTUEUX

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches et rameaux tortueux. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, argentées dessous, tordues, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Golden Candles'** PIN BLANC 'GOLDEN CANDLES'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, pyramidal. Jeunes pousses jaunes. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

***Pinus strobus* 'Nana'** PIN BLANC NAIN

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair bleuté. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,75 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]

***Pinus strobus* 'Pendula'** PIN BLANC PLEUREUR

Zone 4b. H. : 70 cm. L. : 3,00 m. Port bas aux branches rampantes. Tiges tortueuses. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur.]

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Pinus strobus 'Pygmaea'

PIN BLANC 'PYGMAEA'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes légèrement bleutées, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Pinus strobus 'Sea Urchin'

PIN BLANC 'SEA URCHIN'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleutées, grises dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Pinus strobus 'White Mountain'

PIN BLANC 'WHITE MOUNTAIN'

I Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu poudre, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Taxus cuspidata 'Aurescens'

IF DU JAPON DORÉ

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Aiguilles jaunâtres devenant vertes. Coloration automnale vert foncé. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus cuspidata 'Dwarf Bright Gold' (*T. c.* 'Bright Gold')

IF DU JAPON 'DWARF BRIGHT GOLD'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles jaune d'or. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

PLANTES GRIMPANTES

Celastrus scandens

BOURREAU DES ARBRES

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge (sur les plants femelles). Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plant mâle allergène (troubles respiratoires).

Celastrus orbiculatus 'Diana'

BOURREAU DES ARBRES 'DIANA'

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs femelles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Celastrus orbiculatus 'Hercules'

BOURREAU DES ARBRES 'HERCULES'

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs mâles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | humide

CONIFÈRES

Thuja standishii

CÈDRE DU JAPON

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert pâle, grisâtres dessous, odorantes. Coloration automnale. Fruits verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.



OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | très alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Cornus mas

CORNOUILLER MÂLE

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Cornus mas 'Aurea'

CORNOUILLER MÂLE DORÉ

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaunes, vert chartreuse en été. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Cornus mas 'Variegata'

CORNOUILLER MÂLE PANACHÉ

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | sec

ROSIERS

Rosa x centifolia 'Fantin-Latour'

ROSIER 'FANTIN-LATOURE'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches peu épineuses. Feuillage vert foncé, semi-mat. Boutons rose foncé. Fleurs en grappes, doubles, rose pâle doux, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia 'Prolifera de Redouté'

ROSIER 'PROLIFERA DE REDOUTÉ'

2 Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges vert très foncé. Épines brunes. Feuillage vert foncé grisâtre. Fleurs simples, rose profond clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia 'Rose de Meaux' ROSIER 'ROSE DE MEAUX'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact et érigé. Tiges à grosses épines. Feuillage vert sombre. Petites fleurs doubles, rose argenté, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Gloire des Mousseux'

ROSIER 'GLOIRE DES MOUSSEUX'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port compact, régulier. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen, mousseux. Boutons peu mousseux. Fleurs doubles, rose pâle, plus foncé au centre, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Henri Martin'

ROSIER 'HENRI MARTIN'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port très gracieux. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen, odorant. Boutons légèrement mousseux. Fleurs en grappes, doubles, rouge cramoisi clair avec des reflets pourpres, réunies par trois ou quatre, parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa 'Nuits de Young'

ROSIER 'NUITS DE YOUNG'

1 Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port compact, régulier. Tiges sans épines. Feuillage vert foncé. Boutons légèrement mousseux, pourpres. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets grenats et aux étamines jaunes visibles, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x damascena 'Botzaris'

ROSIER 'BOTZARIS'

Zone 3b. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs doubles, blanc crème, très parfumées. Floraison au début de l'été.

Rosa x damascena 'Madame Hardy'

ROSIER 'MADAME HARDY'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, vigoureux. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes, doubles, blanc pur avec un œil vert au centre. Délicat parfum de citron. Floraison au début de l'été.

Rosa foetida bicolor (R. f. 'Austrian Copper')

ROSIER FÉTIDE BICOLORE

2 Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage vert pâle. Fleurs simples, orange cuivré brillant, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Acer campestre

ÉRABLE CHAMPÊTRE

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune orange en automne. Fruits en samares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.

ARBUSTES

Spiraea prunifolia 'Plena'

SPIRÉE PRUINEUSE À FLEURS DOUBLES

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, jaune orange à pourpre en automne. Floraison tôt au printemps Fleurs blanches, doubles. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Viburnum sargentii

VIORNE DE SARGENT

Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum sargentii 'Onondaga'

VIORNE DE SARGENT 'ONONDAGA'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses marron foncé. Feuilles vert très foncé, jaune rougeâtre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé.]

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | très humide

ARBRES

Betula nigra

BOULEAU NOIR

3 Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus, glauques dessous, devenant jaunes à l'automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc et rose teintée de noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).

Betula nigra 'Heritage'

BOULEAU NOIR 'HERITAGE'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus, glauques dessous, devenant jaunes à l'automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc et saumon, teintée de noir, même jeune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



ARBUSTES

***Betula nigra* 'Fox Valley' (B. n. 'Little King')**

BOULEAU NOIR 'FOX VALLEY'

Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative orange et brun qui s'exfolie. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste aux insectes. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Rhamnus frangula* 'Asplenifolia'**

BOURDAINE À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, très découpées, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges, puis noirs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique (fruits) et allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | très humide

ARBUSTES

***Salix cinerea* 'Tricolor' (S. c. 'Variegata')**

SAULE CENDRÉ TRICOLEURE

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Jeunes tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouges teintées de rose. Feuilles vertes panachées de blanc crème, de jaune et de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier.]



OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Acer tataricum

ÉRABLE DE TARTARIE

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Pyracantha* x 'Yukon Belle'**

BUISSON ARDENT 'YUKON BELLE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vertes, lustrées. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, à odeur désagréable. Fruits rouge orangé, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Potentilla fruticosa* 'Floppy Disk'** POTENTILLE 'FLOPPY DISK'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Fleurs rose soutenu. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Mango Tango' (P. f. 'Uman')**

POTENTILLE 'MANGO TANGO'

1 Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert lustré. Floraison estivale et automnale. Fleurs orange rouge vif à jaune foncé. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Orange Whisper'**

POTENTILLE 'ORANGE WHISPER'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Petites fleurs orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Orangeade'** POTENTILLE 'ORANGEADE'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs orange foncé. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Pink Beauty' (P. f. 'Lovely Pink')**

POTENTILLE 'PINK BEAUTY'

2 Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs doubles, rose foncé, pâlisant dans les fortes chaleurs, abondantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla fruticosa* 'Pink Princess'** POTENTILLE 'PINK PRINCESS'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Fleurs rose pâle, blanches quand il fait chaud. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Potentilla fruticosa 'Pink Whisper' POTENTILLE 'PINK WHISPER'

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, ovoïde. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches teintées de rose foncé. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Primerose Beauty'

POTENTILLE 'PRIMEROSE BEAUTY'

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Fleurs rose clair au centre plus foncé, se délavant au soleil. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Red Ace' POTENTILLE 'RED ACE'

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouge orange au cœur jaune, se délavant au soleil. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Red Robin' (*P. f.* 'Marrob')

POTENTILLE 'RED ROBIN'

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouges tournant à l'orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa 'Tangerine' POTENTILLE 'TANGERINE'

1

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles gris vert. Floraison estivale. Fleurs jaune orange, jaune clair quand il fait chaud. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



ROSIERS

Rosa x alba 'Blush Hip'

ROSIER 'BLUSH HIP'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, vigoureux. Feuillage vert, coriace. Fleurs doubles, rose clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x alba 'Pompon Blanc Parfait'

ROSIER 'POMPON BLANC PARFAIT'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage fin, lisse, vert clair à reflets cendrés. Fleurs doubles, blanches à légers reflets lilas.

Rosa x alba 'White Rose of York'

ROSIER 'WHITE ROSE OF YORK'

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage dense, vert à reflets gris bleuté. Fleurs semi-doubles à doubles, blanc immaculé satin et aux étamines jaune d'or, très parfumées. Floraison printanière. Fruits ovales, rouge écarlate.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | sec

CONIFÈRES

Juniperus davurica 'Expansa'

GENÉVRIER DAVURICA 'EXPANSA'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert clair à reflets bleutés, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite). Pour jardinier averti.

ROSIERS

Rosa multiflora

ROSIER MULTIFLORE

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 3,00 m. Port lâche. Tiges sans épines. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes, simples, blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges. Souvent utilisé comme porte-greffe.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Berberis thunbergii 'Aurea Nana'

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG NAIN À FEUILLES JAUNES

3 Zone 4a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles jaune clair, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge et jaune. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Cherry Bomb' (B. t. 'Monomb')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CHERRY BOMB'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouge pourpre. Feuilles rouge cramoisi, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Concorde' ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CONCORDE'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge pourpre velouté, verdâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Emerald Carrousel' (*B. t.* 'Tara')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'EMERALD CARROUSEL'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé avec une ligne jaune autour de la feuille, rouge mauve en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Golden Nugget' (*B. t.* 'Monlers')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'GOLDEN NUGGET'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles jaune d'or à jaune chartreuse, orange en automne. Floraison printanière. Fleurs vertes. Fruits jaune verdâtre. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Jade Carrousel' (*B. t.* 'Bailgreen')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'JADE CARROUSEL'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert pâle. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Rose Glow' (*B. t.* 'Ida')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROSE GLOW'

Zone 4a. H. : 1,40 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouges tachetées de rose et de rose pâle. Feuillage pourpre rosé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge rosé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Royal Burgundy' (*B. t.* 'Gentry')

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL BURGUNDY'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge vin, rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vin. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii 'Royal Cloak' ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL CLOAK'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, semi-pleureur. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles rouge pourpre foncé, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Berberis thunbergii* 'Sunsation' (B. t. 'Monry')**

ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'SUNSACTION'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port étalé, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles jaune d'or, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Fruits jaune verdâtre. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

***Weigela florida* 'Variegata'**

WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,75 m. L. : 1,75 m. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

***Weigela florida* 'Variegata Nana'**

WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES NAIN

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

CONIFÈRES

***Abies koreana* 'Aurea' (A. k. 'Flava')** SAPIN DE CORÉE DORÉ

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Aiguilles jaune citron, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

***Picea orientalis* 'Skylands'**

ÉPINETTE D'ORIENT 'SKYLANDS'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune d'or. Aiguilles vert jaunâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Abies normanniana* 'Golden Spreader'**

SAPIN DE NORMAND 'GOLDEN SPREADER'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé, bas. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune brillant. Aiguilles jaune d'or toute l'année, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

CONIFÈRES

Thuja occidentalis

CÈDRE DU CANADA

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Boisbriand'**

CÈDRE DU CANADA 'BOISBRIAND'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

Thuja occidentalis 'Caespitosa' CÈDRE DU CANADA 'CAESPITOSA'

1 Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Danica' CÈDRE DU CANADA 'DANICA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, puis vert émeraude brillant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Dart's Gold' CÈDRE DU CANADA 'DART'S GOLD'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune d'or tout l'été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Degroot's Spire'

CÈDRE DU CANADA 'DEGROOT'S SPIRE'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire étroit, en spirale. Feuillage de texture dense. Aiguilles en spirale, vert clair, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Europe Gold' CÈDRE DU CANADA 'EUROPE GOLD'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré tout l'été, odorantes. Coloration automnale rousse, puis vert foncé au printemps. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Filiformis' CÈDRE DU CANADA FILIFORME

3 Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert brillant, vert jaunâtre en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Golden Globe' CÈDRE DU CANADA 'GOLDEN GLOBE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré, jaune foncé en été et en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' CÈDRE DU CANADA 'GOLDEN TUFFET'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port en boule, aplati sur le dessus. Feuillage de texture fine. Aiguilles fines, jaune d'or et orangé, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Hetz Midget' CÈDRE DU CANADA 'HETZ MIDGET'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Thuja occidentalis* 'Holmstrup'** CÈDRE DU CANADA 'HOLMSTRUP'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Little Giant'** CÈDRE DU CANADA 'LITTLE GIANT'

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair brillant, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]

***Thuja occidentalis* 'Lutea' (T. o. 'Aurea')**
CÈDRE DU CANADA DORÉ

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune d'or tout l'été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Nigra'** CÈDRE DU CANADA NOIR

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé toute l'année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Pendula'** CÈDRE DU CANADA PLEUREUR

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, rameaux retombants.]

***Thuja occidentalis* 'Pyramidalis' (T. o. 'Brandon')**
CÈDRE DU CANADA PYRAMIDAL

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

Thuja occidentalis 'Rheingold' CÈDRE DU CANADA 'RHEINGOLD'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles fines, jaune d'or au printemps et en été, odorantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Sherwood Frost' CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD FROST'

I Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair avec des taches de blanc crème, brillantes. Aiguilles vert et blanc crème, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Sherwood Moss' CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD MOSS'

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Smaragd' (T. o. 'Emerald')

CÈDRE DU CANADA 'SMARAGD'

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit, très régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert émeraude toute l'année. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Snowtip' CÈDRE DU CANADA 'SNOWTIP'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé panachées de blanc, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Thuja occidentalis 'Spiralis' CÈDRE DU CANADA 'SPIRALIS'

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses en spirale. Aiguilles vert foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Sunkist' CÈDRE DU CANADA 'SUNKIST'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune orangé brillant. Aiguilles jaune doré tout l'été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Techny' (T. o. 'Mission')

CÈDRE DU CANADA 'TECHNY'

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé toute l'année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis 'Teddy' CÈDRE DU CANADA 'TEDDY'

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Thuja occidentalis* 'Tiny Tim'** CÈDRE DU CANADA 'TINY TIM'

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Thuja occidentalis* 'Unicorn'** CÈDRE DU CANADA 'UNICORN'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 90 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert très foncé, odorantes. Coloration automnale vert olive. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Wansdyke Silver'** CÈDRE DU CANADA 'WANSDYKE SILVER'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port conique compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes panachées de jaune et de crème, odorantes. Coloration automnale jaune cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Wareana' (T. o. 'Robusta')**

CÈDRE DU CANADA 'WAREANA'

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert brillant tout l'été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Wareana Lutescens' (T. o. 'Wareana Aurea')**

CÈDRE DU CANADA 'WAREANA LUTESCENS'

2 Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune crème, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Thuja occidentalis* 'Woodwardii'** CÈDRE DU CANADA EN BOULE

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,30 m. Port globulaire, puis ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Thuja occidentalis* 'Yellow Ribbon'** CÈDRE DU CANADA 'YELLOW RIBBON'

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune orangé. Aiguilles vert clair en été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Pieris japonica* 'Cavatine'** (*P. j. yakushimanum* 'Cavatine')

ANDROMÈDE DU JAPON 'CAVATINE'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Pieris japonica* 'Mountain Fire'**

ANDROMÈDE DU JAPON 'MOUNTAIN FIRE'

I Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Pieris japonica* 'Nocturne'** (*P. j. yakushimanum* 'Nocturne')

ANDROMÈDE DU JAPON 'NOCTURNE'

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port très compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze orangé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Pieris japonica* 'Prelude'** (*P. j. yakushimanum* 'Prelude')

ANDROMÈDE DU JAPON 'PRELUDE'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rose brillant. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Pieris japonica* 'Shojo'**

ANDROMÈDE DU JAPON 'SHOJO'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Besse Howells'**

RHODODENDRON 'BESSE HOWELLS'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge pourpre foncé, teintées de rouge, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Boule de Neige'**

RHODODENDRON 'BOULE DE NEIGE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs blanc pur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Catawbiense Album'

RHODODENDRON 'CATAWBIENSE ALBUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Grosses fleurs blanches teintées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Catawbiense Boursault'

RHODODENDRON 'CATAWBIENSE BOURSALT'

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs lavande, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'English Roseum' (R. x 'Roseum Pink')

RHODODENDRON 'ENGLISH ROSEUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Grosses fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron série Finnish 'Elviira' RHODODENDRON 'ELVIIRA'

2 Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs rouges avec des taches rouges encore plus foncées, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Haaga' RHODODENDRON 'HAAGA'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs roses au cœur rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Hellikki' RHODODENDRON 'HELLIKKI'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaunâtres. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs rouge violacé foncé, pâlisant à l'éclosion, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

Rhododendron série Finnish 'Helsinki University'

RHODODENDRON 'HELSINKI UNIVERSITY'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose brillant avec des taches orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Mikkeli' (*R.* x 'St Michel')

RHODODENDRON 'MIKKELI'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches bordées de rose et tachetées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'P.M.A. Tigerstedt' (*R.* x 'Peter Tigerstedt')

RHODODENDRON 'P.M.A. TIGERSTEDT'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches avec des taches rouges au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Pohjolan Tytär' (*R.* x 'Pohjola's Daughter')

RHODODENDRON 'POHJOLAN TYTÄR'



Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouge violacé. Fleurs blanc rosé à blanc avec des taches vertes au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Henry's Red'

RHODODENDRON 'HENRY'S RED'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge foncé à gorge plus foncée, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron impeditum

RHODODENDRON IMPEDITUM

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Nova Zembla'

RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouges tachetées de rouge foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Ponticum Roseum' (*R.* x 'Maximum Roseum')

RHODODENDRON 'PONTICUM ROSEUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lilas, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.



***Rhododendron* x 'Purple Gem'** RHODODENDRON 'PURPLE GEM'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert olive, pourpres en hiver. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Ramapo'** RHODODENDRON 'RAMAPO'

2 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Roseum Elegans'** RHODODENDRON 'ROSEUM ELEGANS'

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lavande avec des teintes rouges, tournant au rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Yaku Angel'** RHODODENDRON 'YAKU ANGEL'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches tachetées de brun, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Yaku Prince'** RHODODENDRON 'YAKU PRINCE'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre. Fleurs roses tachetées de rose pourpre ou de rouge orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Yaku Princess'** RHODODENDRON 'YAKU PRINCESS'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert olive, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre foncé. Fleurs rose pourpre foncé avec des taches rose pourpre pâle et rouge orangé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushmanum* 'Crete'** RHODODENDRON 'CRETE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons pourpre clair. Fleurs blanches tachetées de rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushimanum* 'Ken Janeck'**

RHODODENDRON 'KEN JANECK'

- 1 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose fuchsia. Fleurs blanches tachetées de vert, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushimanum* 'Mist Maiden'**

RHODODENDRON 'MIST MAIDEN'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre. Fleurs blanches avec des taches ou des stries jaune et rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Caragana aurantiaca

CARAGANA ORANGÉ

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, lâche. Tiges épineuses. Jeunes pousses rouges. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune orangé. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, diffus.]

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Tilia cordata

TILLEUL À PETITES FEUILLES

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Tilia cordata* 'Chancellor' (T. c. 'Chancole')**

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CHANCELLOR'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Tige centrale unique. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Tilia cordata* 'Corinthian' (T. c. 'Corzam')**

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CORINTHIAN'

- 2 Zone 3a. H. : 13 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'De Groot'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'DE GROOT'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Golden Cascade'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GOLDEN CASCADE'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, semi-pleureur. Branches descendantes. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Greenspire'

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GREENSPIRE'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Tige centrale forte. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata 'Ronald' (T. c. 'Norlin')

TILLEUL À PETITES FEUILLES 'RONALD'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Calycanthus fertilis

CALYCANTHE FERTILE

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Corylus avellana 'Aurea'

NOISETIER COMMUN DORÉ

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune lime au printemps, jaune verdâtre en été, puis jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.



OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Deutzia x lemoinei 'Compacta' DEUTZIA DE LEMOINE COMPACT

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Magician' DEUTZIA 'MAGICIAN'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses bordées de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Mont Rose' DEUTZIA 'MONT ROSE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose lavande. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Pink-a-Boo' (D. x 'Monzia') DEUTZIA 'PINK-A-BOO'

1 Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé au cœur blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x 'Pink Minor' DEUTZIA 'PINK MINOR'

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port arrondi. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

PLANTES GRIMPANTES

Humulus lupulus HOUBLON DÉCORATIF

2 Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Humulus lupulus 'Aureus' HOUBLON DÉCORATIF DORÉ

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d'or puis jaune chartreuse. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Acer nigrum ÉRABLE NOIR

Plante indigène. Zone 5b. H. : 30 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement profond et étalé. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Abrite et nourrit les oiseaux.

Celtis occidentalis MICOCOULIER OCCIDENTAL

Plante indigène. Zone 3b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair lustré, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fruits pourpre foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



Quercus bicolor

CHÊNE BICOLORE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 17 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert pourpre. Feuilles vert foncé au dessus grisâtre, puis orange doré en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Aralia elata

ARALIE DU JAPON

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Branches très épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, parfois envahissant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Calycanthus floridus

ARBRE DE POMPADOUR

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, grisâtres dessous, jaunes en automne. Feuilles odorantes. Floraison printanière. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Deutzia gracilis

DEUTZIA GRACILE

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia gracilis 'Nikko'

DEUTZIA GRACILE 'Nikko'

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port rampant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, doubles, brillantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Euonymus fortunei 'Blondy' (E. f. 'Interbolwi')

FUSAIN DE FORTUNE 'BLONDY'

Zone 5a. H. : 45 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanches. Feuilles persistantes, vertes au centre jaune vif. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'CANADALE GOLD'

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert pâle bordées de jaune d'or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Country Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'COUNTRY GOLD'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'E.T.' (E. f. 'E.T. Gold')

FUSAIN DE FORTUNE 'E.T.'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert foncé, bordées de jaune d'or. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Harlequin' FUSAIN DE FORTUNE 'HARLEQUIN'

Zone 5b. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persistantes, vertes tachetées de blanc, ou blanches tachetées de vert. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Euonymus fortunei 'Sheridan Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'SHERIDAN GOLD'

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, jaune d'or au printemps, vert éclatant en été. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Euonymus fortunei 'Sungold' FUSAIN DE FORTUNE 'SUNGOLD'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Sunspot' FUSAIN DE FORTUNE 'SUNSPOT'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé avec des taches jaunes au centre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Surespot' FUSAIN DE FORTUNE 'SURESPOT'

1

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert lustré avec une tache jaune au centre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Sambucus nigra 'Madonna' SUREAU NOIR 'MADONNA'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, irrégulièrement panachées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Weigela x 'Briant Rubidor' (W. x 'Olympiade'; W. x 'Rubidor')

WEIGELA 'BRIANT RUBIDOR'

2

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Feuilles jaunes ou vertes bordées de jaune. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.



Weigela x 'Bristol Ruby'

WEIGELA 'BRISTOL RUBY'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge carmin. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Bristol Snowflake'

WEIGELA 'BRISTOL SNOWFLAKE'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Carnaval' (W. x 'Carnival' ; W. x 'Courtalor')

WEIGELA 'CARNAVAL'

Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Grandes fleurs rose très foncé, rose pâle ou blanches, bordées de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'French Lace' (W. x 'Brigela')

WEIGELA 'FRENCH LACE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes panachées de jaune. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Java Red'

WEIGELA 'JAVA RED'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre bronzé. Floraison printanière. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Lucifer' (W. x 'Courtaired')

WEIGELA 'LUCIFER'

Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge très vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Midnight Wine' (W. x 'Elvera')

WEIGELA 'MIDNIGHT WINE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge vin pourpre. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Minuet'

WEIGELA 'MINUET'

Zone 3a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port bas, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vertes aux reflets bronze clair. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose à pourpre, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

OMBRE LÉGÈRE
SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Weigela x 'Nain Rouge' (W. x 'Courtanin'; W. x 'Saphir')
WEIGELA 'NAIN ROUGE'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port compact, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge vif en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges nuancées d'orange, abondantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Pink Delight' WEIGELA 'PINK DELIGHT'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Pink Princess' WEIGELA 'PINK PRINCESS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Polka' WEIGELA 'POLKA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Grandes fleurs rose foncé, rose pastel à l'intérieur, au centre jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Red Prince' WEIGELA 'RED PRINCE'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

Weigela x 'Ruby Queen' WEIGELA 'RUBY QUEEN'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge vin foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Rumba' WEIGELA 'RUMBA'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose pourpre à rose foncé, abondantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Samba' WEIGELA 'SAMBA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpres aux reflets verts. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Sunny Princess' WEIGELA 'SUNNY PRINCESS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs roses, abondantes, légèrement odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Suzanne' WEIGELA 'SUZANNE'

I Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanches ou roses, abondantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.



Weigela x 'Tango'

WEIGELA 'TANGO'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Victoria'

WEIGELA 'VICTORIA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge bronzé. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'Wine & Roses' (W. x 'Alexandra')

WEIGELA 'WINE & ROSES'

2 Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé très intense. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose foncé intense. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x 'White Knight'

WEIGELA 'WHITE KNIGHT'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l'été, très remontante. Fleurs blanches à reflets roses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

PLANTES GRIMPANTES

Clematis x 'Anna Louise' (C. x 'Evithree')

CLÉMATITE 'ANNA LOUISE'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rouges avec des lignes rouge écarlate. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Arabella'

CLÉMATITE 'ARABELLA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs aux pétales étroits, bleutés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Barbara Jackman'

CLÉMATITE 'BARBARA JACKMAN'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs mauves avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Bees Jubilee'

CLÉMATITE 'BEES JUBILEE'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pâle et blanc à étamines brun clair. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Clematis x 'Belle of Woking' CLÉMATITE 'BELLE OF WOKING'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, mauves. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Blue Light' CLÉMATITE 'BLUE LIGHT'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Blue Ravine' CLÉMATITE 'BLUE RAVINE'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleues. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Comtesse de Bouchaud' CLÉMATITE 'COMTESSE DE BOUCHAUD'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Crimson King' CLÉMATITE 'CRIMSON KING'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en étoiles, rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Doctor Ruppel' CLÉMATITE 'DOCTOR RUPPEL'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre, bordées de rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Duchess of Edinburgh' CLÉMATITE 'DUCHESS OF EDINBURGH'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfois simples, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x *durandii* CLÉMATITE DE DURAND

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Elsa Späth' (C. x 'Xerxes') CLÉMATITE 'ELSA SPÄTH'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande, étamines rouge chocolat. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ernest Markham' CLÉMATITE 'ERNEST MARKHAM'

I Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rouge pourpre à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Fair Rosamond' CLÉMATITE 'FAIR ROSAMOND'

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc crème à étamines rouge très foncé, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Fireworks'

CLÉMATITE 'FIREWORKS'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs mauves, à larges lignes rouges. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'General Sikorski'

CLÉMATITE 'GENERAL SIKORSKI'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleu à étamines jaune d'or. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Gipsy Queen'

CLÉMATITE 'GIPSY QUEEN'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé velouté à étamines pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Guernsey Cream'

CLÉMATITE 'GUERNSEY CREAM'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs jaune crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Hagley Hybrid' (C. x 'Pink Chiffon')

CLÉMATITE 'HAGLEY HYBRID'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Haku-ôkan'


CLÉMATITE 'HAKU-ÔKAN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre à revers crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Henry'

CLÉMATITE 'HENRY'

2 Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches, étamines pourprées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



OMBRE LÉGÈRE
SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Clematis x 'H.F. Young'

CLÉMATITE 'H.F. YOUNG'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleues à étamines crème. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Huldine'

CLÉMATITE 'HULDINE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches avec des stries roses au revers des pétales. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Jackmanii'

CLÉMATITE 'JACKMANII'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu violacé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Jackmanii Superba'

CLÉMATITE 'JACKMANII SUPERBA'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs bleu violacé foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'John Huxtable'

CLÉMATITE 'JOHN HUXTABLE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs blanc pur à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'John Warren'

CLÉMATITE 'JOHN WARREN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pastel, avec des lignes plus foncées au centre des pétales. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Kardynal Wyszynski'

CLÉMATITE 'KARDYNAL WYSZYNSKI'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ken Donson'

CLÉMATITE 'KEN DONSON'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Lady Betty Balfour'

CLÉMATITE 'LADY BETTY BALFOUR'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin de l'été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Madame Baron Veillard'

CLÉMATITE 'MADAME BARON VEILLARD'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rose lilas. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



Clematis x 'Madame Grangé' CLÉMATITE 'MADAME GRANGÉ'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre velouté avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Madame Julia Correvon' CLÉMATITE 'MADAME JULIA CORREVEON'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge vif aux pétales légèrement incurvés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Marie Boisselot' (C. x 'Madame Le Coultre')
CLÉMATITE 'MARIE BOISSELOT'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs blanc pur. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Miss Bateman' CLÉMATITE 'MISS BATEMAN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanches aux étamines rouge foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Mrs Cholmondeley' CLÉMATITE 'MRS CHOLMONDELEY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, bleu pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Mrs N. Thompson' CLÉMATITE 'MRS N. THOMPSON'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre clair avec des lignes pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Multi Blue' CLÉMATITE 'MULTI BLUE'

1 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, bleu acier dessus, argentées dessous, aux étamines très nombreuses. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Nelly Moser' CLÉMATITE 'NELLY MOSER'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs parfumées, blanc rosé à lignes rose pâle, étamines jaune et brun. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Clematis x 'Niobe'

CLÉMATITE 'NIOBE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge très sombre à étamines jaune clair. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Pink Champagne' (C. x 'Kakio')

CLÉMATITE 'PINK CHAMPAGNE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs rose foncé au centre rose pâle, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Pink Fantasy'

CLÉMATITE 'PINK FANTASY'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose saumoné. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Proteus'

CLÉMATITE 'PROTEUS'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs doubles, parfois semi-doubles ou simples, rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ramona' (C. x 'Hybrida Sieboldii')

CLÉMATITE 'RAMONA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande à étamines rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Rouge Cardinal'

CLÉMATITE 'ROUGE CARDINAL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre foncé, étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



Clematis x 'Royalty' CLÉMATITE 'ROYALTY'

1 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs semi-doubles, parfois simples, mauves. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ruby Glow' CLÉMATITE 'RUBY GLOW'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Serenata' CLÉMATITE 'SERENATA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs pourpre foncé à lignes rouge pourpre, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Star of India' CLÉMATITE 'STAR OF INDIA'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Sunset' CLÉMATITE 'SUNSET'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge vif avec une ligne rouge vif intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'The President' CLÉMATITE 'THE PRESIDENT'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Victoria' CLÉMATITE 'VICTORIA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Ville de Lyon' CLÉMATITE 'VILLE DE LYON'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge carmin, étamines jaune orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Vino' (C. x 'Poulvo') CLÉMATITE 'VINO'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge rosé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Violet Elizabeth' CLÉMATITE 'VIOLET ELIZABETH'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Vyvyan Pennell' CLÉMATITE 'VYVYAN PENNELL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, parfois semi-doubles, pourpre, mauve et bleu. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Warsaw Nike'** (C. x 'Warszawska Nike')

CLÉMATITE 'WARSAW NIKE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rouge pourpre velouté avec des étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis* x 'Will Goodwin'**

CLÉMATITE 'WILL GOODWIN'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu lavande pâle avec des étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Lonicera* x *brownii* 'Dropmore Scarlet'**

CHÈVREFEUILLE 'DROPMORE SCARLET'

1 Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, rouge écarlate, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouge orange. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

ROSIERS

***Rosa hybrida* 'Paul Neyron'**

ROSIER HYBRIDE PERPÉTUEL 'PAUL NEYRON'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert pâle. Très grandes fleurs doubles, en coupe, ressemblant à une pivoine, roses à reflets lilas, très parfumées. Floraison continue. Résistant aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | humide

ARBUSTES

Euonymus europaeus

FUSAIN D'EUROPE

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits rose rouge et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Albus'**

FUSAIN D'EUROPE À FRUITS BLANCS

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Aldenhemensis'**

FUSAIN D'EUROPE 'ALDENHAMENSIS'

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges vert foncé. Feuilles vert mat, rouge écarlate en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Fruits rose et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus europaeus* 'Red Cascade' (E. e. 'Red Caps')**

FUSAIN D'EUROPE 'RED CASCADE'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port semi-pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert mat, rouges en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Gros fruits rose et rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.



***Hydrangea paniculata* 'Brussels Lace'**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'BRUSSELS LACE'

2 Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles jaune beige, fleurs stériles blanches, puis roses. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Burgundy Lace'**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'BURGUNDY LACE'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en petites panicules blanches, puis roses et finalement rose violacé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Grandiflora'** HYDRANGÉE PANICULÉE À GRANDES FLEURS

Zone 3b. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules blanches, puis vieux rose. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

***Hydrangea paniculata* 'Kyushu'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'KYUSHU'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port dressé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles et stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]

***Hydrangea paniculata* 'Limelight'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'LIMELIGHT'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules vert lime. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Pee Wee'** HYDRANGÉE PANICULÉE 'PEE WEE'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Petites feuilles vertes. Floraison estivale. Petites fleurs stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Hydrangea paniculata* 'Pink Diamond' (*H. p.* 'Interhydia')**

HYDRANGÉE PANICULÉE 'PINK DIAMOND'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs fertiles roses à étamines roses et fleurs stériles blanches puis rose à rose foncé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

Hydrangea paniculata 'Ruby' (*H. p.* 'Angel Blush')

HYDRANGÉE PANICULÉE 'RUBY'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en grandes panicules blanches, puis roses. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Hydrangea paniculata 'Unique' HYDRANGÉE PANICULÉE 'UNIQUE'

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs stériles en grandes panicules blanches, puis roses. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Hydrangea paniculata 'White Moth' HYDRANGÉE PANICULÉE 'WHITE MOTH'

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches en panicules, fertiles avec quelques fleurs stériles portées par de longs pédoncules. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Acer saccharum

ÉRABLE À SUCRE

I Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair dessus, plus pâle dessous, rouges ou orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Acer saccharum 'Green Mountain' ÉRABLE À SUCRE 'GREEN MOUNTAIN'

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, brillantes, rouges ou orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Acer saccharum 'Monumentale' (*A. s.* 'Temple's Upright')

ÉRABLE À SUCRE 'MONUMENTALE'

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit et régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, rouges ou orange en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.



Quercus alba

CHÊNE BLANC

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port globulaire large. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses, puis gris argent. Feuilles vertes, puis rouge et violet pourpre en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits: glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Amelanchier alnifolia

AMÉLANCHIER DE SASKATOON

Plante indigène. Zone 4. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits noirs, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier alnifolia* ‘Honeywood’** AMÉLANCHIER DE SASKATOON ‘HONEYWOOD’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits bleu foncé, comestibles, hâtifs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier alnifolia* ‘Smoky’ (A. a. ‘Smokey’)**

AMÉLANCHIER DE SASKATOON ‘SMOKY’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Gros fruits bleu foncé, sucrés, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Cornus alternifolia* ‘Argentea’ (C. a. ‘Variegata’)**

CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES ARGENTÉES

2 Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon originale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc crème, puis pourpre foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

***Hamamelis mollis* ‘Pallida’**

HAMAMÉLIS MOLLIS ‘PALLIDA’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune à jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune et rouge, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Hamamelis virginiana

HAMAMÉLIS DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, orange en automne. Floraison automnale. Fleurs jaunâtres, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Heptacodium miconoides

HEPTACODIUM

3 Zone 4b. H. : 2,70 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison automnale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Magnolia x brooklynensis 'Yellow Bird'

MAGNOLIA 'YELLOW BIRD'

Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits roses à graines rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'

MAGNOLIA 'LEONARD MESSEL'

1

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, striées de rose pourpre à l'extérieur, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia x loebneri 'Merrill'

MAGNOLIA 'MERRILL'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Rubus x 'Benenden' (*R. x tridel* 'Benenden')

RONCE 'BENENDEN'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

Sorbaria aitchisonii (*S. tomentosa angustifolia*)

SORBARIA D'AITCHISON

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

Stephanandra incisa 'Crispa'

STEPHANANDRA CRISPÉE

2

Zone 5a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif, puis jaune et rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

CONIFÈRES

Tsuga canadensis 'Albospica'

PRUCHE DU CANADA 'ALBOSPICA'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-nain, plus ou moins érigé. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanches ou panachées de blanc. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

Tsuga canadensis 'Golden Splendor'

PRUCHE DU CANADA 'GOLDEN SPLENDOR'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune d'or intense. Aiguilles vert jaune, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.



OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Chionanthus virginicus

ARBRE DE NEIGE

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune d'or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Cornus sericea* (*C. stolonifera*)**

CORNOUILLER STOLONIFÈRE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Cornus sericea* 'Allemands'**

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'ALLEMANS'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, longuement bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Cornus sericea* 'Cardinal'**

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'CARDINAL'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, large. Tiges rouge clair en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge à bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Cornus sericea* 'Flaviramea'**

CORNOUILLER STOLONIFÈRE À TIGES JAUNES

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Cornus sericea* 'Silver and Gold'**

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'SILVER AND GOLD'

3 Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Tiges jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris vert plus ou moins bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus sericea 'White Gold'

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'WHITE GOLD'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

CONIFÈRES

Metasequoia glyptostroboides

MÉTASÉQUOIA

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert clair. Coloration automnale jaune vieil or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush'

(M. g. 'Ogon' ; M. g. 'Golden Ogi' ; M. g. 'Golden Mantle')

MÉTASÉQUOIA 'GOLD RUSH'

I Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune brillant. Aiguilles caduques, vert jaunâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE**SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide**

ARBUSTES

Ilex verticillata

HOUX VERTICILLÉ

Plante indigène. Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata 'Afterglow'

HOUX VERTICILLÉ 'AFTERGLOW'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits orange à rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata 'Aurantiaca'

HOUX VERTICILLÉ 'AURANTIACA'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits orange devenant jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata 'Berry Nice' (I. v. 'Spriber')

HOUX VERTICILLÉ 'BERRY NICE'

Zone 5a. H. : 2,25 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge feu, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Cacapon'** HOUX VERTICILLÉ 'CACAPON'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Early Male'** HOUX VERTICILLÉ 'EARLY MALE'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Jim Dandy' (I. v. 'Dwarf Male')**
HOUX VERTICILLÉ 'JIM DANDY'

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Oosterwijk'** HOUX VERTICILLÉ 'OOSTERWIJK'

2 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouges, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Red Sprite'** HOUX VERTICILLÉ 'RED SPRITE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Southern Gentlemen'**
HOUX VERTICILLÉ 'SOUTHERN GENTLEMEN'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.



***Ilex verticillata* 'Winter Gold'**

HOUX VERTICILLÉ 'WINTER GOLD'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits jaunes, parfois teintés de rose, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Ilex verticillata* 'Winter Red'**

HOUX VERTICILLÉ 'WINTER RED'

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge très vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé****ARBRES**

***Tilia mongolica* 'Harvest Gold'**

TILLEUL DE MONGOLIE 'HARVEST GOLD'

Zone 3a. H. : 9,00 m. L. : 7,50 m. Port ovoïde. Bourgeons jaunes. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE**SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé****ARBRES**

Acer platanoides

ÉRABLE DE NORVÈGE

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune vif en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits nombreux (nuisance). Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Columnare'**

ÉRABLE DE NORVÈGE COLONNAIRE

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Emerald Lustre' (A. p. 'Pond')**

ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD LUSTRE'

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouges. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanoides* 'Emerald Queen' ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD QUEEN'**

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.



***Acer platanooides* 'Parkway'** (*A. p.* 'Columnarbroad')

ÉRABLE DE NORVÈGE 'PARKWAY'

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port conique étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer platanooides* 'Royal Red'**

ÉRABLE DE NORVÈGE 'ROYAL RED'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge luisant. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.

***Acer platanooides* 'Superform'**

ÉRABLE DE NORVÈGE 'SUPERFORM'

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles épaisses, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits pas trop nombreux. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Aesculus x carnea* 'Briottii'**

MARRONNIER À FLEURS ROUGES 'BRIOTTII'

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, plus ou moins régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, devenant jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits peu nombreux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Redoute la sécheresse. Abrite les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.

***Crataegus laevigata* 'Crimson Cloud'**

AUBÉPINE ANGLAISE 'CRIMSON CLOUD'

1 Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, luisantes, orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges au centre blanc, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution. Résiste à la rouille.

***Tilia x europaea* 'Wratislaviensis'**

TILLEUL DE WRATISLAVA

2 Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, jaune d'or au printemps, plus pâle en été et jaune clair en automne. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Spiraea nipponica* 'Halward's Silver'**

SPIRÉE 'HALWARD'S SILVER'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea nipponica* 'June Bride'** SPIRÉE 'JUNE BRIDE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea nipponica* 'Snowmound' (*S. n. tosaensis*)**
SPIRÉE 'SNOWMOUND'

1 Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, vert bleuâtre en dessous. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Aesculus hippocastanum MARRONNIER D'INDE

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches avec un centre rouge écarlate. Fruits nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Craint la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.

***Aesculus hippocastanum* 'Baumannii'**
MARRONNIER DE BAUMANN

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches avec un centre rouge écarlate. Pas de fruits. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Craint la sécheresse.



OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Salix x erythroflexuosa (*S. sepulcralis* 'Erythroflexuosa')

SAULE DORÉ TORTUEUX

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Branches tortueuses, jaunes ou orange. Feuilles vertes, enroulées sur elles-mêmes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]

Syringa x chinensis 'Saugeana' LILAS DE CHINE 'SAUGEANA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Cercidiphyllum japonicum

ARBRE DE KATSURA

2 Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, puis jaune doré et écarlate en automne. Feuillage odorant à l'automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

ARBRE DE KATSURA PLEUREUR

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, jaune doré et écarlate en automne. Feuillage odorant à l'automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

ARBUSTES

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' (*S. x bumalda* 'Anthony Waterer')

SPIRÉE DU JAPON 'ANTHONY WATERER'

3 Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs rose carmin clair. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica 'Candlelight' SPIRÉE DU JAPON 'CANDLELIGHT'

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune clair brillant. Feuilles vert jaunâtre, rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Coccinea'** SPIRÉE DU JAPON 'COCCINEA'

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Dakota Goldcharm' (S. j. 'Mertyann')**
SPIRÉE DU JAPON 'DAKOTA GOLDCHARM'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes teintées de rouge. Floraison tôt au printemps, puis estivale. Fleurs rose pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Dart's Red'** SPIRÉE DU JAPON 'DART'S RED'

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea japonica* 'Froebeli'** SPIRÉE DE FROEBEL

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles vert rougeâtre, pourpre bronzé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Ilex x meserveae* 'Blue Boy'** HOUX HYBRIDE 'BLUE BOY'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Ilex x meserveae* 'Blue Girl'** HOUX HYBRIDE 'BLUE GIRL'

I Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Ilex x meserveae* 'Blue Prince'** HOUX HYBRIDE 'BLUE PRINCE'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port pyramidal. Tiges bleu pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Ilex x meserveae* 'Blue Princess'** HOUX HYBRIDE 'BLUE PRINCESS'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.



Salix geyeriana

SAULE ARGENTÉ

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses argentées. Feuilles vert argenté, vert bronze en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative noire. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dense.]

CONIFÈRES

Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'BOULEVARD'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera 'Compacta' FAUX-CYPRÈS DE SAWARA COMPACT

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles vertes, légèrement bleutées en dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera 'Curly Tops'

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'CURLY TOPS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal. Extrémité des tiges tortueuses. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera 'Filifera' FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert grisâtre à glauque, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME DORÉ

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, étalé. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Aiguilles jaune doré, puis jaune bronze en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana'

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME DORÉ NAIN

2

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étalé. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles jaune doré, puis jaune bronze en hiver, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

***Chamaecyparis pisifera* 'Filifera Golden Charm'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME 'GOLDEN CHARM'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles jaune brillant, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Filifera Nana'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME NAIN

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati dessus. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert clair, puis vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Gold Dust'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLD DUST'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles vertes largement panachées de jaune doré, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Chamaecyparis pisifera* 'Golden Pincushion'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLDEN PINCUSHION'

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, très compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Lemon Thread'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'LEMON THREAD'

1 Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, irrégulier. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles jaune citron, brillantes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Mops'**

(*C. p.* 'Gold Mop' ; *C. p.* 'Golden Mops' ; *C. p.* 'Filifera Golden Mops')

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'MOPS'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles jaune citron brillant au printemps, vert chartreuse par la suite, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Plumosa Aurea'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA PLUMEUX DORÉ

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Snow'** FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SNOW'

2 Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, nain, compact. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanc argenté. Feuilles en écailles gris vert, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Chamaecyparis pisifera* 'Squarrosa Intermedia' (C. p. 'Dwarf Blue')**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA INTERMEDIA'

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port conique, irrégulier. Jeunes pousses tordues. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Squarrosa Lombarts'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA LOMBARTS'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles grises, puis bleues, finalement bronze en automne, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Sungold' (C. p. 'Filifera Sungold')**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SUNGOLD'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact, dense. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre à verte, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Tzukumo' FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'TZUKUMO'**

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port miniature, compact, dense. Feuillage de texture légère. Feuilles en écailles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Chamaecyparis pisifera* 'Vintage Gold'**

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'VINTAGE GOLD'

Zone 4b. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en écailles jaunes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | très acide | frais et bien drainé

ARBRES

***Quercus rubra* (Q. borealis)**

CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE

3 Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port conique large, irrégulier. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat, vert bleuté dessous, puis rouge doré en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

CONIFÈRES

Picea omorika

ÉPINETTE DE SERBIE

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches horizontales. Rameaux retombants. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika 'Nana'

ÉPINETTE DE SERBIE NAINA

I Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert jaunâtre foncé, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika 'Pendula'

ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tige principale semi-pleureuse. Branches et rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika 'Pendula Burns'

ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE BURNS

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur étroit. Tige principale érigée, tordue. Branches et rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika 'Pimoko'

ÉPINETTE DE SERBIE 'PIMOKO'

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large, régulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons rougeâtres. Aiguilles vert sombre, argentées dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Rhododendron schlippenbachii

AZALÉE ROYALE

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vert foncé, puis jaune, orange et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | tourbeux | très acide | humide

ARBUSTES

Hydrangea macrophylla 'All Summer Beauty'

HORTENSIA DES JARDINS 'ALL SUMMER BEAUTY'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs en boule, bleu foncé en sol très acide, rose bleuté en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Alpen Glow' (*H. m.* 'Alpenglühchen')

HORTENSIA DES JARDINS 'ALPEN GLOW'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouge foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Blue Wave' (*H. m.* 'Mariesii Perfecta')

HORTENSIA DES JARDINS 'BLUE WAVE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu foncé en sol acide, rose lilas en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

HORTENSIA DES JARDINS 'BOUQUET ROSE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rose clair. Tire sur le bleu en sol acide. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Dooley' HORTENSIA DES JARDINS 'DOOLEY'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Grandes fleurs stériles, en boule, bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Forever Pink'

HORTENSIA DES JARDINS 'FOREVER PINK'

2 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Lemon Wave'

HORTENSIA DES JARDINS 'LEMON WAVE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes, bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs mauves, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Maculata' (*H. m.* 'Variegata')

HORTENSIA DES JARDINS PANACHÉ

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu à rose, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Mariesii Variegata'**

HORTENSIA DES JARDINS MARIESII PANACHÉ

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Masja'** HORTENSIA DES JARDINS 'MASJA'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Nikko Blue'** HORTENSIA DES JARDINS 'NIKKO BLUE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, bleues en sol acide, bleu et rose en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Pia'** (*H. m.* 'Mini Pink Elf') HORTENSIA DES JARDINS 'PIA'

I Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Pink Beauty'** HORTENSIA DES JARDINS 'PINK BEAUTY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose pâle. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Tokyo Delight'** HORTENSIA DES JARDINS 'TOKYO DELIGHT'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles blanches et fertiles roses, devenant toutes roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'White Wave'** HORTENSIA DES JARDINS 'WHITE WAVE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement alcalin | très humide

ARBRES

Acer negundo ÉRABLE À GIGUÈRE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Fruits nombreux et persistants. Croissance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



Acer negundo 'Sensation'

ÉRABLE À GIGUÈRE 'SENSATION'

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, rouges en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Lonicera x 'Honey Baby' (L. x 'Novso')

CHÈVREFEUILLE 'HONEY BABY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison estivale prolongée. Boutons aux reflets pourpres. Fleurs crème à jaune pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Lonicera x 'Marble King'

CHÈVREFEUILLE 'MARBLE KING'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bordées et tachetées de jaune ou de blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Prunus nigra

PRUNIER NOIR

2 Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port oblong, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches devenant roses, parfumées. Fruits rouge, rouge orangé et jaune. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN

Zone 2a. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus 'Colorata'

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN 'COLORATA'

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles pourpres devenant vertes dessus et pourpres dessous. Floraison printanière. Fleurs roses, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus 'Commutata'

CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN HÂTIF

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées, en grappes. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Salix sachalinensis 'Sekka' (*S. udensis* 'Sekka'; *S. u.* 'Setsuka')

SAULE 'SEKKA'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches tordues, certaines plates et recourbées, recouvertes de nombreux bourgeons. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant dessus, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | très humide

ARBUSTES

Salix gracilistyla 'Melanostachys' (*Salix melanostachys*)

SAULE À CHATONS NOIRS

i Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rouges et bourgeons noir violacé. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Boutons rouge noir. Fleurs en chatons jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large.]



OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Cornus racemosa (*C. paniculata*) CORNOUILLER À GRAPPES

Plante indigène. Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles gris vert, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

CONIFÈRES

Juniperus chinensis 'Aurea' GENÉVRIER DE CHINE DORÉ

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses piquantes, jaune d'or. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Angelica Blue' GENÉVRIER HYBRIDE 'ANGELICA BLUE'

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 5,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleu intense, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media 'Daub's Frosted' GENÉVRIER HYBRIDE 'DAUB'S FROSTED'

Zone 3a. H. : 35 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Tiges rouges. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses piquantes, jaunes. Aiguilles vert bleuté avec des reflets jaune verdâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Gold Coast' (J. x m. 'Aurea')

GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLD COAST'

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune d'or. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Gold Star' (J. x m. 'Bakaurea')

GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLD STAR'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune d'or tout l'été. Aiguilles vert bleuté à reflets jaunes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media 'Golden Glow' GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLDEN GLOW'

3 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or éclatant toute la belle saison, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

OMBRE LÉGÈRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

***Juniperus* x *media* 'Old Gold'** GENÉVRIER HYBRIDE 'OLD GOLD'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses dorées. Aiguilles vieil or, odorantes. Coloration automnale jaune foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus* x *media* 'Pfitzeriana Aurea'** GENÉVRIER DE PFITZER DORÉ

Zone 4a. H. : 1,30 m. L. : 2,50 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes, jaune doré. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale verte. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus* x *media* 'Pfitzeriana Compacta'**

GENÉVRIER DE PFITZER COMPACT

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus* x *media* 'Pfitzeriana Glauca'**

GENÉVRIER DE PFITZER BLEU

Zone 4b. H. : 1,30 m. L. : 2,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus* x *media* 'Pfitzeriana Gold Lace'**

GENÉVRIER DE PFITZER 'GOLD LACE'

1 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Juniperus* x *media* 'Saybrook Gold'** GENÉVRIER HYBRIDE 'SAYBROOK GOLD'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles jaune d'or brillant tournant au jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale jaune bronze. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Picea glauca* (*P. alba*; *P. canadensis*) ÉPINETTE BLANCHE**

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Alberta Globe'** ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA EN BOULE

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Coerulea'** ÉPINETTE BLANCHE À FEUILLES BLEUTÉES

2 Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses très colorées. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.



***Picea glauca* 'Conica' (*P. g. albertiana* 'Conica')**

ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Densata'**

ÉPINETTE BLANCHE 'DENSATA'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Echiniformis'**

ÉPINETTE BLANCHE 'ECHINIFORMIS'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Jean's Dilly'**

ÉPINETTE BLANCHE 'JEAN'S DILLY'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair, tortueuses. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'North Star'**

ÉPINETTE BLANCHE 'NORTH STAR'

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Pendula'**

ÉPINETTE BLANCHE PLEUREUSE

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur, étroit. Tige centrale érigée, branches retombantes. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Picea glauca* 'Pixie'**

ÉPINETTE BLANCHE 'PIXIE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port conique, régulier, miniature, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé à reflets bleutés, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

***Picea glauca* 'Rainbow's End'**

ÉPINETTE BLANCHE 'RAINBOW'S END'

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune doré. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca* 'Sander's Blue'*ÉPINETTE BLANCHE 'SANDER'S BLUE'**

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleues puis vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

OMBRE LÉGÈRE**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide****ARBUSTES*****Salix integra* 'Flamingo'****SAULE 'FLAMINGO'**

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses sur des tiges rouge foncé. Feuilles vertes panachées et tachetées de blanc. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Une amélioration de *Salix integra* 'Hakuro Nishiki'.

Salix integra* 'Hakuro Nishiki'*SAULE 'HAKURO NISHIKI'**

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses devenant crème. Feuilles vertes panachées et tachetées de blanc. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

OMBRE LÉGÈRE**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé****ARBUSTES*****Ribes odoratum*****GADELIER ODORANT**

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits noirs, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Rubus cockburnianus* 'Goldenvale'** RONCE DE COCKBURN DORÉE

1 Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges épineuses, pourpres, recouvertes de pruine blanchâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très découpées, jaune doré. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Pour jardinier averti.



MI-OMBRE

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

CONIFÈRES

Juniperus sabina 'Skandia' (J. s. 'Scandia')

GENÉVRIER SABINE 'SKANDIA'

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert sombre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

MI-OMBRE

SOL | pauvre | caillouteux | légèrement acide | sec

ARBUSTES

Rhus typhina 'Tiger Eyes' (R. t. 'Bailtiger')

SUMAC DE VIRGINIE 'TIGER EYES'

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine. Jeunes pousses vert chartreuse. Feuilles aux pétioles rouges, très découpées, jaune d'or en été, puis rouge, orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge vif, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre | léger | très acide | sec

ARBUSTES

Empetrum nigrum

CAMARINE NOIRE

2 Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Myrica pensylvanica

CIRIER DE PENNSYLVANIE

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, grisâtres dessous, odorantes. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits grisâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

CONIFÈRES

Sciadopitys verticillata

SCIADOPITYS VERTICILLATA

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | pauvre | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Salix caprea

SAULE MARSAULT

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons grisâtres, parfumées. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Erica carnea 'December Red'

BRUYÈRE D'HIVER 'DECEMBER RED'

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison printanière. Fleurs rose foncé réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea 'Pink Spangles'

BRUYÈRE D'HIVER 'PINK SPANGLES'

1 Zone 4b. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, réunies en grappes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea 'Porters Red'

BRUYÈRE D'HIVER 'PORTERS RED'

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs magenta foncé réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea 'Springwood Pink'

BRUYÈRE D'HIVER 'SPRINGWOOD PINK'

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea 'Springwood White'

BRUYÈRE D'HIVER 'SPRINGWOOD WHITE'

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert tendre. Floraison printanière. Fleurs blanches réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea 'Vivellii'

BRUYÈRE D'HIVER 'VIVELLI'

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert violacé. Floraison printanière. Fleurs magenta, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Gaultheria procumbens

THÉ DES BOIS

2 Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles aromatiques, persistantes, vert lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement traçant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.



Vaccinium angustifolium

AIRELLE À FEUILLES ÉTROITES

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Tiges vertes puis grises. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits en baies bleu noir, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | humide

ARBUSTES

Myrica gale

MYRTE DES MARAIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses brun foncé. Feuilles vert foncé lustré, odorantes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits jaunâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Vaccinium myrtilloides* (*V. canadense*)**

BLEUET

Plante indigène. Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port bas, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, plus clair en dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc verdâtre. Fruits en baies bleues puis noires, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | très humide

ARBUSTES

Andromeda glaucophylla

ANDROMÈDE GLAUQUE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleutées, grises dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc à rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Andromeda polifolia

ANDROMÈDE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Andromeda polifolia* 'Blue Ice'** ANDROMÈDE 'BLUE ICE'

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleu argenté, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Andromeda polifolia* 'Nana'** ANDROMÈDE 'NANA'

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Betula glandulosa BOULEAU GLANDULEUX

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Rameaux portant des verrues. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | sec à très humide

ARBUSTES

Comptonia peregrina COMPTONIE VOYAGEUSE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en noix. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | caillouteux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Vaccinium vitis-idaea AIRELLE ROUGE

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair brillant, puis pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies rouge foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Vaccinium vitis-idaea* 'Koralle'** AIRELLE ROUGE 'KORALLE'

Zone 1a. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port rampant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair brillant, puis pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies rouge foncé, abondants, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Vaccinium vitis-idaea minus AIRELLE ROUGE NAIN

I Zone 1a. H. : 5 cm. L. : 20 cm. Port rampant, très nain. Feuillage de texture fine. Très petites feuilles persistantes, vert clair brillant, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies rouge foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Vaccinium vitis-idaea* 'Red Pearl'** AIRELLE ROUGE 'RED PEARL'

Zone 1a. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port rampant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair brillant, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies rouge foncé, abondants, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Symphoricarpos x doorenbosii* 'Amethyst' (S. x d. 'Kordes')**

SYMPHORINE 'AMETHYST'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rose pourpre foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos x doorenbosii* 'Magic Berry'**

SYMPHORINE 'MAGIC BERRY'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits roses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos x doorenbosii* 'Marleen' (S. x d. 'Ariso')**

SYMPHORINE 'MARLEEN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté foncé, vert bleuté clair dessous. Floraison estivale. Fleurs rose pâle. Fruits rose pourpre brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos x doorenbosii* 'Mother of Pearl'**

SYMPHORINE 'MOTHER OF PEARL'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits blanc perle, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos orbiculatus* 'Foliis Variegatis'** (S. o. 'Variegatus'; S. o. 'Bowles' Golden Variegated')

SYMPHORINE À FEUILLES RONDES PANACHÉES

3 Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

***Symphoricarpos orbiculatus* ‘Taff’s Silver Edge’**
(*S. o.* ‘Albovariegatus’ ; *S. o.* ‘Argenteovariegatus’)

SYMPHORINE À FEUILLES RONDES ‘Taff’s Silver Edge’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, bordées de blanc crème. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge rosé, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

CONIFÈRES

***Pinus mugo* ‘Big Tuna’**

PIN DES MONTAGNES ‘BIG TUNA’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* ‘Gnom’**

PIN DES MONTAGNES ‘GNOM’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense devenant pyramidal large avec l’âge. Feuillage de texture moyenne. Pousse très décorative. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* ‘Honeycomb’**

PIN DES MONTAGNES ‘HONEYCOMB’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges dorées en hiver. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* ‘Mops’**

PIN DES MONTAGNES ‘MOPS’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses décoratives. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo mughus

PIN DES MONTAGNES NAIN

Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* ‘Paul’s Dwarf’**

PIN DES MONTAGNES ‘PAUL’S DWARF’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, aplati dessus. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* ‘Pot O’ Gold’**

PIN DES MONTAGNES ‘POT O’ GOLD’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges jaunes pendant l’hiver et avant la croissance printanière. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo pumilio

PIN DES MONTAGNES RAMPANT

Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port arrondi.]



***Pinus mugo* 'Sherwood Compact'** PIN DES MONTAGNES 'SHERWOOD COMPACT'

1 Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, petites, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Slowmound'** PIN DES MONTAGNES 'SLOWMOUND'

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Tannenbaum'** PIN DES MONTAGNES 'TANNENBAUM'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'Teeny'** PIN DES MONTAGNES 'TEENY'

Zone 2a. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port miniature, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

***Pinus mugo* 'White Bud'** PIN DES MONTAGNES 'WHITE BUD'

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Bourgeons blancs tout l'hiver. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Sambucus racemosa* 'Goldfinch'** SUREAU DORÉ PLUMEUX 'GOLDFINCH'

2 Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d'or brillant. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus racemosa* 'Plumosa Aurea'**

SUREAU DORÉ PLUMEUX

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles découpées, jaune d'or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus racemosa* 'Sutherland Gold'**

SUREAU DORÉ PLUMEUX 'SUTHERLAND GOLD'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d'or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

PLANTES GRIMPANTES

Lonicera x tellmanniana

CHÈVREFEUILLE TELLMANNIANA

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, jaune orangé, parfumées. Floraison estivale. Fruits orange. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Sambucus pubens

SUREAU PUBESCENT

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits en baies rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique.

CONIFÈRES

***Pinus pumila* 'Dwarf Blue' (P. p. 'Nana')**

PIN NAIN DE SIBÉRIE 'DWARF BLUE'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes, bleutées en dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.



1



2

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Fothergilla gardenii

FOTHERGILLA NAIN

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, puis rouge, orange et jaune brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Fothergilla major

FOTHERGILLA ROBUSTE

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

***Fothergilla major* 'Mount Airy'**

FOTHERGILLA ROBUSTE 'MOUNT AIRY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert bleuté, glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Cercis canadensis

GAINIER DU CANADA

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

***Cercis canadensis* 'Forest Pansy'**

GAINIER DU CANADA 'FOREST PANSY'

1 Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge pourpre, donnant des feuilles rondes, vert bronze, jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs rose pourpre. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

***Cercis canadensis* 'Lavender Twist' (C. c. 'Covey')**

GAINIER DU CANADA 'LAVENDER TWIST'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

ARBUSTES

***Forsythia* x 'Fiesta'**

FORSYTHIA 'FIESTA'

2 Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Forsythia* x 'Minigold Fiesta'** FORSYTHIA 'MINIGOLD FIESTA'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Cotoneaster dammeri* 'Coral Beauty'** COTONÉASTER DE DAMMER 'CORAL BEAUTY'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Crataegus monogyna* 'Compacta'** (*C. m.* 'Inermis Compacta')

AUBÉPINE NAINES

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Pas d'épines. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Rares fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

***Ligustrum vulgare* 'Cheyenne'** TROËNE 'CHEYENNE'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert olive, brillantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

***Ligustrum vulgare* 'Lodense'** TROËNE 'LODENSE'

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

Prunus tomentosa CERISIER TOMENTEUX

I Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert mat, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge foncé, comestibles. Écorce décorative rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

PLANTES GRIMPANTES

***Clematis* x *jouiniana* 'Mrs Robert Brydon'** CLÉMATITE 'MRS ROBERT BRYDON'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs bleu ciel. Floraison à la fin de l'été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante toxique.

Clematis tangutica CLÉMATITE TANGUTICA

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Aureolin'** CLÉMATITE TANGUTICA 'AUREOLIN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune citron. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



***Clematis tangutica* 'Elios'**

CLÉMATITE TANGUTICA 'ÉLIOS'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune vif. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Golden Tiara' (C. t. 'Kugotia')**

CLÉMATITE TANGUTICA 'GOLDEN TIARA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune vif avec des étamines violet foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'My Angel' (C. t. 'Engelina')**

CLÉMATITE TANGUTICA 'MY ANGEL'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune brillant à l'intérieur, rouge brun à l'extérieur. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis tangutica* 'Radar Love'**

CLÉMATITE TANGUTICA 'RADAR LOVE'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs en clochettes, jaune intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Rubus idaeus* 'Aureus'**

RONCE DU MONT IDA DORÉE

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune citron, brillantes. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

PLANTES GRIMPANTES

***Ampelopsis brevipedunculata* 'Elegans'**

AMPÉLOPSIS ÉLÉGANT

2

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses. Feuilles vertes teintées de rose et de crème. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits bleus. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

***Wisteria floribunda* 'Lawrence'** GLYCINE 'LAWRENCE'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Wisteria sinensis GLYCINE DE CHINE

I Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert foncé. Fleurs violacées, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Wisteria sinensis* 'Blue Sapphire'** GLYCINE DE CHINE 'BLUE SAPPHIRE'

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu violacé, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Betula albo-sinensis

BOULEAU BLANC DE CHINE

Zone 5b. H. : 20 m. L. : 13 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaune doré en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brune aux reflets orange. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).



ARBUSTES

Amelanchier laevis

AMÉLANCHIER GLABRE

Plante indigène. Zone 3b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert bleuté, rouge orangé en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge à pourpre foncé, hâtifs. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde.]

Kerria japonica

CORÊTE DU JAPON

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Kerria japonica* 'Golden Guinea'**

CORÊTE DU JAPON 'GOLDEN GUINEA'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune d'or. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Kerria japonica* 'Picta'**

CORÊTE DU JAPON PANACHÉE

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes bordées ou tachetées de blanc, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

***Kerria japonica* 'Pleniflora'**

CORÊTE DU JAPON À FLEURS DOUBLES

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs doubles, jaune d'or. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Magnolia sieboldii

MAGNOLIA DE SIEBOLD

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière, puis un peu par la suite. Fleurs blanches, au cœur marron et aux étamines roses, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Mahonia aquifolium

MAHONIA À FEUILLES DE HOUX

3 Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles persistantes, piquantes, vert foncé lustré, vert jaunâtre dessous. Feuillage rouge orangé et cuivre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits vert bleuté grisâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Mahonia repens

MAHONIA RAMPANT

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles persistantes, peu piquantes, vert bleuté, grisâtres dessous conservant sa couleur en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune d'or, parfumées. Fruits noir grisâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Sorbus reducta

SORBIER MINIATURE

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillantes, puis bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits roses, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Spiraea thunbergii 'Mellow Yellow' (S. t. 'Ogon')

SPIRÉE DE THUNBERG 'MELLOW YELLOW'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaunes teintées de rouge. Feuilles jaunes, ensuite vert jaunâtre, puis rose, orange et rouge en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

PLANTES GRIMPANTES

Clematis virginiana

CLÉMATITE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs blanc crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs sur les plants femelles. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Menispermum canadense

MÉNISPERME DU CANADA

Plante indigène. Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs blanchâtres. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale jaune. Fruits noirâtres. Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

Smilax herbacea

SMILAX HERBACÉ

Plante indigène. Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs verdâtres. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits rouges ou pourpres. Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Wisteria macrostachya 'Aunt Dee' GLYCINE 'AUNT DEE'

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Fleurs lilas pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Acer spicatum

ÉRABLE À ÉPIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, jaune et rouge en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune verdâtre. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

Sambucus canadensis 'Maxima' SUREAU DU CANADA 'MAXIMA'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).



1



2

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Paxistima canbyi (*Pachistima canbyi*)

PACHISTIMA DE CANBY

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,25 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | sec à très humide

ARBUSTES

Vaccinium corymbosum

BLEUET EN CORYMBE

1 Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Tiges gris brun. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, jaune orange à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies bleu foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Spiraea trilobata 'Swan Lake'

SPIRÉE 'SWAN LAKE'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

PLANTES GRIMPANTES

Clematis alpina 'Ruby'

CLÉMATITE DES ALPES 'RUBY'

2 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose tendre nuancé de rouge. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Helsingborg'** CLÉMATITE DES ALPES 'HELSINGBORG'

1 Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs simples, pourpre foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Pamela Jackman'** CLÉMATITE DES ALPES 'PAMELA JACKMAN'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs simples, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Rosy O'Grady'** CLÉMATITE DES ALPES 'ROSY O'GRADY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs doubles, rose pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Clematis alpina* 'Willy'** CLÉMATITE DES ALPES 'WILLY'

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs simples, rose pâle et à lignes rougeâtres. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Viburnum lantana

VIORNE COMMUNE

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis noirs. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum lantana* 'Mohican'** VIORNE COMMUNE 'MOHICAN'

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | lourd | acide à alcalin | humide

ARBUSTES

Viburnum dentatum

VIORNE DENTÉE

2 Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum dentatum* 'Autumn Jazz' (V. d. 'Ralph Senior')**

VIORNE DENTÉE 'AUTUMN JAZZ'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, puis jaune, orange et rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



***Viburnum dentatum* 'Blue Muffin'** (*V. d.* 'Christom')

VIORNE DENTÉE 'BLUE MUFFIN'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum dentatum* 'Chicago Lustre'** (*V. d.* 'Synnestvedt')

VIORNE DENTÉE 'CHICAGO LUSTRE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Viburnum dentatum* 'Perle Bleue'** VIORNE DENTÉE 'PERLE BLEUE'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

CONIFÈRES

***Picea orientalis* 'Shadow's Broom'** ÉPINETTE D'ORIENT 'SHADOW'S BROOM'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | neutre | humide

CONIFÈRES

***Tuja occidentalis* 'Brabant'** CÈDRE DU CANADA 'BRABANT'

3 Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, puis vert éclatant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).



MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Lonicera involucrata

CHÈVREFEUILLE À INVOLUCRE

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune orange, teintées de rouge. Fruits pourpre foncé à involucre rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Pieris japonica 'Cavatine' (*P. j. yakushimanum* 'Cavatine')

ANDROMÈDE DU JAPON 'CAVATINE'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Pieris japonica 'Mountain Fire'

ANDROMÈDE DU JAPON 'MOUNTAIN FIRE'

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Pieris japonica 'Nocturne' (*P. j. yakushimanum* 'Nocturne')

ANDROMÈDE DU JAPON 'NOCTURNE'

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port très compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze orangé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Pieris japonica* 'Prelude' (*P. j. yakushimanum* 'Prelude')**

ANDROMÈDE DU JAPON 'PRELUDE'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rose brillant. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Pieris japonica* 'Shojo'**

ANDROMÈDE DU JAPON 'SHOJO'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Pieris japonica* 'Variegata'**

ANDROMÈDE DU JAPON PANACHÉE

1 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanc crème et rose. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'April Dawn'**

RHODODENDRON 'APRIL DAWN'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé tachetées de vert jaunâtre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'April Mist'**

RHODODENDRON 'APRIL MIST'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose pâle bordées de rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'April Rose'**

RHODODENDRON 'APRIL ROSE'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose très foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Besse Howells'**

RHODODENDRON 'BESSE HOWELLS'

2 Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge pourpre foncé, teintées de rouge, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron* x 'Black Satin'**

RHODODENDRON 'BLACK SATIN'

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert pâle, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre à gorge corail, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Boule de Neige'**

RHODODENDRON 'BOULE DE NEIGE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs blanc pur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

Rhododendron x 'Catawbiense Album'

RHODODENDRON CATAWBIENSE 'ALBUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Grosses fleurs blanches teintées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Catawbiense Boursault'

RHODODENDRON CATAWBIENSE 'BOURSAULT'

I Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs lavande, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'English Roseum' (R. x 'Roseum Pink')

RHODODENDRON 'ENGLISH ROSEUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Grosses fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron série Finnish 'Elviira'

RHODODENDRON 'ELVIIRA'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs rouges avec des taches rouges encore plus foncées, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Haaga'

RHODODENDRON 'HAAGA'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs roses au cœur rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Hellikki'

RHODODENDRON 'HELLIKKI'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaunâtres. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs rouge violacé foncé, pâlisant à l'éclosion, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Helsinki University'

RHODODENDRON 'HELSINKI UNIVERSITY'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose brillant avec des taches orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Mikkeli' (R. x 'St Michel')

RHODODENDRON 'MIKKELI'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches bordées de rose et tachetées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



Rhododendron série Finnish 'P.M.A. Tigerstedt' (*R.* x 'Peter Tigerstedt')

RHODODENDRON 'P.M.A. TIGERSTEDT'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches avec des taches rouges au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron série Finnish 'Pohjolan Tytär' (*R.* x 'Pohjola's Daughter')

RHODODENDRON 'POHJOLAN TYTÄR'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouge violacé. Fleurs blanc rosé à blanc avec des taches vertes au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Henry's Red'

RHODODENDRON 'HENRY'S RED'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge foncé à gorge plus foncée, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron *impeditum*

RHODODENDRON IMPEDITUM

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Northern Star Burst'

RHODODENDRON 'NORTHERN STAR BURST'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres, plus pâles au centre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Nova Zembla'

RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA'

2 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouges tachetées de rouge foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Olga Mezitt'

RHODODENDRON 'OLGA MEZITT'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle tachetées de rouge, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

Rhododendron x 'PJM' (R. x 'P.J. Mezitt')

RHODODENDRON 'PJM'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Compact' RHODODENDRON 'PJM COMPACT'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Grandes feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Elite' RHODODENDRON 'PJM ELITE'

1 Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Regal' RHODODENDRON 'PJM REGAL'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'PJM Victor' RHODODENDRON 'PJM VICTOR'

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Ponticum Roseum' (R. x 'Maximum Roseum')

RHODODENDRON 'PONTICUM ROSEUM'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lilas, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Purple Gem' RHODODENDRON 'PURPLE GEM'


Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert olive, pourpres en hiver. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Ramapo' RHODODENDRON 'RAMAPO'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Roseum Elegans' RHODODENDRON 'ROSEUM ELEGANS'

2 Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lavande avec des teintes rouges, tournant au rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.



Rhododendron x 'Weston Pink Diamond'

RHODODENDRON 'WESTON PINK DIAMOND'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs semi-doubles, rose tachetées d'orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston's Aglo' (R. x 'Aglo')

RHODODENDRON 'WESTON'S AGLO'

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, lustrées, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre tachetées de rouge cuivre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Yaku Angel'

RHODODENDRON 'YAKU ANGEL'

3 Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches tachetées de rose pourpre ou de rouge orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Yaku Prince'

RHODODENDRON 'YAKU PRINCE'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre. Fleurs roses tachetées de rose pourpre ou de rouge orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x 'Yaku Princess'

RHODODENDRON 'YAKU PRINCESS'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert olive, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre foncé. Fleurs rose pourpre foncé avec des taches rose pourpre pâle et rouge orangé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushimanum* 'Crete'**

RHODODENDRON 'CRETE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons pourpre clair. Fleurs blanches tachetées de rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushimanum* 'Ken Janeck'**

RHODODENDRON 'KEN JANECK'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose fuchsia. Fleurs blanches tachetées de vert, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Rhododendron yakushimanum* 'Mist Maiden'**

RHODODENDRON 'MIST MAIDEN'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose pourpre. Fleurs blanches avec des taches ou des stries jaune et rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Corylus avellana

NOISETIER COMMUN

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Corylus avellana* 'Contorta'**

NOISETIER CHINOIS TORTUEUX

1 Zone 5a. H. : 1,75 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Rameaux spiralés et tortueux. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port globulaire irrégulier.]

***Philadelphus* x 'Blizzard' (*P. lewisii* 'Blizzard')**

SERINGAT 'BLIZZARD'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Bouquet Blanc'**

SERINGAT 'BOUQUET BLANC'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, branches arquées. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc laiteux, semi-doubles, abondantes, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Philadelphus* x 'Buckley's Quill'** SERINGAT 'BUCKLEY'S QUILL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle. Floraison au début de l'été. Fleurs doubles, blanc pur, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Frosty Morn' (*P. x falconeri* 'Frosty Morn')**

SERINGAT 'FROSTY MORN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Innocence'** SERINGAT 'INNOCENCE'

2 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, tachetées de blanc, de crème ou de jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus* x 'Miniature Snowflake' (*P. x 'Dwarf Snowflake')

SERINGAT 'MINIATURE SNOWFLAKE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, pétales frangés, parfumés. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Minnesota Snowflake'**

SERINGAT 'MINNESOTA SNOWFLAKE'

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc vif, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus* x 'Silver Showers' (*P. x 'Silberregen')

SERINGAT 'SILVER SHOWERS'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Philadelphus* x 'Snow Velvet' (*P. lewisii* 'Snow Velvet')**

SERINGAT 'SNOW VELVET'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps et remontante. Grandes fleurs semi-doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

Philadelphus x 'Snowbelle'

SERINGAT 'SNOWBELLE'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs très doubles, blanc pur, très abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Snowgoose'

SERINGAT 'SNOWGOOSE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Virginal' (*P. x virginalis* 'Virginal')

SERINGAT BLANC

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]

Philadelphus x 'Waterton' (*P. lewisii* 'Waterton')

SERINGAT 'WATERTON'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'White Rock' (*P. tomentosus* 'White Rock'; *P. x.* 'Pekhill')

SERINGAT 'WHITE ROCK'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x 'Yellow Hill'

SERINGAT 'YELLOW HILL'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide

ARBUSTES

Acer negundo 'Flamingo'

ÉRABLE À GIGUÈRE 'FLAMINGO'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses toute la saison. Feuilles vert tendre bordées de rose pâle puis de blanc crème. Feuillage jaune orangé en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Acer negundo 'Kelly's Gold'

ÉRABLE À GIGUÈRE 'KELLY'S GOLD'

1 Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d'or, vert chartreuse en été, puis jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Acer negundo 'Variegatum'

ÉRABLE À GIGUÈRE PANACHÉ

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' CORNOUILLER SANGUIN 'MIDWINTER FIRE'

2 Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges rouge et jaune en hiver. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanchâtres. Fruits blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Cornus sanguinea 'Winter Beauty' (C. s. 'Winter Flame')

CORNOUILLER SANGUIN 'WINTER BEAUTY'

Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges estivales vertes suivies de tiges orange clair et jaune en hiver, puis corail au printemps. Feuilles vertes, jaune d'or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanchâtres. Fruits blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | sec

ARBUSTES

Hydrangea quercifolia

HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea quercifolia 'Alice'

HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'ALICE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.



Hydrangea quercifolia 'Snowflake' HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'SNOWFLAKE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs doubles en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Daphne x burkwoodii 'Briggs Moonlight' (*D. x b.* 'Brigmoon')

DAPHNÉ DE BURKWOOD 'BRIGGS MOONLIGHT'

1 Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, jaune crème avec une petite bordure verte, jaunes en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose pâle, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'

DAPHNÉ DE BURKWOOD 'CAROL MACKIE'

Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert bleuté bordées de jaune, puis jaunes en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanc rosé, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Daphne x burkwoodii 'Somerset' DAPHNÉ DE BURKWOOD 'SOMERSET'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert bleuté, jaunes en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose mauve, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Euonymus fortunei 'Blondy' (*E. f.* 'Interbolwi')

FUSAIN DE FORTUNE 'BLONDY'

Zone 5a. H. : 45 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanches. Feuilles persistantes, vertes au centre jaune vif. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'CANADALE GOLD'

2 Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert pâle bordées de jaune d'or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Coloratus' FUSAIN DE FORTUNE 'COLORATUS'

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, vert moyen, rouge clair, puis pourpres en automne. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei 'Country Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'COUNTRY GOLD'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



***Euonymus fortunei* 'E.T.' (E. f. 'E.T. Gold')**

FUSAIN DE FORTUNE 'E.T.'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert foncé, bordées de jaune d'or. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Harlequin'**

FUSAIN DE FORTUNE 'HARLEQUIN'

Zone 5b. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persistantes, vertes tachetées de blanc, ou blanches tachetées de vert. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Euonymus fortunei* 'Sheridan Gold'**

FUSAIN DE FORTUNE 'SHERIDAN GOLD'

3 Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, jaune d'or au printemps, vert éclatant en été. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Euonymus fortunei* 'Sungold'**

FUSAIN DE FORTUNE 'SUNGOLD'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Sunspot'**

FUSAIN DE FORTUNE 'SUNSPOT'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé avec des taches jaunes au centre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Surespot'**

FUSAIN DE FORTUNE 'SURESPOT'

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vert lustré avec une tache jaune au centre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Sambucus nigra

SUREAU NOIR

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, odorantes (désagréable), jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits en baies noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus nigra* 'Aureomarginata'**

SUREAU NOIR À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, plus ou moins bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Sambucus nigra 'Black Beauty' (*S. n.* 'Gerda')

SUREAU NOIR 'BLACK BEAUTY'

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé toute la saison. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, parfumées (citron). Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra 'Guincho Purple' (*S. n.* 'Purpurea')

SUREAU NOIR À FEUILLES POURPRES

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert bronze, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra 'Laciniata'

SUREAU NOIR À FEUILLES LACINIÉES

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, très découpées, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra 'Madonna'

SUREAU NOIR 'MADONNA'

1

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaunes. Feuilles vertes, irrégulièrement panachées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra 'Marginata' (*S. n.* 'Albomarginata')

SUREAU ARGENTÉ

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, panachées d'argent. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra 'Pulverulenta'

SUREAU NOIR 'PULVERULENTA'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, tachetées de blanc. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Weigela x 'Briant Rubidor' (*W.* x 'Olympiade'; *W.* x 'Rubidor')

WEIGELA 'BRIANT RUBIDOR'

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Feuilles jaunes ou vertes bordées de jaune. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

PLANTES GRIMPANTES

Aristolochia macrophylla (*A. durior*; *A. siphon*)

ARISTOLOCHE

2

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes en forme de cœur. Fleurs jaunâtres, ressemblant à des pipes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Abrite les oiseaux.

Clematis x 'Carnaby'

CLÉMATITE 'CARNABY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes fleurs simples, blanches à larges bandes roses. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Guernsey Cream'

CLÉMATITE 'GUERNSEY CREAM'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs jaune crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x 'Nelly Moser'

CLÉMATITE 'NELLY MOSER'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs parfumées, blanc rosé à lignes rose pâle, étamines jaune et brune. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis macropetala 'Blue Bird' CLÉMATITE 'BLUE BIRD'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu mauve. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis macropetala 'Jan Lindmark'

CLÉMATITE 'JAN LINDMARK'

3 Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, mauve pourpre. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis macropetala 'Lagoon' (C. m. 'Blue Lagoon')

CLÉMATITE 'LAGOON'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.



MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

Clematis macropetala 'Maidwell Hall'

CLÉMATITE 'MAIDWELL HALL'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, bleu très foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis macropetala 'Markham's Pink'

CLÉMATITE 'MARKHAM'S PINK'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs en clochettes, roses. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis maximowicziana (*C. paniculata*; *C. terniflora*)

CLÉMATITE D'AUTOMNE

Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs blanches, parfumées. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis texensis 'Duchess of Albany'

CLÉMATITE 'DUCHESS OF ALBANY'

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs tubulaires, rose pâle et rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Lonicera x heckrottii 'Gold Flame' CHÈVREFEUILLE 'GOLD FLAME'

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Boutons floraux rouges. Fleurs tubulaires rose et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Carya glabra

CARYER GLABRE

■ Zone 5a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Carya ovata

CARYER À NOIX DOUCES

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits comestibles. Écorce décorative, grise, s'exfoliant avec l'âge. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Sensible à la pollution. Plante très allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

Acer pensylvanicum

ÉRABLE DE PENNSYLVANIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Écorce décorative, verte striée de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.



***Amelanchier x grandiflora* (A. lamarckii)**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits noir violet. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier x grandiflora* 'Autumn Brilliance'**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'AUTUMN BRILLIANCE'

Zone 4a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, puis jaune, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits rouges. Écorce décorative, grise. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Amelanchier x grandiflora* 'Princess Diana'**

AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'PRINCESS DIANA'

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert brillant, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits bleu noir. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Halesia carolina

ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bruns. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea arborescens* 'Annabelle'** HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'ANNABELLE'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Grosses fleurs blanches, rondes, stériles, de forme régulière, séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Hydrangea arborescens* 'Grandiflora'** HYDRANGÉE ARBORESCENTE À GRANDES FLEURS

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, rondes, stériles, de forme irrégulière, séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Hydrangea arborescens* 'White Dome'**

HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'WHITE DOME'

2 Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, de type « Lace » (fertiles et stériles), séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

Hydrangea serrata 'Arctic Blue' HYDRANGÉE SERRATA 'ARCTIC BLUE'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et stériles bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata 'Blue Billow' HYDRANGÉE SERRATA 'BLUE BILLOW'

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles bleu pâle et aux fleurs stériles bleu foncé en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata 'Bluebird' HYDRANGÉE SERRATA 'BLUEBIRD'

1 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et stériles bleu azur. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata 'Golden Sunlight' HYDRANGÉE SERRATA 'GOLDEN SUNLIGHT'

2 Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes au printemps, vert chartreuse en été, puis bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et stériles blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata 'Preziosa' HYDRANGÉE SERRATA 'PREZIOSA'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et stériles roses, puis rouges ou mauves selon le pH du sol. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.



***Leucothoe fontanesiana* 'Rainbow' (L. x 'Girard's Rainbow')**

LEUCOTHOE ARC-EN-CIEL

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanc, rose et cuivre. Feuilles vertes panachées ou tachetées de blanc. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Leucothoe* x 'Scarletta' (L. x 'Zebloid')** LEUCOTHOE 'SCARLETTA'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, rouge écarlate au printemps, vert bronze en été, puis rouge vin en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Stewartia pseudocamellia STEWARTIA

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Écorce brun, gris et orange, très décorative. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert foncé, puis rouge orange à rouge bronze en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

***Tsuga canadensis* 'Albospica'** PRUCHE DU CANADA 'ALBOSPICA'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-nain, plus ou moins érigé. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanches ou panachées de blanc. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Bennett'** PRUCHE DU CANADA 'BENNETT'

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port semi-pleureur, étalé. Tiges principales semi-érigées. Rameaux pleureurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Gentsch White'** PRUCHE DU CANADA 'GENTSCH WHITE'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,80 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanches. Aiguilles vert foncé tachetées de blanc, grisâtres dessous, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Moon Frost'** PRUCHE DU CANADA 'MOON FROST'

3 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanches. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Pousses rosées en automne et en hiver. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'New Gold'** PRUCHE DU CANADA 'NEW GOLD'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune brillant. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Summer Snow'** PRUCHE DU CANADA 'SUMMER SNOW'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, compact. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanc crème. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

PLANTES GRIMPANTES

Actinidia arguta

KIWI

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes. Fleurs blanches, parfumées. Floraison printanière. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Actinidia arguta* 'Issai'**

KIWI 'ISSAI'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes. Fleurs blanches, parfum léger. Floraison printanière. Fruits comestibles. Plante autoféconde. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Actinidia kolomikta

KIWI KOLOMIKTA

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle (moins coloré) pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

***Actinidia kolomikta* 'Arctic Beauty'** KIWI KOLOMIKTA 'ARCTIC BEAUTY'

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Cornus sericea* 'Kelsey'**

CORNOUILLER DE KELSEY

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, semi-lustrées, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Dirca palustris

DIRCA DES MARAIS

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle, jaunes en automne. Fruits rougeâtres. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante légèrement toxique.



***Ilex* x 'Sparkleberry'**

HOUX 'SPARKLEBERRY'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Nouvelles pousses rougeâtres. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE**SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide****ARBUSTES*****Itea virginica* 'Henri's Garnet'**

ITÉA DE VIRGINIE 'HENRI'S GARNET'

1 Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Tiges vertes, devenant rouges en automne. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, vertes, puis rouge écarlate à reflets pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

***Itea virginica* 'Little Henri' (l. v. 'Sprich')**

ITÉA DE VIRGINIE 'LITTLE HENRI'

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, bas. Tiges vertes, devenant rouges en automne. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, vertes, puis rouge écarlate à reflets pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé****ARBRES*****Fagus grandifolia***

HÊTRE À GRANDES FEUILLES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port ovoïde, large et régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, bronze en automne, persistant partiellement en hiver. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative, gris argenté et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Betula lenta

BOULEAU FLEXIBLE

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brun rougeâtre, aromatique. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES***Enkianthus campanulatus***

ENKIANTHE EN CLOCHES

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert tendre, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème ou jaunâtres, légèrement teintées de rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Enkianthus campanulatus* 'Red Bells'**

ENKIANTHE EN CLOCHES 'RED BELLS'

2 Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert tendre, puis rouge, jaune et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème ou jaunâtres, veinées de rouge et de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | très acide | humide

ARBUSTES

Clethra alnifolia

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Hokie Pink'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'HOKIE PINK'

I Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Hummingbird'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'HUMMINGBIRD'

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port ovoïde, irrégulier, compact. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, jaune d'or en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Pink Spire'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'PINK SPIRE'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle, jaune pâle en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Rosea'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'ROSEA'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses tournant au blanc, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Ruby Spice'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'RUBY SPICE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses foncé, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'September Beauty'**


CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'SEPTEMBER BEAUTY'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison à la fin de l'été. Grandes fleurs blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.

***Clethra alnifolia* 'Sixteen Candles'**

CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'SIXTEEN CANDLES'

Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire les papillons.



Epigaea repens

ÉPIGÉE RAMPANTE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert brillant, rouge verdâtre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches ou rosées. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.

MI-OMBRE

SOL | riche | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Viburnum trilobum

PIMBINA

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges, comestibles, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi.]

Viburnum trilobum 'Alfredo'

PIMBINA 'ALFREDO'

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge brillant en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Viburnum trilobum 'Compactum'

PIMBINA NAIN

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Viburnum trilobum 'Wentworth'

PIMBINA 'WENTWORTH'

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Gros fruits jaune rougeâtre à rouge vif, comestibles, abondants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBRES

Acer platanoides 'Schwedleri'

ÉRABLE DE NORVÈGE 'SCHEWDLERI'

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge clair au printemps, devenant rouge pourpre, puis vert olive à l'été. Teintes rouges et rousses en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Prunus maackii

CERISIER DE L'AMOUR

1 Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en grappes. Fruits rougeâtre foncé. Écorce brun rouge brillant, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

ARBUSTES

***Symphoricarpos* x *chenaultii* 'Hancock'**

SYMPHORINE DE HANCOCK

Zone 5a. H. : 70 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits roses ou rose tacheté de blanc, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

MI-OMBRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | humide

ARBRES

Betula alleghaniensis

BOULEAU JAUNE

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative jaune à cuivré. Croissance moyenne. Enracinement très superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Daphne mezereum

BOIS JOLI

2 Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pourpre, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.



***Daphne mezereum* 'Alba'**

BOIS JOLI À FLEURS BLANCHES

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

***Daphne mezereum* 'Rubra'**

BOIS JOLI À FLEURS ROUGES

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.

Viburnum plicatum

VIORNE DU JAPON

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

***Viburnum plicatum* 'Shasta'**

VIORNE DU JAPON 'SHASTA'

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Branches horizontales. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

***Viburnum plicatum* 'Summer Snowflake'**

VIORNE DU JAPON 'SUMMER SNOWFLAKE'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps et en été. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE**SOL | riche | léger à lourd | neutre | sec à très humide****ARBUSTES*****Spiraea x vanhouttei***

SPIRÉE VAN HOUTTE

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert sombre, vert pâle en dessous, puis brun pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea x vanhouttei* 'Pink Ice' (S. x v. h. 'Captain')**

SPIRÉE VAN HOUTTE 'PINK ICE'

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses blanches et vertes. Feuilles vert sombre, panachées de blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spiraea x vanhouttei* 'Renaissance'**

SPIRÉE VAN HOUTTE 'RENAISSANCE'

- Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port en fontaine. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

CONIFÈRES

Abies balsamea

SAPIN BAUMIER

Plante indigène. Zone 3a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits pourpres, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

***Abies balsamea* 'Nana'**

SAPIN BAUMIER NAIN

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

***Abies balsamea* 'Piccolo'**

SAPIN BAUMIER 'PICCOLO'

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons brun rouge. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

MI-OMBRE

SOL | riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

ROSIEURS

Rosa blanda

ROSIER DU LABRADOR

Plante indigène. Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. Fleurs simples, rose foncé, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge foncé, persistants. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

MI-OMBRE

SOL | riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Rhododendron* x 'Golden Lights'**

AZALÉE 'GOLDEN LIGHTS'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs jaune d'or, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

***Rhododendron* x 'Lemon Lights'**

AZALÉE 'LEMON LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Mandarin Lights' AZALÉE 'MANDARIN LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mandarine avec des reflets orange, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Northern Hi-Lights' AZALÉE 'NORTHERN HI-LIGHTS'

2 Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes, puis bourgogne et pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème coloré de jaune pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Northern Lights' AZALÉE 'NORTHERN LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Orchid Lights' AZALÉE 'ORCHID LIGHTS'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs roses, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Pink and Sweet' AZALÉES 'PINK AND SWEET'

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, puis bronze et pourpre rouge orangé en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose pourpre avec un cœur rose foncé et des étamines jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Pink Lights' AZALÉE 'PINK LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, abondantes, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



MI-OMBRE SOL | riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

Rhododendron x 'Popsicle' AZALÉE 'POPSICLE'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, puis rouge vin en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Rosy Lights' AZALÉE 'ROSY LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vertes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé avec des reflets rouge rosé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron schlippenbachii AZALÉE ROYALE

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vert foncé, puis jaune, orange et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Spicy Lights' AZALÉE 'SPICY LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs orange saumoné, légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Tri-Lights' AZALÉE 'TRI-LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose foncé. Fleurs rose pourpre, avec des plages blanches et des taches jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Western Lights' AZALÉE 'WESTERN LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, glauques. Floraison prolongée à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston's Innocence' AZALÉE 'WESTON'S INNOCENCE'

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles caduques, vert foncé luisant, puis rouge vin, rouge et jaune en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'Weston's Lollipop' AZALÉE 'WESTON'S LOLLIPOP'

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé, rouge orangé en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose clair tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x 'White Lights' AZALÉE 'WHITE LIGHTS'

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rosés. Grandes fleurs blanches à gorge jaune, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.



MI-OMBRE

SOL | riche | tourbeux | très acide | humide

ARBUSTES

Hydrangea macrophylla 'All Summer Beauty'

HORTENSIA DES JARDINS 'ALL SUMMER BEAUTY'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs en boule, bleu foncé en sol très acide, rose bleuté en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Alpen Glow' (*H. m.* 'Alpenglühchen')

HORTENSIA DES JARDINS 'ALPEN GLOW'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouge foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Blue Wave' (*H. m.* 'Mariesii Perfecta')

HORTENSIA DES JARDINS 'BLUE WAVE'

1 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu foncé en sol acide, rose lilas en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

HORTENSIA DES JARDINS 'BOUQUET ROSE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rose clair. Tire sur le bleu en sol acide. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Dooley' HORTENSIA DES JARDINS 'DOOLEY'

2 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Grandes fleurs stériles, en boule, bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla 'Forever Pink'

HORTENSIA DES JARDINS 'FOREVER PINK'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Lemon Wave'**

HORTENSIA DES JARDINS 'LEMON WAVE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes, bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs mauves, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Maculata' (H. m. 'Variegata')**

HORTENSIA DES JARDINS PANACHÉ

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu à rose, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Mariesii Variegata'**

HORTENSIA DES JARDINS MARIESII PANACHÉ

- 1 Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Masja' HORTENSIA DES JARDINS 'MASJA'**

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Nikko Blue' HORTENSIA DES JARDINS 'NIKKO BLUE'**

- 2 Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, bleues en sol acide, bleu et rose en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Pia' (H. m. 'Mini Pink Elf')**

HORTENSIA DES JARDINS 'PIA'

Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Pink Beauty'**

HORTENSIA DES JARDINS 'PINK BEAUTY'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose pâle. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Sœur Thérèse' (H. m. 'Sister Therese')**

HORTENSIA DES JARDINS 'SŒUR THÉRÈSE'

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

***Hydrangea macrophylla* 'Tokyo Delight'**

HORTENSIA DES JARDINS 'TOKYO DELIGHT'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles blanches et fertiles roses, devenant toutes roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.



***Hydrangea macrophylla* 'White Wave'**

HORTENSIA DES JARDINS 'WHITE WAVE'

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Lonicera* x 'Marble King'**

CHÈVREFEUILLE 'MARBLE KING'

3 Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bordées et tachetées de jaune ou de blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Rhus aromatica

SUMAC AROMATIQUE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Rhus aromatica* 'Grow Low'**

SUMAC AROMATIQUE 'GROW LOW'

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Spiraea fritschiana* 'Chicago Snow' SPIRÉE 'CHICAGO SNOW'**

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc pur, virant parfois au rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | humide

ARBUSTES

Amelanchier canadensis

AMÉLANCHIER DU CANADA

Plante indigène. Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orangé en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, étroit.]

***Amelanchier canadensis* 'Ballerina'** AMÉLANCHIER DU CANADA 'BALLERINA'

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde, étroit.]

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Aronia arbutifolia

ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

***Aronia arbutifolia* 'Brilliant'** (*A. a.* 'Brilliantissima')

ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER 'BRILLIANT'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Feuilles colorées, persistant longtemps à l'automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges lustrés, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Euonymus alatus

FUSAIN AILÉ

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, violet pourpre et orange en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus alatus* 'Chicago Fire' (E. a. 'Timber Creek')**

FUSAIN AILÉ 'CHICAGO FIRE'

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, tôt en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

***Euonymus alatus* 'Compactus'**

FUSAIN AILÉ NAIN

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge écarlate en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi.]

***Euonymus alatus* 'Fire Ball' (E. a. 'Compactus Select')**

FUSAIN AILÉ 'FIRE BALL'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge flamme en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits orange écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Lonicera morrowii

CHÈVREFEUILLE DE MORROW

1 Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Salix chaenomeloides

SAULE À CHATONS ARGENTÉS

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, irrégulier. Bourgeons et tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs blanches devenant rosées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

ARBUSTES

***Cornus alba* (C. tatarica)**

CORNOUILLER BLANC

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

***Cornus alba* 'Aurea'**

CORNOUILLER DORÉ

2 Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge et jaune. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d'or puis jaune pâle, jaune foncé en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Bud's Yellow'

CORNOUILLER BLANC 'BUD'S YELLOW'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches jaunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Cream Cracker'

CORNOUILLER BLANC 'CREAM CRACKER'

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge pourpre. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes, bordées de jaune. Feuilles vertes bordées de crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Elegantissima' (C. a. 'Argenteomarginata')

CORNOUILLER ARGENTÉ

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris bleuté, largement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Cornus alba 'Gouchaultii'

CORNOUILLER DE GOUCHAULT

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses tachetées de rose. Feuilles vertes panachées de jaune, puis jaune verdâtre. Fruits en baies bleu pâle. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Ivory Halo' (C. a. 'Bailhalo')

CORNOUILLER BLANC 'IVORY HALO'

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé légèrement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Kesselringii'

CORNOUILLER DE KESSELRING

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches pourpre foncé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Siberian Pearls'

CORNOUILLER BLANC 'SIBERIAN PEARLS'

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge clair. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Sibirica' (C. a. 'Korall')

CORNOUILLER DE SIBÉRIE

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

CORNOUILLER DE SIBÉRIE PANACHÉ

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture dense. Feuilles gris vert, bordées de blanc, puis rouge carmin en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

Cornus alba 'Touch of Elegance' (C. a. 'Staltouch')

CORNOUILLER BLANC 'TOUCH OF ELEGANCE'

1 Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, marginées de blanc, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba 'Variegata'

CORNOUILLER BLANC PANACHÉ

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus pumila

CORNOUILLER NAIN

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourprées. Feuilles vertes teintées de pourpre. Floraison au début de l'été. Fleurs jaunâtres. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Salix discolor

SAULE DISCOLORE

2 Plante indigène. Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles vertes, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

Salix koriyanagi 'Rubykins'

SAULE 'RUBYKINS'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses rose pâle. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Rubus cockburnianus 'Goldenvale' RONCE DE COCKBURN DORÉE

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges épineuses, pourpres recouvertes de pruine blanchâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très découpées, jaune doré. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Pour jardinier averti.





OMBRE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Gaultheria procumbens

THÉ DES BOIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles aromatiques, persistantes, vert lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement traçant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Rubus idaeus 'Aureus'

RONCE DU MONT IDA DORÉE

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune citron, brillantes. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Mahonia aquifolium

MAHONIA À FEUILLES DE HOUX

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles persistantes, piquantes, vert foncé lustré, vert jaunâtre dessous. Feuillage rouge orangé et cuivre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits vert bleuté grisâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

PLANTES GRIMPANTES

Smilax herbacea

SMILAX HERBACÉ

Plante indigène. Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs verdâtres. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits rouges ou pourpres. Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Daphne x burkwoodii* 'Carol Mackie'**

DAPHNÉ DE BURKWOOD 'CAROL MACKIE'

- 1** Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert bleuté bordées de jaune, puis jaunes en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs blanc rosé, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

***Daphne x burkwoodii* 'Somerset'** DAPHNÉ DE BURKWOOD 'SOMERSET'

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert bleuté, jaunes en automne. Floraison à la fin de l'été. Fleurs rose mauve, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

PLANTES GRIMPANTES

***Clematis maximowicziana* (C. paniculata; C. terniflora)**

CLÉMATITE D'AUTOMNE

- 2** Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites fleurs blanches, parfumées. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Acer pensylvanicum

ÉRABLE DE PENNSYLVANIE

- 3** Plante indigène. Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Écorce décorative, verte striée de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les chevreuils

***Hydrangea arborescens* 'Annabelle'**

HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'ANNABELLE'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Grosses fleurs blanches, rondes, stériles, de forme régulière, séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Hydrangea arborescens* 'Grandiflora'**

HYDRANGÉE ARBORESCENTE À GRANDES FLEURS

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, rondes, stériles, de forme irrégulière, séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Hydrangea arborescens* 'White Dome'**

HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'WHITE DOME'

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, de type « Lace » (fertiles et stériles), séchant sur le plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Dirca palustris

DIRCA DES MARAIS

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle, jaunes en automne. Fruits rougeâtres. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante légèrement toxique.

OMBRE

SOL | riche | tourbeux | très acide | humide

ARBUSTES

Epigaea repens

ÉPIGÉE RAMPANTE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert brillant, rouge verdâtre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches ou rosées. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | sec

CONIFÈRES

***Pinus albicaulis* 'Algonquin Pillar'** PIN À ÉCORCE BLANCHE 'ALGONQUIN PILLAR'

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

CONIFÈRES

Tsuga diversifolia

PRUCHE DU JAPON

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles larges, courtes, vert foncé lustré, blanchâtres dessous, odorantes. Fleurs pourpres et rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils



INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | léger | très acide | sec

ARBUSTES

Arctostaphylos uva-ursi

RAISIN D'OURS

1 Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge écarlate, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Arctostaphylos uva-ursi* 'Massachusetts'**

RAISIN D'OURS 'MASSACHUSETTS'

Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches teintées de rose. Fruits rouge écarlate, comestibles, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Arctostaphylos uva-ursi* 'Point Reyes'**

RAISIN D'OURS 'POINT REYES'

Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge écarlate, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

***Arctostaphylos uva-ursi* 'Vancouver Jade'**

RAISIN D'OURS 'VANCOUVER JADE'

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Jeunes pousses rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair, lustrées, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouge écarlate, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | meuble | légèrement alcalin | humide

ARBUSTES

***Physocarpus monogynus* (*P. opulifolius* 'Nanus')**

PHYSOCARPE NAIN

2 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

GROSEILLIER SANGUIN 'KING EDWARD VII'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune et ambre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENT

SOL | pauvre | tourbeux | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Kalmia polifolia (*K. glauca*)

KALMIE GLAUQUE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, vert jaunâtre dessous, puis pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose tendre, tachetées de pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre | tourbeux | très acide | très humide

ARBUSTES

Kalmia angustifolia

KALMIE À FEUILLES ÉTROITES

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Symphoricarpos albus (*S. racemosus*)

SYMPHORINE BLANCHE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits blanc neigeux, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos orbiculatus (*S. vulgaris*)

SYMPHORINE À FEUILLES RONDES

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge pourpré, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).



INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

Buxus x 'Chicagoland Green' (*B. x 'Glencoe'*)

BUIS HYBRIDE 'CHICAGOLAND GREEN'

1 Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert bleuté toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus x 'Green Gem'

BUIS HYBRIDE 'GREEN GEM'

Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement fibreux, superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus x 'Green Mound'

BUIS HYBRIDE 'GREEN MOUND'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus x 'Green Mountain' (*B. x 'Clipped One'*)

BUIS HYBRIDE 'GREEN MOUNTAIN'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus x 'Green Velvet'

BUIS HYBRIDE 'GREEN VELVET'

2 Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert tendre. Feuilles persistantes, vert très foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

PLANTES GRIMPANTES

Hydrangea anomala petiolaris

HYDRANGÉE GRIMPANTE

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs blanches, parfumées. Floraison estivale. Coloration automnale orange. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Lonicera dioica

CHÈVREFEUILLE DIOÏQUE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Viburnum acerifolium

VIORNE À FEUILLES D'ÉRABLE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs. Écorce décorative pourpre à gris brun. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Hedera helix* 'Bulgaria'**

LIERRE ARBUSTIF 'BULGARIA'

Zone 4a. H. : 20 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, rougeâtres en automne. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement traçant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante toxique (fruits) et allergène (dermatite).

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Rubus odoratus

FRAMBOISIER ODORANT

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges grises, puis orangées et finalement brunâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose pourpre, parfumées. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

***Rubus odoratus* 'Rubra'**

FRAMBOISIER ODORANT À FLEURS ROUGES

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges grises, puis orangé et brunâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose pourpre foncé, parfumées. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.

CONIFÈRES

***Taxus cuspidata* 'Capitata'**

IF DU JAPON 'CAPITATA'

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, compact, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, luisantes. Coloration automnale pourpre rougeâtre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus cuspidata 'Nana'

IF DU JAPON NAIN

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé brillant. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus x media 'Brownii'

IF HYBRIDE DE BROWN

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port évasé à semi-globulaire. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles et tiges).

Taxus x media 'Densiformis'

IF HYBRIDE 'DENSIFORMIS'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale bronze. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus x media 'Fairview'

IF HYBRIDE 'FAIRVIEW'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus x media 'Flushing'

IF HYBRIDE 'FLUSHING'

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 60 cm. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé, lustrées. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.

Taxus x media 'Hicksii'

IF HYBRIDE DE HICKS

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé luisant. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus x media 'Hilli'

IF HYBRIDE DE HILL

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé brillant. Coloration automnale vert pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.

Taxus x media 'Sentinalis'

IF HYBRIDE 'SENTINALIS'

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.

Taxus x media 'Viridis' (T. x m. 'Stricta Viridis')

IF HYBRIDE 'VIRIDIS'

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vert jaunâtre. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Sambucus canadensis

SUREAU DU CANADA

1 Plante indigène. Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies noires, comestibles. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

***Sambucus canadensis* 'Adams'** SUREAU DU CANADA 'ADAMS'

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies noires, abondants, comestibles. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

PLANTES GRIMPANTES

Apios americana

APIOS D'AMÉRIQUE

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs pourpre brunâtre, parfum léger. Floraison estivale. Fruits en gousses. Croissance rapide. Enracinement superficiel, envahissant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

Viburnum alnifolium

VIORNE À FEUILLES D'AULNE

2 Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | très humide

ARBUSTES

Xanthorhiza simplicissima

XANTHORHIZA À FEUILLES DE CÉLÉRI

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, orange écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs brun rouge. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Acer ginnala

ÉRABLE DE L'AMOUR

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant, rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi.]

***Acer ginnala* 'Compactum' (A. g. 'Bailey Compact')**

ÉRABLE DE L'AMOUR COMPACT

Zone 2b. H. : 4,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, compact, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant, rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

***Acer ginnala* 'Flame'**

ÉRABLE DE L'AMOUR 'FLAME'

3

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé luisant. Tôt en automne, feuillage jaune à rouge orangé brillant. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

INDIFFÉRENTE

SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

PLANTES GRIMPANTES

Parthenocissus quinquefolia

VIGNE-VIERGE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 10 m. Tiges à vrilles racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Coloration automnale rouge et pourpre. Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement drageonnant, envahissant. Transplantation très facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

Parthenocissus quinquefolia engelmannii

VIGNE-VIERGE D'ENGELMANN

Zone 2a. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Tiges à vrilles ventouses. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, avec des taches blanches plus ou moins grandes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Coloration automnale vert, blanc et rose. Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement drageonnant, envahissant. Transplantation très facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

***Parthenocissus quinquefolia* 'Star Showers'** (*P. q.* 'Monham')
VIGNE-VIERGE 'STAR SHOWERS'

1 Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, brillantes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Coloration automnale rouge et pourpre. Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement drageonnant, envahissant. Transplantation très facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

Vitis riparia VIGNE DES MARAIS

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vertes. Fleurs vertes, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits bleu noirâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Ribes alpinum GADELIER ALPIN

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

***Ribes alpinum* 'Green Jeans'** (*R. a.* 'Spreg')
GADELIER ALPIN 'GREEN JEANS'

2 Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, très brillantes, tard en saison. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Résiste aux maladies.

***Ribes alpinum* 'Schmidt'** GADELIER ALPIN 'SCHMIDT'

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Résiste aux maladies.



INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

Staphylea trifolia

STAPHYLEA À TROIS FEUILLES

Plante indigène. Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en cloches, blanches. Fruits en capsules brunes. Écorce décorative brun et gris. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

ARBRES

Tilia americana

TILLEUL AMÉRICAIN

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune pâle en automne. Floraison en début d'été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Tilia americana* 'Fastigiata'**

TILLEUL AMÉRICAIN FASTIGIÉ

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune pâle en automne. Floraison en début d'été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Tilia americana* 'Nova'**

TILLEUL AMÉRICAIN 'NOVA'

Zone 3a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port ovoïde, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, vertes, puis jaune pâle en automne. Floraison en début d'été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Tilia americana* 'Redmond'**

TILLEUL AMÉRICAIN 'REDMOND'

Zone 3a. H. : 17 m. L. : 10 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair, grandes, jaune pâle en automne. Floraison en début d'été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

ARBUSTES

***Buxus* x 'Medad'**

BUIS HYBRIDE 'MEDAD'

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, bronze en automne. Croissance lente. Enracinement fibreux, superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Buxus sinica insularis* 'Green Beauty' (*B. microphylla koreana* 'Green Beauty')**

BUIS DE CORÉE 'GREEN BEAUTY'

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, lustrées toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Buxus sinica insularis* 'Pinchusion'**

BUIS DE CORÉE 'PINCHUSION'

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, bronze en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Buxus sinica insularis* 'Winter Beauty'**

BUIS DE CORÉE 'WINTER BEAUTY'

1 Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Buxus sinica insularis* 'Winter Gem' BUIS DE CORÉE 'WINTER GEM'**

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé toute l'année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety'**

FUSAIN DE FORTUNE 'EMERALD GAIEITY'

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé panachées de blanc, avec des teintes de rose et de rouge en automne et en hiver. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Emerald'n Gold' FUSAIN DE FORTUNE 'EMERALD'N GOLD'**

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persistantes, vert foncé panachées de jaune, avec des teintes de rose au rouge en automne et en hiver. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Gold Tip' (E. f. 'Golden Prince')**

FUSAIN DE FORTUNE 'GOLD TIP'

2 Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, jaune d'or au printemps, vert jaunâtre en été avec des jeunes pousses jaune d'or. Feuillage rose, rouge et blanc en automne et en hiver. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Kewensis' FUSAIN DE FORTUNE 'KEWENSIS'**

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé, rougeâtres en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

***Euonymus fortunei* 'Niagara Gem' FUSAIN DE FORTUNE 'NIAGARA GEM'**

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, vertes, lustrées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Euonymus fortunei* 'Sarcoxié' FUSAIN DE FORTUNE 'SARCOXIE'**

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé. Fruits roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Euonymus fortunei vegetus* FUSAIN DE FORTUNE RAMPANT**

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, vert clair mat. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.



PLANTES GRIMPANTES

***Clematis montana* 'Odorata'**

CLÉMATITE DES MONTAGNES ODORANTE

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs rose pâle, parfumées. Floraison au printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | neutre | humide

ARBUSTES

Sorbaria sorbifolia

SORBARIA À FEUILLES DE SORBIER

Zone 2a. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBRES

Ostrya virginiana

OSTRYER DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 7,00 m. Port conique à arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle, jaune d'or en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits vert pâle, puis rougeâtres. Écorce décorative, brune, fissurée. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

ARBUSTES

Cornus alternifolia

CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES

3 Plante indigène. Zone 3b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon originale. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, glauques dessous, pourpre foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

***Hamamelis x intermedia* 'Arnold Promise'**

HAMAMÉLIS HYBRIDE 'ARNOLD PROMISE'

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune à orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.



***Hamamelis x intermedia* 'Diane'** HAMAMÉLIS HYBRIDE 'DIANE'

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune à rouge en automne, puis brun et persistant en hiver. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge bronze foncé, parfum léger. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

***Hamamelis x intermedia* 'Jelena'** HAMAMÉLIS HYBRIDE 'JELENA'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune à orange en automne. Floraison automnale. Fleurs cuivre, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

***Hamamelis x intermedia* 'Ruby Glow'**

HAMAMÉLIS HYBRIDE 'RUBY GLOW'

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge orange. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

CONIFÈRES

Taxus canadensis

IF DU CANADA

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port étalé. Tiges partant du sol. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale rougeâtre. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles et tiges).

Tsuga canadensis

PRUCHE DU CANADA

1 Plante indigène. Zone 4a. H. : 20 m. L. : 9,00 m. Port conique large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Cloud Prune'** PRUCHE DU CANADA 'CLOUD PRUNE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étendu, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Cole's Prostrate'** PRUCHE DU CANADA 'COLE'S PROSTRATE'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Branches en cascades. Rameaux retombants. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Dawsoniana'** PRUCHE DU CANADA 'DAWSONIANA'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port conique, très irrégulier. Feuillage de texture fine. Rameaux retombants. Aiguilles vert brillant, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Geneva'** PRUCHE DU CANADA 'GENEVA'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé, ouvert. Feuillage de texture fine. Branches ascendantes. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Gracilis'** PRUCHE DU CANADA 'GRACILIS'

2 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert grisâtre. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Horsford Contorted'**

PRUCHE DU CANADA 'HORSFORD CONTORTED'

3 Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Jacqueline Verkade'**

PRUCHE DU CANADA 'JACQUELINE VERKADE'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, plat sur le dessus, compact. Feuillage de texture très fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Jeddeloh'** PRUCHE DU CANADA 'JEDDELOH'

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Jervis'** PRUCHE DU CANADA 'JERVIS'

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, ouvert, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Kelsey's Weeping'** PRUCHE DU CANADA 'KELSEY'S WEEPING'

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tronc droit, branches horizontales, rameaux pleureurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Minuta'** PRUCHE DU CANADA 'MINUTA'

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Nana'** PRUCHE DU CANADA NAINE

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Pendula'** PRUCHE DU CANADA PLEUREUSE

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Branches retombantes. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Slenderella'**

PRUCHE DU CANADA 'SLENDERELLA'

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire, étroit. Branches retombantes le long du tronc. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

***Tsuga canadensis* 'Stockman's Dwarf'**

PRUCHE DU CANADA 'STOCKMAN'S DWARF'

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, bas. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

ARBUSTES

***Carpinus caroliniana* (C. americana)**

CHARME DE CAROLINE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert glauque, orange foncé écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits persistants. Écorce décorative, gris bleu. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | très acide | humide

ARBUSTES

Viburnum cassinoides

VIORNE CASSINOÏDE

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, puis rouge orange à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits verts, puis roses, puis bleus et finalement noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



***Viburnum cassinoides* 'Appalache'**

VIORNE CASSINOÏDE 'APPALACHE'

- 1** Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits jaunes, puis roses, puis bleu foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | lourd | acide à alcalin | humide

ARBUSTES

Viburnum lentago

ALISIER

Plante indigène. Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits jaunes ou rouge orangé, puis noir bleuté, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec

ARBUSTES

Ribes aureum

GADELIER DORÉ

Zone 2a. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits rouge foncé. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE

SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Diervilla lonicera* (*D. canadensis*)** DIERVILLÉE CHÈVREFEUILLE

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, rouge orange en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Diervilla lonicera* 'Copper'** DIERVILLÉE CHÈVREFEUILLE 'COPPER'

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses cuivre, continues toute la saison. Feuilles vert foncé, rouge orange en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Diervilla rivularis* 'Summer Stars' (*D. r.* 'Morton')** DIERVILLÉE 'SUMMER STARS'

- 2** Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles vert foncé, jaune et rouge en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs jaune citron. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

Diervilla sessilifolia

DIERVILLÉE À FEUILLES SESSILES

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles vert foncé brillant, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune soufre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

***Diervilla sessilifolia* 'Butterfly'**

DIERVILLÉE À FEUILLES SESSILES 'BUTTERFLY'

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles vert foncé brillant, pourpres en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune foncé. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

Diervilla x splendens

DIERVILLÉE SPLENDIDE



Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles vert pourpre, pourpres en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune pâle. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE**SOL | riche | tourbeux | très acide | frais et bien drainé****ARBUSTES*****Kalmia latifolia* 'Elf'**

LAURIER DE MONTAGNES 'ELF'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Kalmia latifolia* 'Minuet'**

LAURIER DE MONTAGNES 'MINUET'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches au cœur pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Kalmia latifolia* 'Heart of Fire'**

LAURIER DE MONTAGNES 'HEART OF FIRE'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, pourpres en automne. Floraison au début de l'été. Boutons rouges. Fleurs roses aux reflets rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Kalmia latifolia* 'Pink Frost'**

LAURIER DE MONTAGNES 'PINK FROST'

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs rose argenté. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE**SOL | pauvre à riche | léger | légèrement alcalin | sec****CONIFÈRES*****Microbiota decussata***

CYPRÈS DE RUSSIE

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 2,50 m. Port bas, étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert tendre, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.



INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | léger | neutre | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Euonymus atropurpureus* (E. latifolius)**

FUSAIN NOIR

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes puis rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé. Fruits rose vif à pourpre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | lourd | légèrement acide | humide

ARBUSTES

Lonicera canadensis

CHÈVREFEUILLE DU CANADA

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | sec

ARBUSTES

Ptelea trifoliata

ORME DE VIRGINIE

2 Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé lustré, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches parfumées. Fruits aromatiques, circulaires, verts puis bruns, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

***Ptelea trifoliata* 'Aurea'**

ORME DE VIRGINIE DORÉ

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune pâle. Feuilles vert jaunâtre, jaunes en automne. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits aromatiques, circulaires, verts puis bruns, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé****ARBUSTES*****Cornus rugosa***

CORNOUILLER RUGUEUX

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert rougeâtre. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleu pâle. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

INDIFFÉRENTE**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | humide****ARBRES*****Acer saccharinum***

ÉRABLE ARGENTÉ

Plante indigène. Zone 2b. H. : 25 m. L. : 23 m. Port arrondi, irrégulier. Branches cassantes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Croissance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Acer saccharinum* 'Borns Graciously' ÉRABLE ARGENTÉ 'BORNS GRACIOUS'**

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 12 m. Port rond. Branches cassantes. Feuillage de texture fine. Feuilles très finement découpées, vertes dessus, argentées en dessous, jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Acer saccharinum* 'Laciniatum Wieri' ÉRABLE ARGENTÉ À FEUILLES LACINIÉES**

Zone 3a. H. : 25 m. L. : 23 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune doré en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Croissance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Acer saccharinum* 'Silver Queen' ÉRABLE ARGENTÉ 'SILVER QUEEN'**

1 Zone 2b. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Branches moins cassantes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes dessus, argentées en dessous, jaune doré en automne. Pas de fructification. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

***Acer saccharinum* 'Skinneri' ÉRABLE ARGENTÉ 'SKINNERI'**

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 13 m. Port érigé à semi-pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles découpées, vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge, peu nombreux. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution.



INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | très acide | très humide

ARBRES

Alnus glutinosa

AULNE EUROPÉEN

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Chatons dorés. Fruits persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Alnus glutinosa* 'Imperialis' (A. g. 'Incisa')**

AULNE EUROPÉEN IMPÉRIAL

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port conique large. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, très découpées. Floraison tôt au printemps. Chatons dorés. Fruits persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

ARBUSTES

***Acanthopanax sieboldianus* (*Eleutherococcus sieboldianus*)**

ACANTHOPANAX DE SIEBOLD

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

Acanthopanax sieboldianus* 'Variegatus' (*E. s. 'Variegatus')

ACANTHOPANAX DE SIEBOLD PANACHÉ

2 Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant bordées de blanc crème. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

Rhodotypos scandens

RHODOTYPOS À PERLES NOIRES

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison au début de l'été. Fleurs blanches. Fruits noir luisant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante toxique.

PLANTES GRIMPANTES

Parthenocissus tricuspidata

LIERRE DE BOSTON

3 Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale rouge. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

***Parthenocissus tricuspidata* 'Atropurpurea'**

LIERRE DE BOSTON POURPRE

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge pourpre. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale pourpre. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

***Parthenocissus tricuspidata* 'Green Showers' (*P. t.* 'Green Spring')**

LIERRE DE BOSTON 'GREEN SHOWERS'

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale rouge foncé. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

***Parthenocissus tricuspidata* 'Veitchii'**

LIERRE DE BOSTON 'VEITCHII'

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Petites feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale rouge pourpré. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

INDIFFÉRENTE

SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | sec à très humide

ARBRES

Ulmus pumila

ORME CHINOIS


Zone 3b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ulmus pumila* 'Park Royal'**

ORME DE SIBÉRIE 'PARK ROYAL'

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

CARTE DES ZONES DE RUSTICITÉ



© Sa Majesté la reine du Chef du Canada. 2004
 Reproduit avec la permission de Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts

Arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers : leurs habitats et leurs niches écologiques

Vous connaissez le nom d'une plante et vous aimeriez avoir des informations sur son habitat ainsi que sur sa niche écologique ? Consultez la liste ci-dessous et rendez-vous à la page indiquée.

A

A

<i>Abies alba</i> 'Pendula'	87, 239	<i>Acer palmatum</i> 'Red Pygmy'	94, 244
<i>Abies balsamea</i>	187, 348	<i>Acer palmatum</i> 'Seiryû'	95, 244
<i>Abies balsamea</i> 'Nana'	187, 348	<i>Acer pensylvanicum</i>	338, 359
<i>Abies balsamea</i> 'Piccolo'	187, 348	<i>Acer platanoides</i>	177, 290
<i>Abies concolor</i>	87, 240	<i>Acer platanoides</i> 'Columnarbroad'	178, 291
<i>Abies concolor</i> 'Compacta'	87, 240	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	177, 290
<i>Abies koreana</i>	126	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	177
<i>Abies koreana</i> 'Aurea'	259	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	178
<i>Abies koreana</i> 'Flava'	259	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	178
<i>Abies koreana</i> 'Prostrate Beauty'	126	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	178
<i>Abies koreana</i> 'Silberlocke'	126	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Lustre'	178, 290
<i>Abies koreana</i> 'Silver Show'	126	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	178, 290
<i>Abies koreana</i> 'Starker's Dwarf'	127	<i>Acer platanoides</i> 'Fairview'	178
<i>Abies lasiocarpa</i> 'Compacta'	100, 246	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	178
<i>Abies lasiocarpa</i> 'Green Globe'	100, 247	<i>Acer platanoides</i> 'Parkway'	178, 291
<i>Abies normanniana</i> 'Golden Spreader'	259	<i>Acer platanoides</i> 'Pond'	178, 290
ACANTHOPANAX DE SIEBOLD	379	<i>Acer platanoides</i> 'Prigo'	178
ACANTHOPANAX DE SIEBOLD PANACHÉ	379	<i>Acer platanoides</i> 'Princeton Gold'	178
<i>Acanthopanax sieboldianus</i> 'Variegatus'	379	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	178, 291
<i>Acer campestre</i>	116, 252	<i>Acer platanoides</i> 'Schewdleri'	179, 345
<i>Acer x freemanii</i> 'Autumn Blaze'	134	<i>Acer platanoides</i> 'Superform'	179, 291
<i>Acer x freemanii</i> 'Autumn Fantasy'	134	<i>Acer rubrum</i>	171
<i>Acer ginnala</i>	367	<i>Acer rubrum</i> 'Armstrong'	171
<i>Acer ginnala</i> 'Bailey Compact'	367	<i>Acer rubrum</i> 'Autumn Flame'	171
<i>Acer ginnala</i> 'Compactum'	367	<i>Acer rubrum</i> 'Bowhall'	171
<i>Acer ginnala</i> 'Flame'	367	<i>Acer rubrum</i> 'Franksred'	172
<i>Acer negundo</i>	196, 300	<i>Acer rubrum</i> 'Morgan'	172
<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	141, 332	<i>Acer rubrum</i> 'Northwood'	172
<i>Acer negundo</i> 'Kelly's Gold'	141, 332	<i>Acer rubrum</i> 'October Glory'	172
<i>Acer negundo</i> 'Sensation'	196, 301	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	172
<i>Acer negundo</i> 'Variegatum'	141, 333	<i>Acer rubrum</i> 'Scanlon'	172
<i>Acer nigrum</i>	141, 270	<i>Acer saccharinum</i>	378
<i>Acer palmatum</i>	94, 242	<i>Acer saccharinum</i> 'Borns Gracious'	378
<i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum'	94, 243	<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri'	378
<i>Acer palmatum</i> 'Bloodgood'	94, 243	<i>Acer saccharinum</i> 'Silver Queen'	378
<i>Acer palmatum</i> 'Crimson Queen'	94, 243	<i>Acer saccharinum</i> 'Skinneri'	378
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum'	94, 243	<i>Acer saccharum</i>	165, 284
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Garnet'	94, 243	<i>Acer saccharum</i> 'Green Mountain'	165, 284
<i>Acer palmatum</i> 'Inabashidare'	94, 243	<i>Acer saccharum</i> 'Temple's Upright'	284
<i>Acer palmatum</i> 'Red Dragon'	94, 243	<i>Acer saccharum</i> 'Monumentale'	165, 284
		<i>Acer spicatum</i>	320
		<i>Acer tataricum</i>	120, 255
		<i>Actinidia arguta</i>	171, 342

<i>Actinidia arguta</i> 'Issai'	171, 342	ANDROMÈDE DU JAPON 'SHOJO'	264, 325
<i>Actinidia kolomikta</i>	171, 342	ANDROMÈDE GLAUQUE	43, 309
<i>Actinidia kolomikta</i> 'Arctic Beauty'	171, 342	ANDROMÈDE NAINE	43
<i>Aesculus x carnea</i> 'Briottii'	179, 291	<i>Apios americana</i>	366
<i>Aesculus glabra</i>	165	APIOS D'AMÉRIQUE	366
<i>Aesculus hippocastanum</i>	181, 292	<i>Aralia elata</i>	146, 271
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	181, 292	ARALIE DU JAPON	146, 271
<i>Ailanthus altissima</i>	54	ARBRE À PERRUQUE	55
AIRELLE À FEUILLES ÉTROITES	309	ARBRE À PERRUQUE D'AMÉRIQUE	38
AIRELLE ROUGE	310	ARBRE À PERRUQUE 'GOLDEN SPIRIT'	55, 224
AIRELLE ROUGE 'KORALLE'	310	ARBRE À PERRUQUE 'GRACE'	55
AIRELLE ROUGE NAINE	310	ARBRE À PERRUQUE 'NORDINE'	55
AIRELLE ROUGE 'RED PEARL'	310	ARBRE À PERRUQUE POURPRE	55
ALISIER	375	ARBRE À PERRUQUE ROUGE	55
ALISIER DE SUÈDE	72, 229	ARBRE À PERRUQUE 'ROYAL PURPLE'	55
<i>Alnus crispa</i>	195	ARBRE À PERRUQUE 'VELVET CLOAK'	56
<i>Alnus glutinosa</i>	379	ARBRE À PERRUQUE 'YOUNG LADY'	56
<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'	379	ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT	169, 339
<i>Alnus glutinosa</i> 'Incisa'	379	ARBRE AUX PAPILLONS 'BLACK KNIGHT'	47
<i>Alnus rugosa</i>	174	ARBRE AUX PAPILLONS 'BORDER BEAUTY'	48
AMANDIER 'FIRE HILL'	57, 224	ARBRE AUX PAPILLONS 'CHARMING'	48
AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS	168, 339	ARBRE AUX PAPILLONS 'EMPIRE BLUE'	48
AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'AUTUMN BRILLIANCE'	168, 339	ARBRE AUX PAPILLONS 'ÎLE DE FRANCE'	48
AMÉLANCHIER À GRANDES FLEURS 'PRINCESS DIANA'	168, 339	ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO'	48
<i>Amelanchier alnifolia</i>	167, 285	ARBRE AUX PAPILLONS 'ORCHID BEAUTY'	48
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Honeywood'	168, 285	ARBRE AUX PAPILLONS 'PINK DELIGHT'	48
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Smoky'	168, 285	ARBRE AUX PAPILLONS 'ROYAL RED'	48
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Smoky'	168, 285	ARBRE AUX PAPILLONS 'WHITE BALL'	48
<i>Amelanchier canadensis</i>	200, 354	ARBRE AUX PAPILLONS 'WHITE PROFUSION'	49
<i>Amelanchier canadensis</i> 'Ballerina'	200, 354	ARBRE AUX POIVRES	64
AMÉLANCHIER DE SASKATOON	167, 285	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS	195
AMÉLANCHIER DE SASKATOON 'HONEYWOOD'	168, 285	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'CHI CHI'	195
AMÉLANCHIER DE SASKATOON 'SMOKY'	168, 285	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'MARKEN'	195
AMÉLANCHIER DU CANADA	200, 354	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS PLEUREUR	195
AMÉLANCHIER DU CANADA 'BALLERINA'	200, 354	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'PRINCETON SENTRY'	195
AMÉLANCHIER GLABRE	95, 319	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'TUBIFORMIS'	196
<i>Amelanchier x grandiflora</i>	168, 339	ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 'UMBRELLA'	196
<i>Amelanchier x grandiflora</i> 'Autumn Brilliance'	168, 339	ARBRE DE KATSURA	183, 293
<i>Amelanchier x grandiflora</i> 'Princess Diana'	168, 339	ARBRE DE KATSURA PLEUREUR	183, 293
<i>Amelanchier laevis</i>	95, 319	ARBRE DE NEIGE	172, 287
<i>Amelanchier lamarkii</i>	168	ARBRE DE POMPADOUR	146, 271
AMORPHA BLANCHÂTRE	28	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	361
<i>Amorpha canescens</i>	28	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Massachusetts'	361
<i>Amorpha fruticosa</i>	60	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Point Reyes'	361
<i>Amorpha pubescens</i>	60	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Vancouver Jade'	361
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> 'Elegans'	89, 317	ARGOUSIER FAUX-NERPRUN	57
AMPÉLOPSIS ÉLÉGANT	89, 317	ARGOUSIER FAUX-NERPRUN 'LEIKORA'	57
<i>Andromeda glaucophylla</i>	43, 309	ARGOUSIER FAUX-NERPRUN 'POLLMIX'	57
<i>Andromeda polifolia</i>	43, 309	ARISTOLOCHE	151, 336
<i>Andromeda polifolia</i> 'Blue Ice'	43, 310	<i>Aristolochia durior</i>	151, 336
<i>Andromeda polifolia</i> 'Nana'	43, 310	<i>Aristolochia macrophylla</i>	151, 336
ANDROMÈDE	43, 309	<i>Aristolochia siph</i>	151, 336
ANDROMÈDE 'BLUE ICE'	43, 310	<i>Aronia arbutifolia</i>	204, 354
ANDROMÈDE DU JAPON 'CAVATINE'	264, 324	<i>Aronia arbutifolia</i> 'Brilliant'	205, 354
ANDROMÈDE DU JAPON 'MOUNTAIN FIRE'	264, 324	<i>Aronia arbutifolia</i> 'Brilliantissima'	205, 354
ANDROMÈDE DU JAPON 'NOCTURNE'	264, 324	<i>Aronia melanocarpa</i>	42, 221
ANDROMÈDE DU JAPON PANACHÉE	131, 325	<i>Aronia melanocarpa</i> 'Autumn Magic'	42, 221
ANDROMÈDE DU JAPON 'PRELUDE'	264, 325	<i>Aronia melanocarpa</i> 'Iroquois Beauty'	42, 221
		<i>Aronia melanocarpa</i> 'Morton'	42, 221

<i>Aronia melanocarpa</i> 'Viking'	42, 221	<i>Betula albo-sinensis</i>	92, 318
<i>Aronia nigra</i>	42, 221	<i>Betula alleghaniensis</i>	181, 346
ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER	204, 354	<i>Betula glandulosa</i>	43, 310
ARONIE À FEUILLES D'ARBOUSIER 'BRILLIANT'	205, 354	<i>Betula lenta</i>	175, 343
ARONIE NOIRE	42, 221	<i>Betula nana</i>	43
ARONIE NOIRE 'AUTUMN MAGIC'	42, 221	<i>Betula nigra</i>	118, 253
ARONIE NOIRE 'IROQUOIS BEAUTY'	42, 221	<i>Betula nigra</i> 'Fox Valley'	118, 254
ARONIE NOIRE 'VIKING'	42, 221	<i>Betula nigra</i> 'Heritage'	118, 253
AUBÉPINE ANGLAISE 'CRIMSON CLOUD'	179, 291	<i>Betula nigra</i> 'Little King'	118, 254
AUBÉPINE DE WASHINGTON	210	<i>Betula papyrifera</i>	35
AUBÉPINE ERGOT DE COQ	127	<i>Betula pendula</i>	34
AUBÉPINE ERGOT DE COQ SANS ÉPINES	127	<i>Betula pendula</i> 'Crimson Frost'	34
AUBÉPINE NAINE	73, 316	<i>Betula pendula</i> 'Gracilis'	34
AUBÉPINE 'SNOWBIRD'	203	<i>Betula pendula</i> 'Laciniata'	34
AUBÉPINE 'WINTER KING'	204	<i>Betula pendula</i> 'Purpurea'	34
AULNE CRISPÉ	195	<i>Betula pendula</i> 'Royal Frost'	34
AULNE EUROPÉEN	379	<i>Betula pendula</i> 'Trost's Dwarf'	35
AULNE EUROPÉEN IMPÉRIAL	379	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	34
AULNE RUGUEUX	174	<i>Betula platyphylla japonica</i>	35
AZALÉE 'GOLDEN LIGHTS'	191, 348	<i>Betula platyphylla japonica</i> 'Whitespire'	35
AZALÉE 'LEMON LIGHTS'	191, 348	<i>Betula populifolia</i>	30
AZALÉE 'MANDARIN LIGHTS'	191, 349	<i>Betula utilis jacquemontii</i>	92, 242
AZALÉE 'NORTHERN HI-LIGHTS'	191, 349	<i>Betula verrucosa</i>	34
AZALÉE 'NORTHERN LIGHTS'	191, 349	BLEUET	42, 309
AZALÉE 'ORCHID LIGHTS'	192, 349	BLEUET EN CORYMBES	113, 321
AZALÉE 'PINK AND SWEET'	192, 349	BOIS JOLI	346
AZALÉE 'PINK LIGHTS'	192, 349	BOIS JOLI À FLEURS BLANCHES	347
AZALÉE 'POPSICLE'	192, 350	BOIS JOLI À FLEURS ROUGES	347
AZALÉE 'ROSY LIGHTS'	192, 350	BOULEAU À FEUILLES DE PEUPLIER	30
AZALÉE ROYALE	298, 350	BOULEAU À PAPIER	35
AZALÉE 'SPICY LIGHTS'	192, 350	BOULEAU BLANC DE CHINE	92, 318
AZALÉE 'TRI-LIGHTS'	192, 350	BOULEAU DE JACQUEMONT	92, 242
AZALÉE 'WESTERN LIGHTS'	192, 350	BOULEAU DU JAPON	35
AZALÉE 'WESTON'S INNOCENCE'	192, 350	BOULEAU DU JAPON 'WHITESPIRE'	35
AZALÉE 'WESTON'S LOLLIPOP'	193, 350	BOULEAU EUROPÉEN	34
AZALÉE 'WHITE LIGHTS'	193, 350	BOULEAU EUROPÉEN À FEUILLES LACINIÉES	34
		BOULEAU EUROPÉEN À FEUILLES POURPRES	34
		BOULEAU EUROPÉEN 'CRIMSON FROST'	34
		BOULEAU EUROPÉEN 'ROYAL FROST'	34
		BOULEAU EUROPÉEN PLEUREUR	34
		BOULEAU FLEXIBLE	175, 343
		BOULEAU GLANDULEUX	43, 310
		BOULEAU JAUNE	181, 346
		BOULEAU NAIN	43
		BOULEAU NAIN À FEUILLES DÉCOUPÉES	35
		BOULEAU NOIR	118, 253
		BOULEAU NOIR 'FOX VALLEY'	118, 254
		BOULEAU NOIR 'HERITAGE'	118, 253
		BOURDAINE À FEUILLES DÉCOUPÉES	118, 254
		BOURREAU DES ARBRES	112, 250
		BOURREAU DES ARBRES 'DIANA'	112, 250
		BOURREAU DES ARBRES 'HERCULES'	112, 250
		BRUYÈRE COMMUNE 'ALBA ERECTA'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'ALLEGRO'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'BOSKOOP'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'CUPREA'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'FIREFLY'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'DARKNESS'	36, 217
		BRUYÈRE COMMUNE 'H.E. BEALE'	37, 218
		BRUYÈRE COMMUNE 'J.H. HAMILTON'	37, 218

B

BAGUENAUDIER COMMUN	193		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea Nana'	257		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Bailgreen'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Bailone'	125		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Cherry Bomb'	124, 257		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Concorde'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Emerald Carrousel'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Gentry'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Nugget'	258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Ida'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Jade Carrousel'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Monlers'	258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Monomb'	124, 257		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Monry'	259		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Royal Burgundy'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Royal Cloak'	124, 258		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Ruby Carrousel'	125		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Sunsation'	259		
<i>Berberis thunbergii</i> 'Tara'	124, 258		
<i>Betula alba</i>	34		

BRUYÈRE COMMUNE 'MARLEEN'	37, 218	<i>Calluna vulgaris</i> 'Firefly'	36, 217
BRUYÈRE COMMUNE 'MULTICOLOR'	37, 218	<i>Calluna vulgaris</i> 'H.E. Beale'	37, 218
BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING CREAM'	37, 218	<i>Calluna vulgaris</i> 'J.H. Hamilton'	37, 218
BRUYÈRE COMMUNE 'SPRING TORCH'	37, 218	<i>Calluna vulgaris</i> 'Marleen'	37, 218
BRUYÈRE COMMUNE 'TIB'	37, 218	<i>Calluna vulgaris</i> 'Multicolor'	37, 218
BRUYÈRE D'HIVER 'DECEMBER RED'	308	<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Cream'	37, 218
BRUYÈRE D'HIVER 'PINK SPANGLES'	308	<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Torch'	37, 218
BRUYÈRE D'HIVER 'PORTERS RED'	308	<i>Calluna vulgaris</i> 'Tib'	37, 218
BRUYÈRE D'HIVER 'SPRINGWOOD PINK'	308	CALYCANTHE FERTILE	137,269
BRUYÈRE D'HIVER 'SPRINGWOOD WHITE'	308	<i>Calycanthus fertilis</i>	137, 269
BRUYÈRE D'HIVER 'VIVELLI'	308	<i>Calycanthus floridus</i>	146, 271
BUDDLEIA À FEUILLES ALTERNES	47	CAMARINE NOIRE	307
Buddleia alternifolia	47	CAMÉRISIER BLEU	67
Buddleia davidii	47	<i>Campsis radicans</i>	203
Buddleia davidii 'Black Knight'	47	<i>Campsis radicans</i> 'Flamenco'	203
Buddleia davidii 'Border Beauty'	48	<i>Campsis radicans</i> 'Flava'	203
Buddleia davidii 'Charming'	48	<i>Campsis radicans</i> 'Indian Summer'	203
Buddleia davidii 'Empire Blue'	48	<i>Campsis</i> x <i>tagliabuana</i> 'Madame Galen'	203
Buddleia davidii 'Île de France'	48	CANNEBERGE	44
Buddleia davidii 'Orchid Beauty'	48	CARAGANA À ÉPINES ROUGES	55, 224
Buddleia davidii 'Pink Delight'	48	CARAGANA À FLEURS ROUGES	194
Buddleia davidii 'Royal Red'	48	<i>Caragana arborescens</i>	194
Buddleia davidii série 'Nanho'	48	<i>Caragana arborescens</i> 'Lorbergii'	194
Buddleia davidii 'White Ball'	48	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	193
Buddleia davidii 'White Profusion'	49	<i>Caragana arborescens</i> 'Spring Gold'	194
BUDDLEIA 'HONEYCOMB'	49	<i>Caragana arborescens</i> 'Walker'	194
Buddleia x weyeriana 'Honeycomb'	49	<i>Caragana aurantiaca</i>	133, 268
BUIS DE CORÉE 'GREEN BEAUTY'	369	CARAGANA DE LORBERG	194
BUIS DE CORÉE 'PINCHUSION'	370	CARAGANA DE ROBOROVSKY	29
BUIS DE CORÉE 'WINTER BEAUTY'	370	CARAGANA FRUTESCENT GLOBE	194
BUIS DE CORÉE 'WINTER GEM'	370	<i>Caragana frutex</i> 'Globosa'	194
BUIS HYBRIDE 'CHICAGOLAND GREEN'	363	CARAGANA NAIN	194
BUIS HYBRIDE 'GREEN GEM'	363	CARAGANA ORANGÉ	133, 268
BUIS HYBRIDE 'GREEN MOUND'	363	<i>Caragana pygmaea</i>	194
BUIS HYBRIDE 'GREEN MOUNTAIN'	363	<i>Caragana roborovskiy</i>	29
BUIS HYBRIDE 'GREEN VELVET'	363	<i>Caragana rosea</i>	194
BUIS HYBRIDE 'MEDAD'	369	CARAGANA 'SPRING GOLD'	194
BUISSON ARDENT 'YUKON BELLE'	120, 255	<i>Caragana tragacanthoides</i>	55, 224
Buxus x 'Chicagoland Green'	363	CARAGANA 'WALKER'	194
Buxus x 'Clipped One'	363	<i>Carpinus americana</i>	374
Buxus x 'Glencoe'	363	<i>Carpinus caroliniana</i>	374
Buxus x 'Green Gem'	363	<i>Carya cordiformis</i>	92, 242
Buxus x 'Green Mound'	363	<i>Carya glabra</i>	165, 338
Buxus x 'Green Mountain'	363	<i>Carya ovata</i>	165, 338
Buxus x 'Green Velvet'	363	CARYER À NOIX DOUCES	165, 338
Buxus x 'Medad'	369	CARYER CORDIFORME	92, 242
Buxus microphylla koreana 'Green Beauty'	369	CARYER GLABRE	165, 338
Buxus sinica insularis 'Green Beauty'	369	CARYOPTÉRIS 'ARTHUR SIMMONDS'	44
Buxus sinica insularis 'Pinchusion'	370	CARYOPTÉRIS 'BLUE MIST'	45
Buxus sinica insularis 'Winter Beauty'	370	<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i>	44
Buxus sinica insularis 'Winter Gem'	370	<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i>	44
		'Arthur Simmonds'	44
		<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i> 'Blue Mist'	45
		<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i> 'Dark Night'	45
		<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i> 'Kew Blue'	45
		<i>Caryopteris</i> x <i>clandonensis</i> 'Worcester Gold'	45
		CARYOPTÉRIS 'DARK NIGHT'	45
		CARYOPTÉRIS 'KEW BLUE'	45
		CARYOPTÉRIS 'WORCESTER GOLD'	45
		<i>Cassandra calyculata</i>	193
Callicarpa bodinieri giralddii 'Profusion'	72, 230		
CALLICARPA DE GIRALD 'PROFUSION'	72, 230		
Calluna vulgaris 'Alba Erecta'	26, 217		
Calluna vulgaris 'Allegro'	26, 217		
Calluna vulgaris 'Boskoop'	26, 217		
Calluna vulgaris 'Cuprea'	26, 217		
Calluna vulgaris 'Darkness'	26, 217		

CASSANDRE CALICULÉ	193	CERISIER TOMENTEUX	75, 316
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	134	<i>Chaenomeles japonica</i>	168
CATALPA DE L'OUEST	134	<i>Chaenomeles japonica</i> 'Sargentii'	168
CATALPA PARASOL	134	<i>Chaenomeles speciosa</i>	95, 244
<i>Catalpa speciosa</i>	134	<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Geisha Girl'	95, 244
CÈDRE DU CANADA	127, 259	<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Rubra'	95, 244
CÈDRE DU CANADA 'BOISBRIAND'	127, 259	<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Toyo-Nishiki'	95, 244
CÈDRE DU CANADA 'BRABANT'	128, 323	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Crimson and Gold'	96
CÈDRE DU CANADA 'CAESPITOSA'	128, 260	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Fire Dance'	96
CÈDRE DU CANADA 'DANICA'	128, 260	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Knap Hill Scarlet'	96
CÈDRE DU CANADA 'DART'S GOLD'	128, 260	CHALEF ARGENTÉ	56
CÈDRE DU CANADA 'DEGROOT'S SPIRE'	128, 260	CHALEF 'QUICKSILVER'	56
CÈDRE DU CANADA DORÉ	129, 261	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Aurea'	247
CÈDRE DU CANADA EN BOULE	131, 263	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Glaucua'	100, 247
CÈDRE DU CANADA 'EUROPE GOLD'	128, 260	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Jubilee'	100, 247
CÈDRE DU CANADA FILIFORME	128, 260	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Lutea'	247
CÈDRE DU CANADA 'GOLDEN GLOBE'	128, 260	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Oregon Blue'	100, 247
CÈDRE DU CANADA 'GOLDEN TUFFET'	260	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula'	100, 247
CÈDRE DU CANADA 'HETZ MIDGET'	128, 260	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	
CÈDRE DU CANADA 'HOLMSTRUP'	129, 261	'Strict Weeping'	100, 247
CÈDRE DU CANADA 'LITTLE GIANT'	129, 261	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Aurea Nana'	248
CÈDRE DU CANADA NOIR	129, 261	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Blue Feathers'	101, 248
CÈDRE DU CANADA PLEUREUR	129, 261	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Crippsii'	248
CÈDRE DU CANADA PYRAMIDAL	129, 261	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Fernspray Gold'	101, 248
CÈDRE DU CANADA 'RHEINGOLD'	262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Filicoides'	101, 248
CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD FROST'	129, 262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kosteri'	101, 248
CÈDRE DU CANADA 'SHERWOOD MOSS'	129, 262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana'	101, 248
CÈDRE DU CANADA 'SMARAGD'	130, 262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Aurea'	248
CÈDRE DU CANADA 'SNOWTIP'	130, 262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Gracilis'	101, 248
CÈDRE DU CANADA 'SPIRALIS'	130, 262	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Saffron Spray'	248
CÈDRE DU CANADA 'SUNKIST'	262	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard'	187, 295
CÈDRE DU CANADA 'TECHNY'	130, 262	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Compacta'	187, 295
CÈDRE DU CANADA 'TEDDY'	130, 262	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Curly Tops'	187, 295
CÈDRE DU CANADA 'TINY TIM'	130, 263	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'	188, 295
CÈDRE DU CANADA 'UNICORN'	130, 263	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea'	295
CÈDRE DU CANADA 'WANSDYKE SILVER'	130, 263	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea Nana'	295
CÈDRE DU CANADA 'WAREANA'	131, 263	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	
CÈDRE DU CANADA 'WAREANA LUTESCENS'	130, 263	'Filifera Golden Charm'	188, 296
CÈDRE DU CANADA 'YELLOW RIBBON'	131, 264	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera	
<i>Celastrus orbiculatus</i> 'Diana'	112, 250	Golden Mops'	296
<i>Celastrus orbiculatus</i> 'Hercules'	112, 250	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana'	188, 296
<i>Celastrus scandens</i>	112, 250	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Sungold'	297
<i>Celtis occidentalis</i>	141, 270	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Gold Dust'	188, 296
CÉPHALANTHE OCCIDENTAL	202	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Golden Mops'	296
<i>Cephalanthus occidentalis</i>	202	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Golden Pincushion'	188, 296
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	183, 293	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Gold Mop'	296
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Pendulum'	183, 293	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Lemon Thread'	296
<i>Cercis canadensis</i>	71, 315	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Mops'	296
<i>Cercis canadensis</i> 'Covey'	71, 315	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea'	188, 296
<i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'	71, 315	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Snow'	296
<i>Cercis canadensis</i> 'Lavender Twist'	71, 315	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	
CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN	201, 301	'Squarrosa Intermedia'	188, 297
CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN 'COLORATA'	201, 301	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	
CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN HÂTIF	201, 302	'Squarrosa Lombarts'	188, 297
CERISIER À GRAPPES EUROPÉEN 'SKINNER'S RED'	201	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold'	297
CERISIER DE L'AMOUR	179, 346	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Tzukumo'	188, 297
CERISIER DE SARGENT	136	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Vintage Gold'	189, 297
CERISIER DE SARGENT 'RANCHO'	136	<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Andelyensis'	69
CERISIER DÉPRIMÉ	63	<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Blue Sport'	69
CERISIER TARDIF	93		

<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Ericoides'	69	<i>Clematis</i> x 'Carnaby'	151, 337
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Glauca Pendula'	69	<i>Clematis</i> x 'Comtesse de Bouchaud'	151, 276
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Heatherbun'	69	<i>Clematis</i> x 'Crimson King'	152, 276
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Meth Dwarf'	69	<i>Clematis</i> x 'Doctor Ruppel'	152, 276
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Red Star'	70	<i>Clematis</i> x 'Duchess of Edinburgh'	152, 276
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Rubicon'	70	<i>Clematis</i> x ' <i>durandii</i> '	152, 276
<i>Chamaecytisus purpureus</i>	96, 244	<i>Clematis</i> x 'Elsa Späth'	152, 276
<i>Chamaedaphne calyculata</i>	193	<i>Clematis</i> x 'Ernest Markham'	152, 276
CHARME DE CAROLINE	374	<i>Clematis</i> x 'Evithree'	151, 275
CHÈNE À GROS FRUITS	176	<i>Clematis</i> x 'Fair Rosamond'	152, 276
CHÈNE BICOLORE	163, 271	<i>Clematis</i> x 'Fireworks'	152, 277
CHÈNE BLANC	167, 285	<i>Clematis florida</i> 'Sieboldii'	82
CHÈNE DES MARAIS	186	<i>Clematis florida sieboldiana</i>	82
CHÈNE ÉCARLATE	41	<i>Clematis</i> x 'General Sikorski'	152, 277
CHÈNE ÉCARLATE 'SPLENDENS'	42	<i>Clematis</i> x 'Gipsy Queen'	152, 277
CHÈNE PÉDONCULÉ	167	<i>Clematis</i> x 'Guernsey Cream'	277, 337
CHÈNE PÉDONCULÉ 'CRIMSON SPIRE'	167	<i>Clematis</i> x 'Hagley Hybrid'	153, 277
CHÈNE PÉDONCULÉ 'FASTIGIATA'	167	<i>Clematis</i> x 'Haku-ōkan'	153, 277
CHÈNE PÉDONCULÉ TORTUEUX	167	<i>Clematis</i> x 'Henryi'	153, 277
CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE	189, 297	<i>Clematis</i> x 'H.F. Young'	153, 278
CHÈVREFEUILLE 'ABBOTSFORD'	198	<i>Clematis</i> x 'Huldine'	153, 278
CHÈVREFEUILLE À INVOLUCRE	131, 324	<i>Clematis</i> x 'Hybrida Sieboldii'	156, 280
CHÈVREFEUILLE 'BLUE VELVET'	198	<i>Clematis</i> x 'Jackmanii'	153, 278
CHÈVREFEUILLE DE MORROW	206, 355	<i>Clematis</i> x 'Jackmanii Superba'	153, 278
CHÈVREFEUILLE DE SAKHALINE	85, 239	<i>Clematis</i> x 'John Huxtable'	153, 278
CHÈVREFEUILLE DE ZABEL	198	<i>Clematis</i> x 'John Warren'	153, 278
CHÈVREFEUILLE DIOÏQUE	364	<i>Clematis</i> x ' <i>jouiniana</i> 'Mrs Robert Brydon'	83, 316
CHÈVREFEUILLE 'DROPMORE SCARLET'	158, 282	<i>Clematis</i> x 'Kakio'	155, 280
CHÈVREFEUILLE DU CANADA	377	<i>Clematis</i> x 'Kardymal Wyszynski'	154, 278
CHÈVREFEUILLE DU JAPON 'AUREORETICULATA'	90	<i>Clematis</i> x 'Ken Donson'	154, 278
CHÈVREFEUILLE DU JAPON 'HALLIANA'	90	<i>Clematis</i> x 'Lady Betty Balfour'	154, 278
CHÈVREFEUILLE 'GOLD FLAME'	158, 338	<i>Clematis macropetala</i> 'Blue Bird'	154, 337
CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'BELGICA SELECT'	90	<i>Clematis macropetala</i> 'Blue Lagoon'	154, 337
CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'HARLEQUIN'	90	<i>Clematis macropetala</i> 'Jan Lindmark'	154, 337
CHÈVREFEUILLE GRIMPANT 'SEROTINA'	90	<i>Clematis macropetala</i> 'Lagoon'	154, 337
CHÈVREFEUILLE 'HONEY BABY'	197, 301	<i>Clematis macropetala</i> 'Maidwell Hall'	154, 338
CHÈVREFEUILLE 'HONEY ROSE'	198	<i>Clematis macropetala</i> 'Markham's Pink'	154, 338
CHÈVREFEUILLE 'MANDARIN'	90, 242	<i>Clematis</i> x 'Madame Baron Veillard'	154, 278
CHÈVREFEUILLE 'MARBLE KING'	301, 353	<i>Clematis</i> x 'Madame Grangé'	154, 279
CHÈVREFEUILLE 'MINI GLOBE'	201	<i>Clematis</i> x 'Madame Julia Correvon'	155, 279
CHÈVREFEUILLE NAIN	75	<i>Clematis</i> x 'Madame Le Coultre'	155, 279
CHÈVREFEUILLE NAIN DE CLAVEY	201	<i>Clematis</i> x 'Marie Boisselot'	155, 279
CHÈVREFEUILLE TELLMANNIANA	66, 314	<i>Clematis maximowicziana</i>	338, 359
CHICOT DU CANADA	143	<i>Clematis</i> x 'Miss Bateman'	155, 279
<i>Chionanthus virginicus</i>	172, 287	<i>Clematis montana</i> 'Odorata'	371
CIRIER DE PENNSYLVANIE	35, 307	<i>Clematis</i> x 'Mrs Cholmondeley'	155, 279
<i>Clematis akebioides</i>	82	<i>Clematis</i> x 'Mrs. N. Thompson'	155, 279
<i>Clematis alpina</i> 'Helsingborg'	82, 322	<i>Clematis</i> x 'Multi Blue'	155, 279
<i>Clematis alpina</i> 'Pamela Jackman'	82, 322	<i>Clematis</i> x 'Nelly Moser'	279, 337
<i>Clematis alpina</i> 'Rosy O'Grady'	82, 322	<i>Clematis</i> x 'Niobe'	155, 280
<i>Clematis alpina</i> 'Ruby'	82, 321	<i>Clematis paniculata</i>	338, 359
<i>Clematis alpina</i> 'Willy'	82, 322	<i>Clematis</i> x 'Pink Champagne'	155, 280
<i>Clematis</i> x 'Anna Louise'	151, 275	<i>Clematis</i> x 'Pink Chiffon'	153, 277
<i>Clematis</i> x 'Arabella'	151, 275	<i>Clematis</i> x 'Pink Fantasy'	156, 280
<i>Clematis</i> x 'Barbara Jackman'	151, 275	<i>Clematis</i> x 'Poulvo'	157, 281
<i>Clematis</i> x 'Bees Jubilee'	151, 275	<i>Clematis</i> x 'Proteus'	156, 280
<i>Clematis</i> x 'Belle of Woking'	151, 276	<i>Clematis</i> x 'Ramona'	156, 280
<i>Clematis</i> x 'Bicolor'	82	<i>Clematis</i> x 'Rouge Cardinal'	156, 280
<i>Clematis</i> x 'Blue Light'	151, 276	<i>Clematis</i> x 'Royalty'	156, 281
<i>Clematis</i> x 'Blue Ravine'	151, 276	<i>Clematis</i> x 'Ruby Glow'	156, 281

<i>Clematis</i> x 'Serenata'	156, 281	CLÉMATITE 'FIREWORKS'	152, 277
<i>Clematis</i> x 'Star of India'	156, 281	CLÉMATITE 'GENERAL SIKORSKI'	152, 277
<i>Clematis</i> x 'Sunset'	156, 281	CLÉMATITE 'GIPSY QUEEN'	152, 277
<i>Clematis tangutica</i>	316	CLÉMATITE 'GUERNSEY CREAM'	277, 337
<i>Clematis tangutica</i> 'Aureolin'	82, 316	CLÉMATITE 'HAGLEY HYBRID'	153, 277
<i>Clematis tangutica</i> 'Elios'	82, 317	CLÉMATITE 'HAKU-ÖKAN'	153, 277
<i>Clematis tangutica</i> 'Engelina'	83, 317	CLÉMATITE 'HENRY'	153, 277
<i>Clematis tangutica</i> 'Golden Tiara'	82, 317	CLÉMATITE 'H.F. YOUNG'	153, 278
<i>Clematis tangutica</i> 'Kugotia'	82, 317	CLÉMATITE 'HULDINE'	153, 278
<i>Clematis tangutica</i> 'My Angel'	83, 317	CLÉMATITE 'JACKMANI'	153, 278
<i>Clematis tangutica</i> 'Radar Love'	83, 317	CLÉMATITE 'JACKMANI SUPERBA'	153, 278
<i>Clematis terniflora</i>	338, 359	CLÉMATITE 'JAN LINDMARK'	154, 337
<i>Clematis texensis</i> 'Duchess of Albany'	338	CLÉMATITE 'JOHN HUXTABLE'	153, 278
<i>Clematis</i> x 'The President'	156, 281	CLÉMATITE 'JOHN WARREN'	153, 278
<i>Clematis</i> x 'Victoria'	157, 281	CLÉMATITE 'KARDYNAL WYSZYNSKI'	154, 278
<i>Clematis</i> x 'Ville de Lyon'	157, 281	CLÉMATITE 'KEN DONSON'	154, 278
<i>Clematis</i> x 'Vino'	157, 281	CLÉMATITE 'LADY BETTY BALFOUR'	154, 278
<i>Clematis</i> x 'Violet Elizabeth'	157, 281	CLÉMATITE 'LAGOON'	154, 337
<i>Clematis virginiana</i>	112, 320	CLÉMATITE 'MADAME BARON VEILLARD'	154, 278
<i>Clematis viticella</i> 'Abundance'	141	CLÉMATITE 'MADAME JULIA CORREVEON'	155, 279
<i>Clematis viticella</i> 'Blue Belle'	141	CLÉMATITE 'MADAME GRANGE'	155, 279
<i>Clematis viticella</i> 'Étoile Violette'	141	CLÉMATITE 'MAIDWELL HALL'	154, 338
<i>Clematis viticella</i> 'Kermesina'	142	CLÉMATITE 'MARIE BOISSELOT'	155, 279
<i>Clematis viticella</i> 'Minuet'	142	CLÉMATITE 'MARKHAM'S PINK'	154, 338
<i>Clematis viticella</i> 'Polish Spirit'	142	CLÉMATITE 'MISS BATEMAN'	155, 279
<i>Clematis viticella</i> 'Purpurea Plena Elegans'	142	CLÉMATITE 'MRS CHOLMONDELEY'	155, 279
<i>Clematis viticella</i> 'Rubra'	142	CLÉMATITE 'MRS N. THOMPSON'	155, 279
<i>Clematis</i> x 'Vyvyan Pennell'	157, 281	CLÉMATITE 'MRS ROBERT BRYDON'	83, 316
<i>Clematis</i> x 'Warsaw Nike'	157, 282	CLÉMATITE 'MULTI BLUE'	155, 279
<i>Clematis</i> x 'Warsawska Nike'	157, 282	CLÉMATITE 'NELLY MOSER'	279, 337
<i>Clematis</i> x 'Will Goodwin'	157, 282	CLÉMATITE 'NIOBE'	155, 280
<i>Clematis</i> x 'Xerxes'	152	CLÉMATITE 'PINK CHAMPAGNE'	155, 280
CLÉMATITE AKEBIOIDES	82	CLÉMATITE 'PINK FANTASY'	156, 280
CLÉMATITE 'ANNA LOUISE'	151, 275	CLÉMATITE 'PROTEUS'	156, 280
CLÉMATITE 'ARABELLA'	151, 275	CLÉMATITE 'RAMONA'	156, 280
CLÉMATITE 'BARBARA JACKMAN'	151, 275	CLÉMATITE 'ROUGE CARDINAL'	156, 280
CLÉMATITE 'BEES JUBILEE'	151, 275	CLÉMATITE 'ROYALTY'	156, 281
CLÉMATITE 'BELLE OF WOKING'	151, 276	CLÉMATITE 'RUBY GLOW'	156, 281
CLÉMATITE BICOLOR	82	CLÉMATITE 'SERENATA'	156, 281
CLÉMATITE 'BLUE BIRD'	154, 337	CLÉMATITE 'STAR OF INDIA'	156, 281
CLÉMATITE 'BLUE LIGHT'	151, 276	CLÉMATITE 'SUNSET'	156, 281
CLÉMATITE 'BLUE RAVINE'	151, 276	CLÉMATITE TANGUTICA	316
CLÉMATITE 'CARNABY'	151, 337	CLÉMATITE TANGUTICA 'AUREOLIN'	82, 316
CLÉMATITE 'COMTESSE DE BOUCHAUD'	151, 276	CLÉMATITE TANGUTICA 'ELIOS'	82, 317
CLÉMATITE 'CRIMSON KING'	152, 276	CLÉMATITE TANGUTICA 'GOLDEN TIARA'	82, 317
CLÉMATITE D'AUTOMNE	338, 359	CLÉMATITE TANGUTICA 'MY ANGEL'	83, 317
CLÉMATITE DE DURAND	152, 276	CLÉMATITE TANGUTICA 'RADAR LOVE'	83, 317
CLÉMATITE DE VIRGINIE	112, 320	CLÉMATITE 'THE PRESIDENT'	156, 281
CLÉMATITE DES ALPES 'HELSINGBORG'	82, 322	CLÉMATITE 'VICTORIA'	157, 281
CLÉMATITE DES ALPES 'PAMELA JACKMAN'	82, 322	CLÉMATITE 'VILLE DE LYON'	157, 281
CLÉMATITE DES ALPES 'ROSY O'GRADY'	82, 322	CLÉMATITE 'VIOLET ELIZABETH'	157, 281
CLÉMATITE DES ALPES 'RUBY'	82, 321	CLÉMATITE 'VINO'	157, 281
CLÉMATITE DES ALPES 'WILLY'	82, 322	CLÉMATITE VITICELLA 'ABUNDANCE'	141
CLÉMATITE DES MONTAGNES ODORANTE	371	CLÉMATITE VITICELLA 'BLUE BELLE'	141
CLÉMATITE 'DOCTOR RUPPLE'	152, 276	CLÉMATITE VITICELLA 'ÉTOILE VIOLETTE'	141
CLÉMATITE 'DUCHESS OF ALBANY'	338	CLÉMATITE VITICELLA 'KERMESINA'	142
CLÉMATITE 'DUCHESS OF EDINBURGH'	152, 276	CLÉMATITE VITICELLA 'MINUET'	142
CLÉMATITE 'ELSA SPÄTH'	152, 276	CLÉMATITE VITICELLA 'POLISH SPIRIT'	142
CLÉMATITE 'ERNEST MARKHAM'	152, 276	CLÉMATITE VITICELLA 'PURPUREA PLENA ELEGANS'	142
CLÉMATITE 'FAIR ROSAMOND'	152, 276	CLÉMATITE 'VYVYAN PENNELL'	157, 281

CLÉMATITE 'WARSAW NIKE'	157, 282	CORNOUILLER STOLONIFÈRE	172, 287
CLÉMATITE 'WILL GOODWIN'	157, 282	CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'ALLEMANS'	173, 287
Clethra alnifolia	344	CORNOUILLER STOLONIFÈRE À TIGES JAUNES	173, 287
Clethra alnifolia 'Hokie Pink'	344	CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'CARDINAL'	173, 287
Clethra alnifolia 'Hummingbird'	344	CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'SILVER AND GOLD'	173, 287
Clethra alnifolia 'Pink Spire'	344	CORNOUILLER STOLONIFÈRE 'WHITE GOLD'	173, 288
Clethra alnifolia 'Rosea'	344	Cornus alba	211, 355
Clethra alnifolia 'Ruby Spice'	344	Cornus alba 'Argenteomarginata'	212, 356
Clethra alnifolia 'September Beauty'	344	Cornus alba 'Aurea'	211, 355
Clethra alnifolia 'Sixteen Candles'	344	Cornus alba 'Bailhalo'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE	344	Cornus alba 'Bud's Yellow'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'HOKIE PINK'	344	Cornus alba 'Cream Cracker'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'HUMMINGBIRD'	344	Cornus alba 'Elegantissima'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'PINK SPIRES'	344	Cornus alba 'Gouchaultii'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'ROSEA'	344	Cornus alba 'Ivory Halo'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'RUBY SPICE'	344	Cornus alba 'Kesselringii'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'SEPTEMBER BEAUTY'	344	Cornus alba 'Korall'	212, 356
CLÈTHRE À FEUILLES D'AULNE 'SIXTEEN CANDLES'	344	Cornus alba 'Siberian Pearls'	212, 356
COGNASSIER À FLEURS	95, 244	Cornus alba 'Sibirica'	212, 356
COGNASSIER À FLEURS 'GEISHA GIRL'	95, 244	Cornus alba 'Sibirica Variegata'	212, 356
COGNASSIER À FLEURS ROUGES	95, 244	Cornus alba 'Staltouch'	213, 357
COGNASSIER À FLEURS 'TOYO-NISHIKI'	95, 244	Cornus alba 'Touch of Elegance'	213, 357
COGNASSIER DE SARGENT	168	Cornus alba 'Variegata'	213, 357
COGNASSIER DU JAPON	168	Cornus alternifolia	371
COGNASSIER SUPERBE 'CRIMSON AND GOLD'	96	Cornus alternifolia 'Argentea'	168, 285
COGNASSIER SUPERBE 'FIRE DANCE'	96	Cornus alternifolia 'Variegata'	168, 285
COGNASSIER SUPERBE 'KNAP HILL SCARLET'	96	Cornus amomum	169
Colutea arborescens	193	Cornus mas	115, 251
Comptonia peregrina	44	Cornus mas 'Aurea'	115, 251
COMPTONIE VOYAGEUSE	44, 310	Cornus mas 'Variegata'	115, 251
COPALME D'AMÉRIQUE	189	Cornus paniculata	205, 303
CORÈTE DU JAPON	96, 319	Cornus pumila	213, 357
CORÈTE DU JAPON À FLEURS DOUBLES	97, 319	Cornus racemosa	205, 303
CORÈTE DU JAPON 'GOLDEN GUINEA'	96, 319	Cornus rugosa	378
CORÈTE DU JAPON PANACHÉE	97, 319	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	333
CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES	371	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	333
CORNOUILLER À FEUILLES ALTERNES ARGENTÉES	168, 285	Cornus sanguinea 'Winter Flame'	333
CORNOUILLER À GRAPPES	205, 303	Cornus sericea	172, 287
CORNOUILLER ARGENTÉ	212, 356	Cornus sericea 'Allemans'	173, 287
CORNOUILLER BLANC	211, 355	Cornus sericea 'Cardinal'	173, 287
CORNOUILLER BLANC 'BUD'S YELLOW'	212, 356	Cornus sericea 'Flaviramea'	173, 287
CORNOUILLER BLANC 'CREAM CRACKER'	212, 356	Cornus sericea 'Kelseyi'	173, 342
CORNOUILLER BLANC 'IVORY HALO'	212, 356	Cornus sericea 'Silver and Gold'	173, 287
CORNOUILLER BLANC PANACHÉ	213, 357	Cornus sericea 'White Gold'	173, 288
CORNOUILLER BLANC 'SIBERIAN PEARLS'	212, 356	Cornus stolonifera	172, 287
CORNOUILLER BLANC 'TOUCH OF ELEGANCE'	213, 357	Cornus tatarica	211, 355
CORNOUILLER DE GOUCHAULT	212, 356	Corylus americana	84, 239
CORNOUILLER DE KELSEY	173, 342	Corylus avellana	137, 330
CORNOUILLER DE KESSELRING	212, 356	Corylus avellana 'Aurea'	269
CORNOUILLER DE SIBÉRIE	212, 356	Corylus avellana 'Contorta'	137, 330
CORNOUILLER DE SIBÉRIE PANACHÉ	212, 356	Corylus avellana 'Rote Zeller'	137
CORNOUILLER DORÉ	211, 355	Corylus avellana 'Rote Zellernut'	137
CORNOUILLER GRACIEUX	169	Corylus colurna	71, 229
CORNOUILLER MÂLE	115, 251	Corylus colurna 'Te Terra Red'	72, 229
CORNOUILLER MÂLE DORÉ	115, 251	Corylus maxima 'Purpurea'	169
CORNOUILLER MÂLE PANACHÉ	115, 251	Corylus maxima 'Red Filibert'	137
CORNOUILLER NAIN	213, 357	Cotinus americanus	38
CORNOUILLER RUGUEUX	378	Cotinus coggygria	55
CORNOUILLER SANGUIN 'MIDWINTER FIRE'	333	Cotinus coggygria 'Ancot'	55, 224
CORNOUILLER SANGUIN 'WINTER BEAUTY'	333	Cotinus coggygria 'Folius Purpureis'	55

<i>Cotinus coggygia</i> 'Golden Spirit'	55, 224	<i>Daphne x burkwoodii</i> 'Carol Mackie'	334, 359
<i>Cotinus coggygia</i> 'Grace'	55	<i>Daphne x burkwoodii</i> 'Somerset'	334, 359
<i>Cotinus coggygia</i> 'Nordine'	55	DAPHNÉ CANULÉ	51, 222
<i>Cotinus coggygia</i> 'Purpureus'	55	DAPHNÉ CANULÉ 'PYGMAEA ALBA'	52, 222
<i>Cotinus coggygia</i> 'Royal Purple'	55	DAPHNÉ CANULÉ 'RUBY GLOW'	52, 223
<i>Cotinus coggygia</i> 'Rubrifolius'	55	<i>Daphne cneorum</i>	51, 222
<i>Cotinus coggygia</i> 'Velvet Cloak'	56	<i>Daphne cneorum</i> 'Pygmaea Alba'	52, 222
<i>Cotinus coggygia</i> 'Young Lady'	56	<i>Daphne cneorum</i> 'Ruby Glow'	52, 223
<i>Cotinus obovatus</i>	38	DAPHNÉ DE BURKWOOD 'BRIGGS MOONLIGHT'	334
<i>Cotoneaster acutifolius</i>	56, 224	DAPHNÉ DE BURKWOOD 'CAROL MACKIE'	334, 359
<i>Cotoneaster adpressus praecox</i>	56	DAPHNÉ DE BURKWOOD 'SOMERSET'	334, 359
COTONÉASTER APICALE	197	<i>Daphne mezereum</i>	346
COTONÉASTER APICALE 'TOM THUMB'	198	<i>Daphne mezereum</i> 'Alba'	347
<i>Cotoneaster apiculata</i>	197	<i>Daphne mezereum</i> 'Rubra'	347
<i>Cotoneaster apiculata</i> 'Little Gem'	198	DEUTZIA DE LEMOINE COMPACT	137, 270
<i>Cotoneaster apiculata</i> 'Tom Thumb'	198	DEUTZIA GRACILE	146, 271
<i>Cotoneaster dammeri</i>	72, 230	DEUTZIA GRACILE 'NIKKO'	146, 271
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Coral Beauty'	73, 316	<i>Deutzia gracilis</i>	146, 271
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Eicholz'	73, 230	<i>Deutzia gracilis</i> 'Nikko'	146, 271
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Skogholm'	73	<i>Deutzia x lemoinei</i> 'Compacta'	137, 270
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Skogholmen'	73	DEUTZIA 'MAGICIAN'	137, 270
COTONÉASTER DE DAMMER	72, 230	<i>Deutzia x 'Magician'</i>	137, 270
COTONÉASTER DE DAMMER 'CORAL BEAUTY'	73, 316	DEUTZIA 'MONT ROSE'	138, 270
COTONÉASTER DE DAMMER 'EICHOLZ'	73, 230	<i>Deutzia x 'Mont Rose'</i>	138, 270
COTONÉASTER DE DAMMER 'SKOGHOLM'	73	<i>Deutzia x 'Monzia'</i>	138, 270
COTONÉASTER DE PÉKIN	56, 224	DEUTZIA 'PINK MINOR'	138, 270
COTONÉASTER HORIZONTAL	84	<i>Deutzia x 'Pink Minor'</i>	138, 270
COTONÉASTER HORIZONTAL À FEUILLES DE THYM	70	DEUTZIA 'PINK-A-BOO'	138, 270
COTONÉASTER HORIZONTAL DE HESSE	84, 239	<i>Deutzia x 'Pink-a-Boo'</i>	138, 270
COTONÉASTER HORIZONTAL NAIN	84	DEUTZIA ROSE	138
COTONÉASTER HORIZONTAL PANACHÉ	85	<i>Deutzia x rosea</i>	138
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	84	<i>Deutzia x rosea x carminea</i> '	138
<i>Cotoneaster horizontalis</i> 'Hessei'	84, 239	DEUTZIA ROSE CARMIN	138
<i>Cotoneaster horizontalis perpupillus</i>	84	<i>Diervilla canadensis</i>	375
<i>Cotoneaster horizontalis</i> 'Variegatus'	85	<i>Diervilla lonicera</i>	375
<i>Cotoneaster lucidus</i>	56, 224	<i>Diervilla lonicera</i> 'Copper'	375
<i>Cotoneaster microphyllus</i> 'Thymifolius'	70	<i>Diervilla sessilifolia</i>	376
<i>Cotoneaster nanshan</i>	56	<i>Diervilla sessilifolia</i> 'Butterfly'	376
<i>Cotoneaster pekinensis</i>	56, 224	<i>Diervilla x splendens</i>	376
<i>Cotoneaster praecox</i>	56	<i>Diervilla rivularis</i> 'Morton'	375
COTONÉASTER PRÉCOCE RAMPANT	56	<i>Diervilla rivularis</i> 'Summer Stars'	375
<i>Crataegus crus-galli</i>	127	DIERVILLÉE À FEUILLES SESSILES	376
<i>Crataegus crus-galli inermis</i>	127	DIERVILLÉE À FEUILLES SESSILES 'BUTTERFLY'	376
<i>Crataegus laevigata</i> 'Crimson Cloud'	179, 291	DIERVILLÉE CHÈVREFEUILLE	375
<i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'	73, 316	DIERVILLÉE CHÈVREFEUILLE 'COPPER'	375
<i>Crataegus monogyna</i> 'Inermis Compacta'	73, 316	DIERVILLÉE SPLENDIDE	376
<i>Crataegus x mordenensis</i> 'Snowbird'	203	DIERVILLÉE 'SUMMER STARS'	375
<i>Crataegus phaenopyrum</i>	210	DIRCA DES MARAIS	342, 360
<i>Crataegus viridis</i> 'Winter King'	204	<i>Dirca palustris</i>	342, 360
CYPRÈS DE RUSSIE	376		
CYTISE À FLEURS POURPRES	96, 244		
CYTISE DE KEW 'CYNI'	45, 222		
CYTISE DE KEW 'NIKI'	45, 222		
<i>Cytisus x kewensis</i> 'Cyni'	45, 222		
<i>Cytisus x kewensis</i> 'Niki'	45, 222		
<i>Cytisus purpureus</i>	96, 244		

D

<i>Daphne x burkwoodii</i> 'Briggs Moonlight'	334	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	56
<i>Daphne x burkwoodii</i> 'Brimoon'	334	<i>Elaeagnus argentea</i>	66
		<i>Elaeagnus commutata</i>	56
		<i>Elaeagnus x 'Quicksilver'</i>	56
		<i>Eleutherococcus sieboldianus</i>	379
		<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Variegatus'	379
		<i>Empetrum nigrum</i>	307
		ENKIANTHE EN CLOCHE	343
		ENKIANTHE EN CLOCHE 'RED BELLS'	343

E

<i>Enkianthus campanulatus</i>	343	ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE BURNS	190, 298
<i>Enkianthus campanulatus</i> 'Red Bells'	343	ÉPINETTE DE SITKA 'TENAS'	35
<i>Epigaea repens</i>	345, 360	ÉPINETTE DU COLORADO	105
ÉPIGÉE RAMPANTE	345, 360	ÉPINETTE DU COLORADO 'BABY BLUES EYES'	105
ÉPINETTE BLANCHE	209, 304	ÉPINETTE DU COLORADO 'BLUE PEARL'	105
ÉPINETTE BLANCHE À FEUILLES BLEUTÉES	209, 304	ÉPINETTE DU COLORADO FASTIGIÉE	105
ÉPINETTE BLANCHE 'DENSATA'	209, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'FAT ALBERT'	105
ÉPINETTE BLANCHE 'ECHINIFORMIS'	210, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'MESA VERDE'	106
ÉPINETTE BLANCHE 'JEAN'S DILLY'	210, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'MRS CESARINI'	107
ÉPINETTE BLANCHE 'NORTH STAR'	210, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'SHILO WEeping'	107
ÉPINETTE BLANCHE 'PIXIE'	210, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'THUME'	108
ÉPINETTE BLANCHE PLEUREUSE	210, 305	ÉPINETTE DU COLORADO 'TIFFIN'	108
ÉPINETTE BLANCHE 'RAINBOW'S END'	210, 305	ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA	209, 305
ÉPINETTE BLANCHE 'SANDER'S BLUE'	210, 306	ÉPINETTE NAINE DE L'ALBERTA EN BOULE	209, 304
ÉPINETTE BLEUE DE BAKER	105	ÉPINETTE NOIRE	190
ÉPINETTE BLEUE DE HOOPSE	106	ÉPINETTE NOIRE À POUSSES DORÉES	190
ÉPINETTE BLEUE DE KOSTER	106	ÉPINETTE NOIRE 'BEISSNERI'	191
ÉPINETTE BLEUE DE MOERHEIM	106	ÉPINETTE NOIRE 'ERICOIDES'	191
ÉPINETTE BLEUE DE THOMSEN	107	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CHERRY BOMB'	124, 257
ÉPINETTE BLEUE DU COLORADO	105	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'CONCORDE'	124, 258
ÉPINETTE BLEUE 'ISELI FASTIGIATE'	106	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG	
ÉPINETTE BLEUE 'ISELI FOXTAIL'	106	'EMERALD CARROUSEL'	124, 258
ÉPINETTE BLEUE 'MISSION BLUE'	106	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'GOLDEN NUGGET'	258
ÉPINETTE BLEUE 'MONTGOMERY'	107	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'JADE CARROUSEL'	124, 258
ÉPINETTE BLEUE NAINE	106	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG NAINE	
ÉPINETTE BLEUE PLEUREUSE	106	À FEUILLES JAUNES	257
ÉPINETTE BLEUE RAMPANTE	107	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROSE GLOW'	124, 258
ÉPINETTE BLEUE 'ROYAL KNIGHT'	107	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL BURGUNDY'	124, 258
ÉPINETTE BLEUE 'SAINT MARY'S BROOM'	107	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'ROYAL CLOAK'	124, 258
ÉPINETTE D'OHLENDORF	104	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'RUBY CARROUSEL'	125
ÉPINETTE D'ORIENT 'SHADOW'S BROOM'	127, 323	ÉPINE-VINETTE DE THUNBERG 'SUNSATIOn'	259
ÉPINETTE D'ORIENT 'SKYLANDS'	259	ÉRABLE À ÉPIS	320
ÉPINETTE DE NORVÈGE	102	ÉRABLE À GIGUÈRE	196, 300
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'AARBURG'	102	ÉRABLE À GIGUÈRE 'FLAMINGO'	141, 332
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'ACROCONA'	102	ÉRABLE À GIGUÈRE 'KELLY'S GOLD'	141, 332
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CINCINNATA'	103	ÉRABLE À GIGUÈRE PANACHÉ	141, 333
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CLANBRASSILIANA STRICTA'	103	ÉRABLE À GIGUÈRE 'SENSATION'	196, 301
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'COBRA'	103	ÉRABLE ARGENTÉ	378
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'CUPRESSINA'	103	ÉRABLE ARGENTÉ À FEUILLES LACINÉES	378
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'FORMANEK'	103	ÉRABLE ARGENTÉ 'BORNS GRACIOUS'	378
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'HILLSIDE UPRIGHT'	103	ÉRABLE ARGENTÉ 'SILVER QUEEN'	378
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'INVERSA'	103	ÉRABLE ARGENTÉ 'SKINNERI'	378
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'LITTLE GEM'	103	ÉRABLE À SUCRE	165, 284
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'MUCRONATA'	103	ÉRABLE À SUCRE 'GREEN MOUNTAIN'	165, 284
ÉPINETTE DE NORVÈGE NAINE	104	ÉRABLE À SUCRE 'MONUMENTALE'	165, 284
ÉPINETTE DE NORVÈGE NID D'OISEAU	103	ÉRABLE CHAMPÊTRE	116, 252
ÉPINETTE DE NORVÈGE PANACHÉE	103	ÉRABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE'	134
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'PENDULA MAJOR'	104	ÉRABLE DE FREEMAN 'AUTUMN FANTASY'	134
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'PENDULA MONSTROSA'	104	ÉRABLE DE L'AMOUR	367
ÉPINETTE DE NORVÈGE PLEUREUSE	104	ÉRABLE DE L'AMOUR COMPACT	367
ÉPINETTE DE NORVÈGE RAMPANTE	104	ÉRABLE DE L'AMOUR 'FLAME'	367
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'RUBRA SPICATA'	104	ÉRABLE DE NORVÈGE	177, 290
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'SHERWOOD COMPACT'	104	ÉRABLE DE NORVÈGE COLONNAIRE	177, 290
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'TABULIFORMIS'	104	ÉRABLE DE NORVÈGE 'CRIMSON KING'	177
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'VIRGATA'	104	ÉRABLE DE NORVÈGE 'CRIMSON SENTRY'	178
ÉPINETTE DE NORVÈGE 'WITCH'S BROOD'	105	ÉRABLE DE NORVÈGE 'DEBORAH'	178
ÉPINETTE DE SERBIE	189, 298	ÉRABLE DE NORVÈGE DE DRUMMOND	178
ÉPINETTE DE SERBIE NAINE	190, 298	ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD LUSTRE'	178, 290
ÉPINETTE DE SERBIE 'PIMOKO'	190, 298	ÉRABLE DE NORVÈGE 'EMERALD QUEEN'	178, 290
ÉPINETTE DE SERBIE PLEUREUSE	190, 298	ÉRABLE DE NORVÈGE 'FAIRVIEW'	178

ÉRABLE DE NORVÈGE 'GLOBOSUM'	178
ÉRABLE DE NORVÈGE 'PARKWAY'	178, 291
ÉRABLE DE NORVÈGE 'PRINCETON GOLD'	178
ÉRABLE DE NORVÈGE 'ROYAL RED'	178, 291
ÉRABLE DE NORVÈGE 'SCHEWDLER'	179, 345
ÉRABLE DE NORVÈGE 'SUPERFORM'	179, 291
ÉRABLE DE PENNSYLVANIE	338, 359
ÉRABLE DE TARTARIE	120, 255
ÉRABLE DU JAPON	94, 242
ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES DÉCOUPÉES	94, 243
ÉRABLE DU JAPON À FEUILLES POURPRES	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'BLOODGOOD'	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'CRIMSON QUEEN'	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'DISSECTUM GARNET'	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'INABASHIDARE'	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'RED DRAGON'	94, 243
ÉRABLE DU JAPON 'RED PYGMY'	94, 244
ÉRABLE DU JAPON 'SEIRYU'	95, 244
ÉRABLE NOIR	141, 270
ÉRABLE ROUGE	171
ÉRABLE ROUGE 'ARMSTRONG'	171
ÉRABLE ROUGE 'AUTUMN FLAME'	171
ÉRABLE ROUGE 'BOWHALL'	171
ÉRABLE ROUGE 'MORGAN'	172
ÉRABLE ROUGE 'NORTHWOOD'	172
ÉRABLE ROUGE 'OCTOBER GLORY'	172
ÉRABLE ROUGE 'RED SUNSET'	172
ÉRABLE ROUGE 'SCANLON'	172
<i>Erica carnea</i> 'December Red'	308
<i>Erica carnea</i> 'Pink Spangles'	308
<i>Erica carnea</i> 'Porters Red'	308
<i>Erica carnea</i> 'Springwood Pink'	308
<i>Erica carnea</i> 'Springwood White'	308
<i>Erica carnea</i> 'Vivellii'	308
<i>Euonymus alatus</i>	205
<i>Euonymus alatus</i> 'Chicago Fire'	205, 355
<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	205, 355
<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus Select'	205, 355
<i>Euonymus alatus</i> 'Fire Ball'	205, 355
<i>Euonymus alatus</i> 'Timber Creek'	205, 355
<i>Euonymus atropurpureus</i>	377
<i>Euonymus europaeus</i>	163, 282
<i>Euonymus europaeus</i> 'Albus'	163, 282
<i>Euonymus europaeus</i> 'Aldenhamensis'	163, 282
<i>Euonymus europaeus</i> 'Red Caps'	163, 282
<i>Euonymus europaeus</i> 'Red Cascade'	163, 282
<i>Euonymus fortunei</i> 'Blondy'	271, 334
<i>Euonymus fortunei</i> 'Canadale Gold'	272, 334
<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	334
<i>Euonymus fortunei</i> 'Country Gold'	272, 334
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety'	370
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold'	370
<i>Euonymus fortunei</i> 'E.T.'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'E.T. Gold'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'Gold Tip'	370
<i>Euonymus fortunei</i> 'Golden Prince'	379
<i>Euonymus fortunei</i> 'Harlequin'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'Interbolwi'	272, 334
<i>Euonymus fortunei</i> 'Kewensis'	370
<i>Euonymus fortunei</i> 'Niagara Gem'	370

<i>Euonymus fortunei</i> 'Sarcoxie'	370
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sheridan Gold'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sungold'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot'	272, 335
<i>Euonymus fortunei</i> 'Surespot'	272, 335
<i>Euonymus fortunei vegetus</i>	370
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Indian Summer'	70
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Red Elf'	70
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Winter Glory'	70
<i>Euonymus latifolius</i>	377
<i>Euonymus nanus</i>	45
<i>Euonymus nanus turkestanicus</i>	46
<i>Exochorda x macrantha</i> 'The Bride'	113
EXOCHORDE 'THE BRIDE'	113

F

<i>Fagus grandifolia</i>	176, 343
FAUX AMANDIER À FLEURS DOUBLES	146
FAUX-CYPRÈS BLANC 'ANDELYNSIS'	69
FAUX-CYPRÈS BLANC 'BLUE SPORT'	69
FAUX-CYPRÈS BLANC 'ERICOIDES'	69
FAUX-CYPRÈS BLANC 'HEATHERBUN'	69
FAUX-CYPRÈS BLANC 'METH DWARF'	69
FAUX-CYPRÈS BLANC PLEUREUR	69
FAUX-CYPRÈS BLANC 'RUBICON'	70
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'BLUE FEATHERS'	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'CRIPPSI'	248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI DORÉ NAIN	248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FERNSPRAY GOLD'	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'FILICOIDES'	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'KOSTERI'	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI NAIN	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'NANA GRACILIS'	101, 248
FAUX-CYPRÈS D'HINOKI 'SAFFRON SPRAY'	248
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA BLEUTÉ	100, 247
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA DORÉ	247
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'JUBILEE'	100, 247
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'OREGON BLUE WEEPING'	100, 247
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA PLEUREUR	100, 247
FAUX-CYPRÈS DE NOOTKA 'STRICT WEEPING'	101, 247
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'BOULEVARD'	187, 295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA COMPACT	187, 295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'CURLY TOPS'	187, 295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME	188, 295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME DORÉ	295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME DORÉ NAIN	295
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME 'GOLDEN CHARM'	188, 296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA FILIFORME NAIN	188, 296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLD DUST'	188, 296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'GOLDEN PINCUSHION'	188, 296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'LEMON THREAD'	296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'MOPS'	296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA PLUMEUX DORÉ	188, 296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SNOW'	296
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA INTERMEDIA'	188, 297
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SQUARROSA LOMBARTS'	188, 297

FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'SUNGOLD'	297	<i>Fraxinus americana</i> 'Jungfer'	166
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'TZUKUMO'	188, 297	<i>Fraxinus americana</i> 'Manitou'	166
FAUX-CYPRÈS DE SAWARA 'VINTAGE GOLD'	189, 297	<i>Fraxinus americana</i> 'Northern Blaze'	166
FAUX INDIGO	60	<i>Fraxinus americana</i> 'Skycole'	166
FAUX VERNIS DU JAPON	54	<i>Fraxinus americana</i> 'Skyline'	166
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES	58	<i>Fraxinus americana</i> 'Sparticus'	166
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'EMERALD CASCADE'	58	<i>Fraxinus americana</i> 'Sparzam'	166
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'FAIRVIEW'	58	<i>Fraxinus excelsior</i>	134
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'IMPERIAL'	58	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa'	146
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'PRAIRIE SILK'	58	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	134
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'RUBYLACE'	58	<i>Fraxinus nigra</i>	40
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SHADEMASTER'	58	<i>Fraxinus nigra</i> 'Fall Gold'	41
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SKYLINE'	59	<i>Fraxinus nigra</i> 'Northern Gem'	41
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SPECTRUM'	59	<i>Fraxinus nigra</i> 'Northern Treasure'	41
FÉVIER D'AMÉRIQUE SANS ÉPINES 'SUNBURST'	59	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	92
FORSYTHIA 'BOUCLE D'OR'	73, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Bergeson'	92
Forsythia x 'Boucle d'Or'	73, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Cimmaron'	92
Forsythia x 'Courtacourt'	73, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Cimmzam'	92
Forsythia x 'Courtalyn'	75, 232	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Foothills'	92
Forsythia x 'Courtasol'	74, 231	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Harlequin'	93
Forsythia x 'Flojor'	74, 231	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Heuver'	92
FORSYTHIA 'GOLDEN TIMES'	73, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Johnson'	93
Forsythia x 'Golden Times'	73, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Leprechaun'	93
FORSYTHIA 'HAPPY CENTENNIAL'	74, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Marshall's Seedless'	93
Forsythia x 'Happy Centennial'	74, 230	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Patmore'	93
FORSYTHIA 'MALUCH'	74, 231	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Prairie Spire'	93
Forsythia x 'Maluch'	74, 231	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Ruby'	93
Forsythia mandshurica 'Vermont Sun'	138	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Summit'	93
FORSYTHIA 'MARÉE D'OR'	74, 231	FRÈNE À FEUILLAGE CRISPÉ	146
Forsythia x 'Marée d'Or'	74, 231	FRÈNE D'AMÉRIQUE	166
FORSYTHIA 'MEADOWLARK'	74, 231	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'AUTUMN APPLAUSE'	166
Forsythia x 'Meadowlark'	74, 231	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'AUTUMN PURPLE'	166
FORSYTHIA 'MINGOLD'	74, 231	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'MANITOU'	166
Forsythia x 'Minigold'	74, 231	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'NORTHERN BLAZE'	166
FORSYTHIA 'MINGOLD FIESTA'	74, 316	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'SKYLINE'	166
Forsythia x 'Minigold Fiesta'	74, 316	FRÈNE D'AMÉRIQUE 'SPARTICUS'	166
FORSYTHIA 'NEW HAMPSHIRE GOLD'	74, 231	FRÈNE D'EUROPE	134
Forsythia x 'New Hampshire Gold'	74, 231	FRÈNE D'EUROPE PLEUREUR	134
FORSYTHIA 'NORTHERN GOLD'	74, 231	FRÈNE NOIR	40
Forsythia x 'Northern Gold'	74, 231	FRÈNE NOIR 'FALL GOLD'	41
Forsythia ovata 'Ottawa'	74, 231	FRÈNE NOIR 'NORTHERN GEM'	41
FORSYTHIA PRÉCOCE 'OTTAWA'	74, 231	FRÈNE NOIR 'NORTHERN TREASURE'	41
FORSYTHIA 'SUNRISE'	74, 231	FRÈNE ROUGE	92
Forsythia x 'Sunrise'	74, 231	FRÈNE ROUGE 'BERGESON'	92
FORSYTHIA 'VERMONT SUN'	138	FRÈNE ROUGE 'CIMMARON'	92
FORSYTHIA 'WEEK END'	75, 232	FRÈNE ROUGE 'FOOTHILLS'	92
Forsythia x 'Week End'	75, 232	FRÈNE ROUGE 'HARLEQUIN'	93
Fothergilla gardenii	315	FRÈNE ROUGE 'JOHNSON'	93
Fothergilla major	228, 315	FRÈNE ROUGE 'MARSHALL'S SEEDLESS'	93
Fothergilla major 'Mount Airy'	228, 315	FRÈNE ROUGE 'PATMORE'	93
FOTHERGILLA NAIN	315	FRÈNE ROUGE 'RUBY'	93
FOTHERGILLA ROBUSTE	228, 315	FRÈNE ROUGE 'SUMMIT'	93
FOTHERGILLA ROBUSTE 'MOUNT AIRY'	228, 315	FUSAIN AILÉ	205, 355
FRAMBOISIER ODORANT	364	FUSAIN AILÉ 'CHICAGO FIRE'	205, 355
FRAMBOISIER ODORANT À FLEURS ROUGES	364	FUSAIN AILÉ 'FIRE BALL'	205, 355
Fraxinus americana	166	FUSAIN AILÉ NAIN	205, 355
Fraxinus americana 'Autumn Applause'	166	FUSAIN DE FORTUNE 'BLONDY'	271, 334
Fraxinus americana 'Autumn Purple'	166	FUSAIN DE FORTUNE 'CANADALE GOLD'	272, 334
Fraxinus americana 'Jefnor'	166	FUSAIN DE FORTUNE 'COLORATUS'	334
		FUSAIN DE FORTUNE 'COUNTRY GOLD'	272, 334

FUSAIN DE FORTUNE 'EMERALD GAIEY'	370	GENÉVRIER DE CHINE 'SHIMPAKU'	207
FUSAIN DE FORTUNE 'EMERALD'N GOLD'	370	GENÉVRIER DE CHINE 'SPARTAN'	207
FUSAIN DE FORTUNE 'E.T.'	272, 335	GENÉVRIER DE CHINE TORTUEUX PANACHÉ	207
FUSAIN DE FORTUNE 'GOLD TIP'	370	GENÉVRIER DE MANEY	199
FUSAIN DE FORTUNE 'HARLEQUIN'	272, 335	GENÉVRIER DE PFITZER	208
FUSAIN DE FORTUNE 'KEWENSIS'	370	GENÉVRIER DE PFITZER BLEU	209, 304
FUSAIN DE FORTUNE 'NIAGARA GEM'	370	GENÉVRIER DE PFITZER COMPACT	209, 304
FUSAIN DE FORTUNE RAMPANT	370	GENÉVRIER DE PFITZER DORÉ	208, 304
FUSAIN DE FORTUNE 'SARCOXIE'	370	GENÉVRIER DE PFITZER 'GOLD LACE'	209, 304
FUSAIN DE FORTUNE 'SHERIDAN GOLD'	272, 335	GENÉVRIER DE SARGENT	207
FUSAIN DE FORTUNE 'SUNGOLD'	272, 335	GENÉVRIER DE SUÈDE	62
FUSAIN DE FORTUNE 'SUNSPOT'	272, 335	GENÉVRIER DE VIRGINIE	47
FUSAIN DE FORTUNE 'SURESPOT'	272, 335	GENÉVRIER DE VIRGINIE 'GREY OWL'	47
FUSAIN DE L'HIMALAYA 'INDIAN SUMMER'	70	GENÉVRIER DES ROCHEUSES	51
FUSAIN DE L'HIMALAYA 'RED ELF'	70	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE ARROW'	49
FUSAIN DE L'HIMALAYA 'WINTER GLORY'	70	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE CREEPER'	49
FUSAIN D'EUROPE	163, 282	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE HEAVEN'	49
FUSAIN D'EUROPE À FRUITS BLANCS	163, 282	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'BLUE TRAIL'	50
FUSAIN D'EUROPE 'ALDENHAMENSIS'	163, 282	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'GREENSPIRE'	50
FUSAIN D'EUROPE 'RED CASCADE'	163, 282	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MOFFETTI'	50
FUSAIN NAIN	45	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MONTANA GREEN'	50
FUSAIN NAIN DU TURKESTAN	46	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'MOONGLOW'	50
FUSAIN NOIR	377	GENÉVRIER DES ROCHEUSES PLEUREUR	51

G

GADELIER ALPIN	368	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'SKYROCKET'	51
GADELIER ALPIN 'GREEN JEANS'	368	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'TABLETOP'	51
GADELIER ALPIN 'SCHMIDT'	368	GENÉVRIER DES ROCHEUSES 'WICHITA BLUE'	51
GADELIER DORÉ	375	GENÉVRIER DU LITTORAL 'BLUE PACIFIC'	64
GADELIER ODORANT	215, 306	GENÉVRIER DU LITTORAL 'SILVER MIST'	64
GAINIER DU CANADA	71, 315	GENÉVRIER DU TEMPLE	54, 223
GAINIER DU CANADA 'FOREST PANSY'	71, 315	GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'BLUE CARPET'	114
GAINIER DU CANADA 'LAVENDER TWIST'	71, 315	GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'BLUE STAR'	114
<i>Gaultheria procumbens</i>	308, 358	GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'HOLGER'	114
GENÊT DE LYDIE	56	GENÉVRIER ÉCAILLEUX 'MEYER'	114
GENÊT DES TEINTURIERS	33	GENÉVRIER HORIZONTAL	52
GENÊT DES TEINTURIERS 'ROYAL GOLD'	33	GENÉVRIER HORIZONTAL 'BAR HARBOR'	52
GENÊT PILEUX 'GOLD FLASH'	29	GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE ACRES'	52
GENÊT PILEUX 'VANCOUVER GOLD'	29	GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE CHIP'	52
GENÉVRIER COMMUN	61	GENÉVRIER HORIZONTAL 'BLUE FOREST'	52
GENÉVRIER COMMUN 'BERKSHIRE'	61	GENÉVRIER HORIZONTAL 'GLOMERATA'	52
GENÉVRIER COMMUN 'COMPRESSA'	226	GENÉVRIER HORIZONTAL 'HUGHES'	53
GENÉVRIER COMMUN 'DEPRESSA AUREA'	226	GENÉVRIER HORIZONTAL 'ICEE BLUE'	53
GENÉVRIER COMMUN 'GNOM'	61	GENÉVRIER HORIZONTAL 'LIMEGLOW'	223
GENÉVRIER COMMUN 'GOLD CONE'	62	GENÉVRIER HORIZONTAL 'MARCELLUS'	53
GENÉVRIER COMMUN 'GREEN CARPET'	62	GENÉVRIER HORIZONTAL 'MOTHER LODE'	223
GENÉVRIER COMMUN 'HORNIBROOKII'	62	GENÉVRIER HORIZONTAL 'PRINCE OF WHALES'	53
GENÉVRIER COMMUN 'REPANDA'	62	GENÉVRIER HORIZONTAL 'WILTONII'	53
GENÉVRIER COMMUN 'SENTINEL'	62	GENÉVRIER HYBRIDE 'ANGELICA BLUE'	207, 303
GENÉVRIER D'ANDORRE	53	GENÉVRIER HYBRIDE 'DAUB'S FROSTED'	303
GENÉVRIER DAVURICA 'EXPANSA'	123, 257	GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLD COAST'	208, 303
GENÉVRIER DE BLAUW	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLDEN GLOW'	208, 303
GENÉVRIER DE CHINE 'BLUE ALPS'	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'GOLD STAR'	208, 303
GENÉVRIER DE CHINE 'BLUE POINT'	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'HETZLI'	208
GENÉVRIER DE CHINE DORÉ	303	GENÉVRIER HYBRIDE 'MATTHEW'S BLUE'	208
GENÉVRIER DE CHINE 'FAIRVIEW'	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'MINT JULEP'	208
GENÉVRIER DE CHINE 'MOUNBATTEN'	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'OLD GOLD'	208, 304
GENÉVRIER DE CHINE 'ONTARIO GREEN'	206	GENÉVRIER HYBRIDE 'SAYBROOK GOLD'	209, 304
GENÉVRIER DE CHINE 'ROBUSTA GREEN'	207	GENÉVRIER PINGII	114
GENÉVRIER DE CHINE 'SAN JOSÉ'	207	GENÉVRIER PROSTRÉ NAIN	47

GENÉVRIER SABINE	26, 215	<i>Hamamelis virginiana</i>	169, 285
GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX	27, 216	<i>Hedera helix</i> 'Bulgaria'	364
GENÉVRIER SABINE À FEUILLES DE TAMARIX BLEUES	26, 216	HEPTACODIUM	169, 285
GENÉVRIER SABINE 'ARCADIA'	26, 215	<i>Heptacodium miconoides</i>	169, 285
GENÉVRIER SABINE 'BLUE DANUBE'	26, 215	HÊTRE À GRANDES FEUILLES	176, 343
GENÉVRIER SABINE 'BUFFALO'	26, 215	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Aphrodite'	125
GENÉVRIER SABINE 'CALGARY CARPET'	26, 215	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Blue Bird'	125
GENÉVRIER SABINE 'MOOR-DENSE'	26, 216	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Diana'	125
GENÉVRIER SABINE PANACHÉ	27, 216	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Minerva'	125
GENÉVRIER SABINE 'SKANDIA'	27, 307	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Notwoodtwo'	126
Genista lydia	56	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Oiseau Bleu'	125
Genista pilosa 'Gold Flash'	29	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Red Heart'	125
Genista pilosa 'Vancouver Gold'	29	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Rosalbane'	125
Genista tinctoria	33	<i>Hibiscus syriacus</i> 'White Chiffon'	126
Genista tinctoria 'Royal Gold'	33	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Woodbridge'	126
Ginkgo biloba	195	Hippophae rhamnoides	57
Ginkgo biloba 'Chi Chi'	195	Hippophae rhamnoides 'Leikora'	57
Ginkgo biloba 'Mariken'	195	Hippophae rhamnoides 'Pollmix'	57
Ginkgo biloba 'Pendula'	195	HORTENSIA DES JARDINS 'ALL SUMMER BEAUTY'	299, 351
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'	195	HORTENSIA DES JARDINS 'ALPEN GLOW'	299, 351
Ginkgo biloba 'Tubiformis'	196	HORTENSIA DES JARDINS 'BLUE WAVE'	299, 351
Ginkgo biloba 'Umbrella'	196	HORTENSIA DES JARDINS 'BOUQUET ROSE'	299, 351
Gleditsia triacanthos inermis	58	HORTENSIA DES JARDINS 'DOOLEY'	299, 351
Gleditsia triacanthos inermis 'Dursan'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'FOREVER PINK'	299, 351
Gleditsia triacanthos inermis 'Emerald Cascade'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'LEMON WAVE'	299, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Fairview'	58	HORTENSIA DES JARDINS MARISSII PANACHÉ	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Impcole'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'MASJA'	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Imperial'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'NIKKO BLUE'	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Prairie Silk'	58	HORTENSIA DES JARDINS PANACHÉ	299, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Rubleace'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'PIA'	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Shademaster'	58	HORTENSIA DES JARDINS 'PINK BEAUTY'	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Skycole'	59	HORTENSIA DES JARDINS 'SŒUR THÉRÈSE'	352
Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'	59	HORTENSIA DES JARDINS 'TOKYO DELIGHT'	300, 352
Gleditsia triacanthos inermis 'Spectrum'	59	HORTENSIA DES JARDINS 'WHITE WAVE'	300, 353
Gleditsia triacanthos inermis 'Speczam'	59	HOUBLON DÉCORATIF	140, 270
Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst'	59	HOUBLON DÉCORATIF DORÉ	140, 270
Gleditsia triacanthos inermis 'Suncole'	59	HOUX HYBRIDE 'BLUE BOY'	294
GLYCINE 'AUNT DEE'	113, 320	HOUX HYBRIDE 'BLUE GIRL'	294
GLYCINE DE CHINE	90, 318	HOUX HYBRIDE 'BLUE PRINCE'	294
GLYCINE DE CHINE 'BLUE SAPPHIRE'	91, 318	HOUX HYBRIDE 'BLUE PRINCESS'	294
GLYCINE 'LAWRENCE'	90, 318	HOUX 'SPARKLEBERRY'	172, 343
GROSELLIER SANGUIN 'KING EDWARD VII'	362	HOUX VERTICILLÉ	174, 288
Gymnocladus dioica	143	HOUX VERTICILLÉ 'AFTERGLOW'	174, 288
H			
Halesia carolina	169, 339	HOUX VERTICILLÉ 'AURANTIACA'	174, 288
HALIMODENDRON	57, 224	HOUX VERTICILLÉ 'BERRY NICE'	174, 288
Halimodendron halodendron	57, 224	HOUX VERTICILLÉ 'CACAPON'	174, 289
HAMAMÉLIS DE VIRGINIE	169, 285	HOUX VERTICILLÉ 'EARLY MALE'	175, 289
HAMAMÉLIS HYBRIDE 'ARNOLD PROMISE'	371	HOUX VERTICILLÉ 'JIM DANDY'	175, 289
HAMAMÉLIS HYBRIDE 'DIANE'	372	HOUX VERTICILLÉ 'OOSTERWIJK'	175, 289
HAMAMÉLIS HYBRIDE 'JELENA'	372	HOUX VERTICILLÉ 'RED SPRITE'	175, 289
HAMAMÉLIS HYBRIDE 'JELENA'	372	HOUX VERTICILLÉ 'SOUTHERN GENTLEMEN'	175, 289
HAMAMÉLIS HYBRIDE 'RUBY GLOW'	372	HOUX VERTICILLÉ 'WINTER GOLD'	175, 290
Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise'	371	HOUX VERTICILLÉ 'WINTER RED'	175, 290
Hamamelis x intermedia 'Diane'	372	Humulus lupulus	140, 270
Hamamelis x intermedia 'Jelena'	372	Humulus lupulus 'Aureus'	140, 270
Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow'	372	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	339, 359
HAMAMÉLIS MOLLIS 'PALLIDA'	169, 285	Hydrangea arborescens 'Grandiflora'	339, 360
Hamamelis mollis 'Pallida'	169, 285	Hydrangea arborescens 'White Dome'	339, 360
		Hydrangea anomala petiolaris	363

<i>Hydrangea heteromalla</i>	146
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'All Summer Beauty'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Alpen Glow'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Alpenglühchen'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Blue Wave'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bouquet Rose'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Dooley'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Forever Pink'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lemon Wave'	299, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Maculata'	299, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mariesii Perfecta'	299, 351
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mariesii Variegata'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Masja'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mini Pink Elf'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Nikko Blue'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pia'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pink Beauty'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Sister Therese'	352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Sœur Thérèse'	352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Tokyo Delight'	300, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Variegata'	299, 352
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'White Wave'	300, 353
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Angel Blush'	164, 284
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Brussels Lace'	163, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Burgundy Lace'	163, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Interhydia'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Kyushu'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Limelight'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pee Wee'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Diamond'	164, 283
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Ruby'	164, 284
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Unique'	164, 284
<i>Hydrangea paniculata</i> 'White Moth'	164, 284
<i>Hydrangea quercifolia</i>	142, 333
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Alice'	142, 333
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Snowflake'	143, 334
<i>Hydrangea serrata</i> 'Arctic Blue'	340
<i>Hydrangea serrata</i> 'Blue Billow'	340
<i>Hydrangea serrata</i> 'Bluebird'	340
<i>Hydrangea serrata</i> 'Golden Sunlight'	340
<i>Hydrangea serrata</i> 'Preziosa'	340
HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE	142, 333
HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'ALICE'	142, 333
HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE 'SNOWFLAKE'	143, 334
HYDRANGÉE ARBORESCENTE À GRANDES FLEURS	339, 360
HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'ANNABELLE'	339, 359
HYDRANGÉE ARBORESCENTE 'WHITE DOME'	339, 360
HYDRANGÉE GRIMPANTE	363
HYDRANGÉE HETEROMALLA	146
HYDRANGÉE PANICULÉE À GRANDES FLEURS	164, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'BRUSSELS LACE'	163, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'BURGUNDY LACE'	163, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'KYUSHU'	164, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'LIMELIGHT'	164, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'PEE WEE'	164, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'PINK DIAMOND'	164, 283
HYDRANGÉE PANICULÉE 'RUBY'	164, 284
HYDRANGÉE PANICULÉE 'UNIQUE'	164, 284
HYDRANGÉE PANICULÉE 'WHITE MOTH'	164, 284

HYDRANGÉE SERRATA 'ARCTIC BLUE'	340
HYDRANGÉE SERRATA 'BLUE BILLOW'	340
HYDRANGÉE SERRATA 'BLUEBIRD'	340
HYDRANGÉE SERRATA 'GOLDEN SUNLIGHT'	340
HYDRANGÉE SERRATA 'PREZIOSA'	340
<i>Hypericum aureum</i>	46, 221
HYPERICUM FRONDOSUM	46, 221
<i>Hypericum frondosum</i>	46, 221
HYPERICUM FRONDOSUM 'SUNBURST'	46, 222
<i>Hypericum frondosum</i> 'Sunburst'	46, 222
<i>Hypericum kalmianum</i>	46, 222
<i>Hypericum kalmianum</i> 'Ames'	46, 222
HYPERICUM PROLIFICUM	51, 222
<i>Hypericum prolificum</i>	51, 222

I

IF DU CANADA	372
IF DU JAPON 'CAPITATA'	364
IF DU JAPON DORÉ	111, 250
IF DU JAPON 'DWARF BRIGHT GOLD'	112, 250
IF DU JAPON NAIN	365
IF HYBRIDE DE BROWN	365
IF HYBRIDE DE HICKS	365
IF HYBRIDE DE HILL	365
IF HYBRIDE 'DENSIFORMIS'	365
IF HYBRIDE 'FAIRVIEW'	365
IF HYBRIDE 'FLUSHING'	365
IF HYBRIDE 'SENTINALIS'	365
IF HYBRIDE 'VIRIDIS'	365
<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Boy'	294
<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Girl'	294
<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Prince'	294
<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Princess'	294
<i>Ilex x Sparkleberry</i>	172, 343
<i>Ilex verticillata</i>	174, 288
<i>Ilex verticillata</i> 'Afterglow'	174, 288
<i>Ilex verticillata</i> 'Aurantiaca'	174, 288
<i>Ilex verticillata</i> 'Berry Nice'	174, 288
<i>Ilex verticillata</i> 'Cacapon'	174, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Dwarf Male'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Early Male'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Jim Dandy'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Oosterwijk'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Red Sprite'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Southern Gentlemen'	175, 289
<i>Ilex verticillata</i> 'Spriber'	174, 288
<i>Ilex verticillata</i> 'Winter Gold'	175, 290
<i>Ilex verticillata</i> 'Winter Red'	175, 290
<i>Itea virginica</i> 'Henri's Garnet'	343
<i>Itea virginica</i> 'Little Henri'	343
<i>Ilex virginica</i> 'Sprich'	343
ITÉA DE VIRGINIE 'HENRI'S GARNET'	343
ITÉA DE VIRGINIE 'LITTLE HENRI'	343

J

JASMIN TROMPETTE	203
JASMIN TROMPETTE 'FLAMENCO'	203
JASMIN TROMPETTE 'FLAVA'	203
JASMIN TROMPETTE 'INDIAN SUMMER'	203

JASMIN TROMPETTE 'MADAME GALEN'	203	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Gold Star'	208, 303
<i>Juglans cinerea</i>	134	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Hetzii'	208
<i>Juglans nigra</i>	135	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Matthew's Blue'	208
<i>Juglans regia</i>	135	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Mint Julep'	208
<i>Juniperus chinensis</i> 'Aurea'	303	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Monlep'	208
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blaauw'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Old Gold'	208, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blaauwii'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Pfitzeriana'	208
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Alps'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Pfitzeriana Aurea'	208, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Point'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Pfitzeriana Compacta'	209, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Fairview'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Pfitzeriana Glauca'	209, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Maney'	199	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Pfitzeriana Gold Lace'	209, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Maneyi'	199	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Saybrook Gold'	209, 304
<i>Juniperus chinensis</i> 'Mounbatten'	206	<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Seagreen'	208
<i>Juniperus chinensis</i> 'Ontario Green'	206	<i>Juniperus pingii</i>	114
<i>Juniperus chinensis</i> 'Robusta Green'	207	<i>Juniperus procumbens</i> 'Nana'	47
<i>Juniperus chinensis</i> 'San José'	207	<i>Juniperus rigida</i>	54, 223
<i>Juniperus chinensis sargentii</i>	207	<i>Juniperus sabina</i>	26, 215
<i>Juniperus chinensis</i> 'Shimpaku'	207	<i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia'	26, 215
<i>Juniperus chinensis</i> 'Spartan'	207	<i>Juniperus sabina</i> 'Blauue Donau'	26, 215
<i>Juniperus chinensis</i> 'Torulosa Variegata'	207	<i>Juniperus sabina</i> 'Blue Danube'	26, 215
<i>Juniperus chinensis</i> 'Variegated Kaizuka'	207	<i>Juniperus sabina</i> 'Buffalo'	26, 215
<i>Juniperus communis</i>	61	<i>Juniperus sabina</i> 'Calgary Carpet'	26, 215
<i>Juniperus communis</i> 'Berkshire'	61	<i>Juniperus sabina</i> 'Monard'	26, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Compressa'	226	<i>Juniperus sabina</i> 'Monna'	26, 215
<i>Juniperus communis</i> 'Depressa Aurea'	226	<i>Juniperus sabina</i> 'Moor-Dense'	26, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Gnom'	61	<i>Juniperus sabina</i> 'New Blue'	26, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Gold Cone'	62	<i>Juniperus sabina</i> 'Scandia'	27, 307
<i>Juniperus communis</i> 'Green Carpet'	62	<i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia'	27, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Hornbrookii'	62	<i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia New Blue'	26, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Repanda'	62	<i>Juniperus sabina</i> 'Variegata'	27, 216
<i>Juniperus communis</i> 'Sentinel'	62	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow'	49
<i>Juniperus communis</i> 'Suecica'	62	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Creeper'	49
<i>Juniperus conferta</i> 'Blue Pacific'	64	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Heaven'	49
<i>Juniperus conferta</i> 'Silver Mist'	64	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Trail'	50
<i>Juniperus davurica</i> 'Expansa'	123, 257	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Greenspire'	50
<i>Juniperus horizontalis</i>	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moffet Blue'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compacta'	53	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moffetii'	50
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Bar Harbor'	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Montana Green'	50
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Acres'	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moonglow'	50
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Forest'	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Tabletop'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Rug'	53	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Table Top Blue'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Glomerata'	52	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Tolleson's Blue Weeping'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Hughes'	53	<i>Juniperus scopulorum</i>	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Ice Blue'	53	'Tolleson's Green Weeping'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Icee Blue'	53	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Wichita Blue'	51
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Limeglow'	223	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	114
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Marcellus'	53	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star'	114
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Monber'	53	<i>Juniperus squamata</i> 'Holger'	114
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Mother Lode'	223	<i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'	114
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Noslg'	223	<i>Juniperus virginiana</i>	47
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Plumosa Compacta'	53	<i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl'	47
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Prince of Whales'	53		
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii'	53		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Angelica Blue'	207, 303		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Aurea'	208, 303		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Bakaurea'	208, 303		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Daub's Frosted'	303		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Gold Coast'	208, 303		
<i>Juniperus</i> x <i>media</i> 'Golden Glow'	208, 303		

K

<i>Kalmia angustifolia</i>	362
<i>Kalmia glauca</i>	362
<i>Kalmia latifolia</i> 'Elf'	376
<i>Kalmia latifolia</i> 'Heart of Fire'	376
<i>Kalmia latifolia</i> 'Minuet'	376

<i>Kalmia latifolia</i> 'Pink Frost'	376	LIERRE DE BOSTON 'VEITCHI'	380
<i>Kalmia polifolia</i>	362	<i>Ligustrum</i> x <i>vicaryi</i>	199
KALMIE À FEUILLES ÉTROITES	362	<i>Ligustrum</i> x <i>vicaryi</i> 'Hillside'	199
KALMIE GLAUQUE	362	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Cheyenne'	75, 316
<i>Kerria japonica</i>	96, 319	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	75, 316
<i>Kerria japonica</i> 'Golden Guinea'	96, 319	LILAS À FEUILLES EN DENTELLE	78
<i>Kerria japonica</i> 'Picta'	97, 319	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ANGEL WHITE'	77, 233
<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	97, 319	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'ASESSIPPI'	77, 233
KIWI 171, 342		LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'CHURCHILL'	77, 233
KIWI 'ISSAI'	171, 342	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'EXCEL'	77, 233
KIWI KOLOMIKTA	171, 342	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'LAVENDER LADY'	77, 233
KIWI KOLOMIKTA 'ARCTIC BEAUTY'	171, 342	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MAIDEN'S BLUSH'	77, 234
KOLKWITZIA AIMABLE	85	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'MOUNT BAKER'	78, 234
KOLKWITZIA AIMABLE 'PINK CLOUD'	85	LILAS À FLEURS DE JACINTHE 'POCAHONTAS'	78, 234
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	85	LILAS COMMUN	81, 237
<i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Pink Cloud'	85	LILAS DE CHINE 'SAUGEANA'	182, 293

L

<i>Larix decidua</i>	101	LILAS DE CORÉE NAIN	246
<i>Larix decidua</i> 'Horstmanns Recurved'	102	LILAS DE CORÉE NAIN À FLEURS BLANCHES	246
<i>Larix decidua</i> 'Pendula'	102	LILAS DE HONGRIE	148
<i>Larix decidua</i> 'Poullii'	102	LILAS DE HONGRIE 'HOLGER'	148
<i>Larix decidua</i> 'Puli'	102	LILAS DE MANDCHOURIE 'MISS KIM'	86
<i>Larix decidua</i> 'Pulii'	102	LILAS DE PRESTON 'AGNES SMITH'	98
<i>Larix</i> x <i>europis</i>	88	LILAS DE PRESTON 'ALICE ROSE FOSTER'	98
<i>Larix</i> x <i>europis</i> 'Varied Directions'	88	LILAS DE PRESTON 'CORAL'	98
<i>Larix kaempferi</i>	87, 240	LILAS DE PRESTON 'DONALD WYMAN'	98
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Ball'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'HIAWATHA'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Dwarf'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'ISABELLA'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Rabbit'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'JAMES MAC FARLANE'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Contorta'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'MINUET'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Diana'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'MISS CANADA'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Diana Contorta'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'RED WINE'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Diane'	87, 240	LILAS DE PRESTON 'ROYALTY'	99
<i>Larix kaempferi</i> 'Inversa'	88, 241	LILAS DU JAPON	81
<i>Larix kaempferi</i> 'Jakobsen's Pyramid'	87, 240	LILAS DU JAPON 'GOLDEN ECLIPSE'	72, 229
<i>Larix kaempferi</i> 'Nana'	88, 240	LILAS DU JAPON 'IVORY SILK'	72, 230
<i>Larix kaempferi</i> 'Pendula'	88, 241	LILAS DUVETUEUX	86
<i>Larix kaempferi</i> 'Stiff Weeping'	88, 241	LILAS DUVETUEUX DORÉ	239
<i>Larix laricina</i>	202	LILAS HYBRIDE 'AGINCOURT BEAUTY'	76, 232
<i>Larix laricina</i> 'Blue Weeping'	202	LILAS HYBRIDE 'ALBERT F. HOLDEN'	76, 232
<i>Larix laricina</i> 'Newport Beauty'	202	LILAS HYBRIDE 'AVALANCHE'	76, 232
<i>Larix leptolepis</i>	87, 240	LILAS HYBRIDE 'BELLE DE NANCY'	76, 232
LAURIER DE MONTAGNES 'ELF'	376	LILAS HYBRIDE 'BURGUNDY QUEEN'	76, 232
LAURIER DE MONTAGNES 'HEART OF FIRE'	376	LILAS HYBRIDE 'CHARLES JOLY'	76, 232
LAURIER DE MONTAGNES 'MINUET'	376	LILAS HYBRIDE 'DAPPLED DAWN'	77, 232
LAURIER DE MONTAGNES 'PINK FROST'	376	LILAS HYBRIDE 'EDWARD J. GARDNER'	77, 233
<i>Ledum canadense</i>	44, 221	LILAS HYBRIDE 'JOSÉE'	78
<i>Ledum groenlandicum</i>	44, 221	LILAS HYBRIDE 'KATHERINE HAVEMEYER'	78, 234
LEUCOTHOE ARC-EN-CIEL	341	LILAS HYBRIDE 'KRASAVITSA MOSKVY'	78, 234
<i>Leucothoe fontanesiana</i> 'Girard's Rainbow'	341	LILAS HYBRIDE 'LITTLE BOY BLUE'	78, 234
<i>Leucothoe fontanesiana</i> 'Rainbow'	341	LILAS HYBRIDE 'MADAME LEMOINE'	79, 235
LEUCOTHOE 'SCARLETTA'	341	LILAS HYBRIDE 'MARIE FRANCES'	78, 234
<i>Leucothoe</i> x 'Scarletta'	341	LILAS HYBRIDE 'MICHEL BUCHNER'	79, 234
<i>Leucothoe</i> x 'Zebliid'	341	LILAS HYBRIDE 'MISS ELLEM WILLMOTT'	79, 235
LIERRE ARBUSTIF 'BULGARIA'	364	LILAS HYBRIDE 'MONGE'	79, 235
LIERRE DE BOSTON	379	LILAS HYBRIDE 'MRS EDWARD HARDING'	79, 235
LIERRE DE BOSTON 'GREEN SHOWERS'	380	LILAS HYBRIDE 'NADEZHA'	79, 235
LIERRE DE BOSTON POURPRE	380	LILAS HYBRIDE 'PAUL THIRION'	79, 235
		LILAS HYBRIDE 'PINK ELIZABETH'	80, 235
		LILAS HYBRIDE 'PRAIRIE PETITE'	80, 236
		LILAS HYBRIDE 'PRÉSIDENT GREVY'	80, 236

LILAS HYBRIDE 'PRÉSIDENT POINCARÉ'	80, 236	<i>Magnolia sieboldii</i>	244, 319
LILAS HYBRIDE 'PRIMROSE'	80, 236	<i>Magnolia x soulangiana</i>	97, 244
LILAS HYBRIDE 'PRODIGE'	81, 236	<i>Magnolia x soulangiana</i> 'Rustica Rubra'	97, 245
LILAS HYBRIDE 'SENSATION'	81, 236	<i>Magnolia stellata</i>	97, 245
LILAS HYBRIDE 'SLATER'S ELEGANCE'	81, 236	<i>Magnolia stellata</i> 'Pink Star'	97, 245
LILAS HYBRIDE 'SOUVENIR DE LUDWIG SPAETH'	81, 236	<i>Magnolia stellata</i> 'Royal Star'	97, 245
LILAS HYBRIDE 'TINKERBELLE'	81, 237	<i>Magnolia stellata</i> 'Waterlily'	97, 245
LILAS HYBRIDE 'WEDGEWOOD BLUE'	81, 237	MAGNOLIA 'SUSAN'	97, 245
LILAS PLEUREUR 'HERS'	72, 229	<i>Magnolia x 'Susan'</i>	97, 245
LILAS SUPERBE	86, 239	MAGNOLIA 'YELLOW BIRD'	169, 286
<i>Liquidambar styraciflua</i>	189	MAHONIA À FEUILLES DE HOUX	319, 358
<i>Liriodendron tulipifera</i>	166	<i>Mahonia aquifolium</i>	319, 358
<i>Lonicera x brownii</i> 'Dropmore Scarlet'	158, 282	MAHONIA RAMPANT	319
<i>Lonicera caerulea edulis</i>	67	<i>Mahonia repens</i>	319
<i>Lonicera canadensis</i>	377	<i>Malus baccata</i> 'Columnaris'	135
<i>Lonicera dioica</i>	364	<i>Malus x 'Brandywine'</i>	143
<i>Lonicera x heckrottii</i> 'Gold Flame'	158, 338	<i>Malus x 'Candied Apple'</i>	143
<i>Lonicera x 'Honey Baby'</i>	197, 301	<i>Malus x 'Centurion'</i>	143
<i>Lonicera involucrata</i>	131, 324	<i>Malus x 'Courtabri'</i>	201
<i>Lonicera japonica</i> 'Aureoreticulata'	90	<i>Malus x 'Dolgo'</i>	143
<i>Lonicera japonica</i> 'Halliana'	90	<i>Malus x 'Harvest Gold'</i>	143
<i>Lonicera korolkowii</i> 'Abbotsford'	198	<i>Malus x 'Indian Magic'</i>	144
<i>Lonicera korolkowii</i> 'Blue Velvet'	198	<i>Malus x 'Lollipop'</i>	144
<i>Lonicera korolkowii</i> 'Honey Rose'	198	<i>Malus x 'Madonna'</i>	144
<i>Lonicera korolkowii zabellii</i>	198	<i>Malus x 'Makamik'</i>	144
<i>Lonicera x 'Mandarin'</i>	90, 242	<i>Malus x 'Maybride'</i>	144
<i>Lonicera x 'Marble King'</i>	301, 353	<i>Malus x 'Molten Lava'</i>	144
<i>Lonicera maximowiczii sachalinensis</i>	85, 239	<i>Malus x 'Pom'zia'</i>	201
<i>Lonicera morrowii</i>	206, 355	<i>Malus x 'Royal Beauty'</i>	144
<i>Lonicera x 'Novso'</i>	197, 301	<i>Malus x 'Royal Splendor'</i>	144
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Belgica Select'	90	<i>Malus x 'Rudolph'</i>	145
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Harlequin'	90	<i>Malus sargentii</i>	200
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina'	90	<i>Malus sargentii</i> 'Tina'	201
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Sherlite'	90	<i>Malus x 'Sargent Tina'</i>	201
<i>Lonicera x tellmanniana</i>	66, 314	<i>Malus x 'Sir Lancelot'</i>	145
<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf'	201	<i>Malus x 'Snowdrift'</i>	145
<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Mini Globe'	201	<i>Malus x 'Spring Snow'</i>	145
<i>Lonicera xylosteoides</i> 'Nana'	75	<i>Malus x 'Sugar Tyme'</i>	145
<i>Lonicera xylosteum</i> 'Compacta'	75	<i>Malus x 'Thunderchild'</i>	145
<i>Lonicera xylosteum</i> 'Emerald Mound'	75	<i>Malus x 'Wintergold'</i>	145

M

<i>Maackia amurensis</i>	176	MARRONNIER À FLEURS ROUGES 'BRIOTTI'	179, 291
MAACKIA DE L'AMOUR	176	MARRONNIER DE BAUMANN	181, 292
<i>Magnolia x brooklynensis</i> 'Yellow Bird'	169, 286	MARRONNIER D'INDE	181, 292
MAGNOLIA DE SIEBOLD	244, 319	MARRONNIER GLABRE	165
MAGNOLIA DE SOULANGE	97, 244	MAUVE EN ARBRE 'APHRODITE'	125
MAGNOLIA DE SOULANGE 'RUSTICA RUBRA'	97, 245	MAUVE EN ARBRE 'DIANA'	125
MAGNOLIA ÉTOILÉ	97, 245	MAUVE EN ARBRE 'MINERVA'	125
MAGNOLIA ÉTOILÉ 'PINK STAR'	97, 245	MAUVE EN ARBRE 'OISEAU BLEU'	125
MAGNOLIA ÉTOILÉ 'ROYAL STAR'	97, 245	MAUVE EN ARBRE 'RED HEART'	125
MAGNOLIA ÉTOILÉ 'WATERLILY'	97, 245	MAUVE EN ARBRE 'ROSALBANE'	125
MAGNOLIA KOBUS	169	MAUVE EN ARBRE 'WHITE CHIFFON'	126
<i>Magnolia kobus</i>	169	MAUVE EN ARBRE 'WOODBIDGE'	126
<i>Magnolia kobus stellata</i>	97, 245	MÊLÈZE DE DUNKLED	88
MAGNOLIA 'LEONARD MESSEL'	169, 286	MÊLÈZE D'EUROPE	101
<i>Magnolia x loebneri</i> 'Leonard Messel'	169, 286	MÊLÈZE D'EUROPE 'HORSTMANN'S RECURVED'	102
<i>Magnolia x loebneri</i> 'Merrill'	170, 286	MÊLÈZE D'EUROPE PLEUREUR	102
MAGNOLIA 'MERRILL'	170, 286	MÊLÈZE D'EUROPE 'PULI'	102
		MÊLÈZE DU JAPON	87, 240
		MÊLÈZE DU JAPON 'BLUE BALL'	87, 240
		MÊLÈZE DU JAPON 'BLUE DWARF'	87, 240

MÉLÈZE DU JAPON 'BLUE RABBIT'	87, 240
MÉLÈZE DU JAPON 'DIANE'	87, 240
MÉLÈZE DU JAPON 'JAKOBSEN'S PYRAMID'	87, 240
MÉLÈZE DU JAPON NAIN	88, 240
MÉLÈZE DU JAPON PLEUREUR	88, 241
MÉLÈZE DU JAPON 'STIFF WEeping'	88, 241
MÉLÈZE LARICIN	202
MÉLÈZE LARICIN 'BLUE WEeping'	202
MÉLÈZE LARICIN 'NEWPORT BEAUTY'	202
MÉLÈZE 'VARIED DIRECTIONS'	88
MÉNISPERME DU CANADA	320
<i>Menispermum canadense</i>	320
MÉTASÉQUOIA	173, 288
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	173, 288
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Golden Mantle'	288
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Golden Ogi'	288
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Gold Rush'	288
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Ogon'	288
MÉTASÉQUOIA 'GOLD RUSH'	288
MICOCOULIER OCCIDENTAL	141, 270
<i>Microbiota decussata</i>	376
MILLEPERTUIS DE KALM	46, 222
MILLEPERTUIS DE KALM 'AMES'	46, 222
<i>Morus alba</i>	59, 225
<i>Morus alba</i> 'Chapparal'	59, 225
<i>Morus alba</i> 'Greenwave'	59, 225
<i>Morus alba</i> 'Macrophylla'	59, 225
<i>Morus alba</i> 'Pendula'	59, 225
<i>Morus latifolia</i> 'Spirata'	60
MÛRIER BLANC	59, 225
MÛRIER BLANC 'CHAPPARAL'	59, 225
MÛRIER BLANC 'GREENWAVE'	59, 225
MÛRIER BLANC 'MACROPHYLLA'	59, 225
MÛRIER BLANC 'PENDULA'	59, 225
MÛRIER ZIGZAG	60
<i>Myrica gale</i>	42, 309
<i>Myrica pensylvanica</i>	35, 307
MYRTE DES MARAIS	42, 309

N

NOISETIER CHINOIS TORTUEUX	137, 330
NOISETIER COMMUN	137, 330
NOISETIER COMMUN DORÉ	269
NOISETIER COMMUN 'ROTE ZELLER'	137
NOISETIER D'AMÉRIQUE	84, 239
NOISETIER DE BYZANCE	71, 229
NOISETIER DE BYZANCE POURPRE	72, 229
NOISETIER POURPRE	169
NOYER CENDRÉ	134
NOYER COMMUN	135
NOYER NOIR	135

O

OLIVIER DE BOHÈME	56
ORME À FEUILLES DE CHARME	60
ORME CHINOIS	380
ORME DE SIBÉRIE 'PARK ROYAL'	380
ORME DE VIRGINIE	377
ORME DE VIRGINIE DORÉ	378

ORME 'DISCOVERY'	204
ORME 'HOMESTEAD'	204
ORME 'JACQUELINE HILLIER'	61
ORME 'MORTON'	204
ORME 'PATRIOT'	204
ORME 'PIONEER'	204
ORME PLEUREUR	136
ORME 'PROSPECTOR'	204
ORME ROUGE	137
OSIER DES VANNIERS	142
<i>Ostrya virginiana</i>	371
OSTRYER DE VIRGINIE	371

P

<i>Pachistima canbyi</i>	113, 321
PACHISTIMA DE CANBY	113, 321
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	367
<i>Parthenocissus quinquefolia engelmannii</i>	367
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> 'Monham'	368
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> 'Star Showers'	368
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	379
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Atropurpurea'	380
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Green Showers'	380
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Green Spring'	380
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii'	380
<i>Paxistima canbyi</i>	113, 321
PEUPLIER ARGENTÉ PYRAMIDAL	210
PEUPLIER BAUMIER	211
PEUPLIER DE BERLIN	211
PEUPLIER DE THÉVESSA	211
PEUPLIER D'ITALIE	211
PEUPLIER 'EUGENÉ'	214
PEUPLIER 'PRAIRIE SKY'	214
PEUPLIER 'ROBUSTA'	214
PEUPLIER 'SOUIXLAND'	214
PEUPLIER 'TOWER'	198
PEUPLIER TREMBLE FASTIGIÉ	204
<i>Phellodendron amurense</i>	135
<i>Phellodendron amurense</i> 'Macho'	135
PHELLODENDRON DE L'AMOUR	135
PHELLODENDRON DE L'AMOUR 'MACHO'	135
<i>Philadelphus</i> x 'Blizzard'	138, 330
<i>Philadelphus</i> x 'Bouquet Blanc'	138, 330
<i>Philadelphus</i> x 'Buckley's Quill'	138, 331
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus'	232
<i>Philadelphus</i> x 'Dwarf Snowflake'	139, 331
<i>Philadelphus x falconeri</i> 'Frosty Morn'	138, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Frosty Morn'	138, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Innocence'	139, 331
<i>Philadelphus lewisii</i> 'Blizzard'	138, 330
<i>Philadelphus lewisii</i> 'Snow Velvet'	139, 331
<i>Philadelphus lewisii</i> 'Waterton'	140, 332
<i>Philadelphus</i> x 'Miniature Snowflake'	139, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Minnesota Snowflake'	139, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Pekhill'	140
<i>Philadelphus</i> x 'Silberregen'	139, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Silver Showers'	139, 331
<i>Philadelphus</i> x 'Snowbelle'	139, 332
<i>Philadelphus</i> x 'Snowgoose'	140, 332

<i>Philadelphus</i> x 'Snow Velvet'	139, 331	<i>Picea glauca</i> 'Jean's Dilly'	210, 305
<i>Philadelphus tomentosus</i> 'White Rock'	140, 332	<i>Picea glauca</i> 'North Star'	210, 305
<i>Philadelphus</i> x 'Virginal'	140, 332	<i>Picea glauca</i> 'Pendula'	210, 305
<i>Philadelphus</i> x <i>virginialis</i> 'Virginal'	140, 332	<i>Picea glauca</i> 'Pixie'	210, 305
<i>Philadelphus</i> x 'Waterton'	140, 332	<i>Picea glauca</i> 'Rainbow's End'	210, 305
<i>Philadelphus</i> x 'White Rock'	140, 332	<i>Picea glauca</i> 'Sander's Blue'	210, 306
<i>Philadelphus</i> x 'Yellow Hill'	140, 332	<i>Picea mariana</i>	190
PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER	38, 218	<i>Picea mariana</i> 'Aurea'	190
PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER JAUNES	39, 219	<i>Picea mariana</i> 'Beissneri'	191
PHYSOCARPE 'DART'S GOLD'	218	<i>Picea mariana</i> 'Ericoides'	191
PHYSOCARPE 'DIABOLO'	38, 219	<i>Picea mariana</i> 'Golden'	190
PHYSOCARPE NAIN	361	<i>Picea omorika</i>	189, 298
PHYSOCARPE 'NUGGET'	39, 219	<i>Picea omorika</i> 'Nana'	190, 298
PHYSOCARPE 'SUMMER WINE'	39, 219	<i>Picea omorika</i> 'Pendula'	190, 298
PHYSOCARPE 'TILDEN PARK'	39, 219	<i>Picea omorika</i> 'Pendula Burns'	190, 298
<i>Physocarpus monogynus</i>	361	<i>Picea omorika</i> 'Pimoko'	190, 298
<i>Physocarpus opulifolius</i>	38, 218	<i>Picea orientalis</i> 'Shadow's Broom'	127, 323
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold'	218	<i>Picea orientalis</i> 'Skylands'	259
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'	38, 219	<i>Picea pungens</i>	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Golden Nugget'	39, 219	<i>Picea pungens</i> 'Baby Blues Eyes'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Luteus'	39, 219	<i>Picea pungens</i> 'Bakerii'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Monlo'	219	<i>Picea pungens</i> 'Blue Pearl'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Nanus'	361	<i>Picea pungens</i> 'Fastigiata'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Nugget'	39, 219	<i>Picea pungens</i> 'Fat Albert'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Summer Wine'	39, 219	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	105
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Tilden Park'	39, 219	<i>Picea pungens</i> 'Glauca Globosa'	106
<i>Picea abies</i>	102	<i>Picea pungens</i> 'Glauca Pendula'	106
<i>Picea abies</i> 'Aarburg'	102	<i>Picea pungens</i> 'Hoopsii'	106
<i>Picea abies</i> 'Acrocona'	102	<i>Picea pungens</i> 'Iseli Fastigiata'	106
<i>Picea abies</i> 'Cincinnati'	103	<i>Picea pungens</i> 'Iseli Foxtail'	106
<i>Picea abies</i> 'Clanbrassiliana Stricta'	103	<i>Picea pungens</i> 'Koster'	106
<i>Picea abies</i> 'Cobra'	103	<i>Picea pungens</i> 'Mesa Verde'	106
<i>Picea abies</i> 'Cupressina'	103	<i>Picea pungens</i> 'Mission Blue'	106
<i>Picea abies</i> 'Elegantissima'	103	<i>Picea pungens</i> 'Moerheimii'	106
<i>Picea abies</i> 'Formanek'	103	<i>Picea pungens</i> 'Montgomery'	107
<i>Picea abies</i> 'Hillside Upright'	103	<i>Picea pungens</i> 'Mrs Cesarini'	107
<i>Picea abies</i> 'Inversa'	103	<i>Picea pungens</i> 'Pendula'	106
<i>Picea abies</i> 'Little Gem'	103	<i>Picea pungens</i> 'Procumbens'	106
<i>Picea abies</i> 'Mucronata'	103	<i>Picea pungens</i> 'R.H. Montgomery'	107
<i>Picea abies</i> 'Nidiformis'	103	<i>Picea pungens</i> 'Royal Knight'	107
<i>Picea abies</i> 'Ohlendorfii'	104	<i>Picea pungens</i> 'Saint Mary's Broom'	107
<i>Picea abies</i> 'Pendula'	104	<i>Picea pungens</i> 'Shilo Weeping'	107
<i>Picea abies</i> 'Pendula Major'	104	<i>Picea pungens</i> 'Thompssen'	107
<i>Picea abies</i> 'Pendula Monstrosa'	104	<i>Picea pungens</i> 'Thompssenii'	107
<i>Picea abies</i> 'Pumila'	104	<i>Picea pungens</i> 'Thomson'	107
<i>Picea abies</i> 'Repens'	104	<i>Picea pungens</i> 'Thuem'	108
<i>Picea abies</i> 'Rubra Spicata'	104	<i>Picea pungens</i> 'Thume'	108
<i>Picea abies</i> 'Sherwood Compact'	104	<i>Picea pungens</i> 'Tiffin'	108
<i>Picea abies</i> 'Tabuliformis'	104	<i>Picea sitchensis</i> 'Tenas'	35
<i>Picea abies</i> 'Virgata'	104	<i>Pieris japonica</i> 'Cavatine'	264, 324
<i>Picea abies</i> 'Witch's Brood'	105	<i>Pieris japonica</i> 'Mountain Fire'	264, 324
<i>Picea alba</i>	209, 304	<i>Pieris japonica</i> 'Nocturne'	264, 324
<i>Picea canadensis</i>	209, 304	<i>Pieris japonica</i> 'Prelude'	264, 325
<i>Picea glauca</i>	209, 304	<i>Pieris japonica</i> 'Shojo'	264, 325
<i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe'	209, 304	<i>Pieris japonica</i> 'Variegata'	131, 325
<i>Picea glauca albertiana</i> 'Conica'	209, 305	<i>Pieris japonica yakushimanum</i> 'Cavatine'	264, 324
<i>Picea glauca</i> 'Coerulea'	209, 304	<i>Pieris japonica yakushimanum</i> 'Nocturne'	264, 324
<i>Picea glauca</i> 'Conica'	209, 305	<i>Pieris japonica yakushimanum</i> 'Prelude'	264, 325
<i>Picea glauca</i> 'Densata'	209, 305	PIMBINA	176, 345
<i>Picea glauca</i> 'Echiniformis'	210, 305	PIMBINA 'ALFREDO'	176, 345

PIMBINA NAIN	176, 345	PIN SYLVESTRE GLAUQUE NAIN	111
PIMBINA 'WENTWORTH'	177, 345	PIN SYLVESTRE 'GLOBOSA VIRIDIS'	111
PIN À CÔNES ÉPINEUX	38	PIN SYLVESTRE 'HILLSIDE CREEPER'	111
PIN À ÉCORCE BLANCHE 'ALGONQUIN PILLAR'	360	PIN SYLVESTRE 'MITSCH WEeping'	111
PIN BLANC	109, 249	PIN SYLVESTRE RAMPANT	111
PIN BLANC 'BLUE SHAG'	109, 249	PIN SYLVESTRE 'VIRIDIS COMPACTA'	111
PIN BLANC 'GOLDEN CANDLES'	109, 249	PIN SYLVESTRE 'WATERERI'	111
PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ	109, 249	PIN TORTUEUX 'SPAAN'S DWARF'	39, 220
PIN BLANC JAPONAIS BLEUTÉ NAIN	109, 249	PIN TORTUEUX 'TAYLOR'S SUNBURST'	39, 220
PIN BLANC JAPONAIS 'TEMPELHOF'	109, 249	<i>Pinus albicaulis</i> 'Algonquin Pillar'	360
PIN BLANC NAIN	109, 249	<i>Pinus aristata</i>	38
PIN BLANC PLEUREUR	110, 249	<i>Pinus banksiana</i>	36
PIN BLANC 'PYGMAEA'	110, 250	<i>Pinus banksiana</i> 'Manomet'	36
PIN BLANC 'SEA URCHIN'	110, 250	<i>Pinus banksiana</i> 'Schoodic'	36
PIN BLANC TORTUEUX	109, 249	<i>Pinus cembra</i>	71, 228
PIN BLANC 'WHITE MOUNTAIN'	110, 250	<i>Pinus cembra</i> 'Blue Mound'	71, 228
PIN CEMBRO	71, 228	<i>Pinus cembra</i> 'Compacta Glauca'	71, 229
PIN CEMBRO 'BLUE MOUND'	71, 228	<i>Pinus cembra</i> 'Nana'	71, 229
PIN CEMBRO 'COMPACTA GLAUCA'	71, 229	<i>Pinus contorta</i> 'Spaan's Dwarf'	39, 220
PIN CEMBRO NAIN	71, 229	<i>Pinus contorta</i> 'Taylor's Sunburst'	39, 220
PIN DE MACÉDOINE	88, 241	<i>Pinus densiflora</i> 'Globosa'	108
PIN DE VIRGINIE 'WATES GOLDEN'	41	<i>Pinus densiflora</i> 'Little Christopher'	108
PIN DES MONTAGNES 'BIG TUNA'	64, 312	<i>Pinus densiflora</i> 'Oculus Draconis'	108
PIN DES MONTAGNES 'GNOM'	64, 312	<i>Pinus densiflora</i> 'Pendula'	108
PIN DES MONTAGNES 'HONEYCOMB'	64, 312	<i>Pinus densiflora</i> 'Soft Green'	108
PIN DES MONTAGNES 'MOPS'	64, 312	<i>Pinus divaricata</i>	36
PIN DES MONTAGNES NAIN	65, 312	<i>Pinus flexilis</i> 'Extra Blue'	88
PIN DES MONTAGNES 'PAUL'S DWARF'	65, 312	<i>Pinus flexilis</i> 'Glauca Pendula'	88
PIN DES MONTAGNES 'POT O' GOLD'	65, 312	<i>Pinus flexilis</i> 'Pendula'	88
PIN DES MONTAGNES RAMPANT	47, 312	<i>Pinus flexilis</i> 'Vanderwolf Pyramid'	88
PIN DES MONTAGNES 'SHERWOOD COMPACT'	65, 313	<i>Pinus mugo</i> 'Big Tuna'	64, 312
PIN DES MONTAGNES 'SLOWMOUND'	65, 313	<i>Pinus mugo</i> 'Gnom'	64, 312
PIN DES MONTAGNES 'TANNENBAUM'	65, 313	<i>Pinus mugo</i> 'Honeycomb'	64, 312
PIN DES MONTAGNES 'TEENY'	65, 313	<i>Pinus mugo</i> 'Mops'	64, 312
PIN DES MONTAGNES 'WHITE BUD'	65, 313	<i>Pinus mugo mughus</i>	65, 312
PIN FLEXIBLE 'EXTRA BLUE'	88	<i>Pinus mugo</i> 'Paul's Dwarf'	65, 312
PIN FLEXIBLE 'GLAUCA PENDULA'	88	<i>Pinus mugo</i> 'Pot O' Gold'	65, 312
PIN FLEXIBLE PLEUREUR	88	<i>Pinus mugo pumilio</i>	47, 312
PIN FLEXIBLE 'VANDERWOLF'S PYRAMID'	88	<i>Pinus mugo</i> 'Sherwood Compact'	65, 313
PIN GRIS	36	<i>Pinus mugo</i> 'Slowmound'	65, 313
PIN GRIS 'MANOMET'	36	<i>Pinus mugo</i> 'Tannenbaum'	65, 313
PIN GRIS 'SCHOODIC'	36	<i>Pinus mugo</i> 'Teeny'	65, 313
PIN NAIN DE SIBÉRIE 'DWARF BLUE'	314	<i>Pinus mugo</i> 'White Bud'	65, 313
PIN NOIR D'AUTRICHE	194	<i>Pinus nigra austriaca</i>	194
PIN NOIR 'HORNIBROOKIANA'	109, 248	<i>Pinus nigra</i> 'Hornibrookiana'	109, 248
PIN NOIR JAPONAIS 'THUNDERHEAD'	65	<i>Pinus parviflora</i> 'Glauca'	109, 249
PIN ROUGE	33	<i>Pinus parviflora</i> 'Glauca Nana'	109, 249
PIN ROUGE 'DON SMITH'	33	<i>Pinus parviflora</i> 'Goldilocks'	109, 249
PIN ROUGE 'MOREL'	33	<i>Pinus parviflora</i> 'Tempelhof'	109, 249
PIN ROUGE JAPONAIS GLOBE	108	<i>Pinus peuce</i>	88, 241
PIN ROUGE JAPONAIS 'LITTLE CHRISTOPHER'	108	<i>Pinus pumila</i> 'Dwarf Blue'	314
PIN ROUGE JAPONAIS 'OCULIS DRACONIS'	108	<i>Pinus pumila</i> 'Nana'	314
PIN ROUGE JAPONAIS PLEUREUR	108	<i>Pinus resinosa</i>	33
PIN ROUGE JAPONAIS 'SOFT GREEN'	108	<i>Pinus resinosa</i> 'Don Smith'	33
PIN SYLVESTRE	110	<i>Pinus resinosa</i> 'Morel'	33
PIN SYLVESTRE 'ALBYN PROSTRATA'	110	<i>Pinus rigida</i> 'Sand Beach'	33
PIN SYLVESTRE 'BEUVRONENSIS'	110	<i>Pinus strobus</i>	109
PIN SYLVESTRE 'BONNA'	110	<i>Pinus strobus</i> 'Blue Shag'	109, 249
PIN SYLVESTRE DORÉ	110	<i>Pinus strobus</i> 'Contorta'	109, 249
PIN SYLVESTRE FASTIGIÉ	110	<i>Pinus strobus</i> 'Golden Candles'	109, 249

<i>Pinus strobus</i> 'Nana'	109, 249	<i>Populus x canadensis</i> 'Prairie Sky'	214
<i>Pinus strobus</i> 'Pendula'	110, 249	<i>Populus x canadensis</i> 'Robusta'	214
<i>Pinus strobus</i> 'Pygmaea'	110, 250	<i>Populus x canadensis</i> 'Souixland'	214
<i>Pinus strobus</i> 'Sea Urchin'	110, 250	<i>Populus canadensis</i> 'Tower'	198
<i>Pinus strobus</i> 'Torulosa'	109, 249	<i>Populus x euramericana</i> 'Eugenei'	214
<i>Pinus strobus</i> 'White Mountain'	110, 250	<i>Populus x euramericana</i> 'Prairie Sky'	214
<i>Pinus sylvestris</i>	110	<i>Populus x euramericana</i> 'Robusta'	214
<i>Pinus sylvestris</i> 'Albyn'	110	<i>Populus x euramericana</i> 'Souixland'	214
<i>Pinus sylvestris</i> 'Albyn Prostrata'	110	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	211
<i>Pinus sylvestris</i> 'Albyn's'	110	<i>Populus nigra</i> 'Thevestina'	211
<i>Pinus sylvestris</i> 'Aurea'	110	<i>Populus tremula</i> 'Erecta'	204
<i>Pinus sylvestris</i> 'Beuvronensis'	110	<i>Potentilla fruticosa</i>	120
<i>Pinus sylvestris</i> 'Bonna'	110	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	120
<i>Pinus sylvestris</i> 'Fastigiata'	110	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Coronation Triumph'	120
<i>Pinus sylvestris</i> 'Glauca Nana'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Floppy Disk'	121, 255
<i>Pinus sylvestris</i> 'Globosa Viridis'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Gold Carpet'	121
<i>Pinus sylvestris</i> 'Hillside Creeper'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	121
<i>Pinus sylvestris</i> 'Mitsch Weeping'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstar'	121
<i>Pinus sylvestris</i> 'Repens'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldteppich'	121
<i>Pinus sylvestris</i> 'Viridis Compacta'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Jackman'	121
<i>Pinus sylvestris</i> 'Watereri'	111	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Jackman's Variety'	121
<i>Pinus thunbergii</i> 'Thunderhead'	65	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Lovely Pink'	255
<i>Pinus virginiana</i> 'Wates Golden'	41	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Mango Tango'	121, 255
PITCHPIN DU NORD 'SAND BEACH'	33	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Marrob'	122, 256
POIRIER 'ARISTOCRAT'	123	<i>Potentilla fruticosa</i> 'McKay's White'	121
POIRIER 'BRADFORD'	123	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Mount Everest'	121
POIRIER 'CAPITAL'	123	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Orangeade'	122, 255
POIRIER 'CHANTICLEER'	123	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Orange Whisper'	121, 255
POIRIER D'ORNEMENT PLEUREUR	60	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Beauty'	255
POIRIER 'REDSPIRE'	123	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Princess'	255
POIS DE SIBÉRIE	194	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Whisper'	122, 256
POIS DE SIBÉRIE PLEUREUR	193	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Primerose Beauty'	256
POMMETIER 'BRANDYWINE'	143	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace'	256
POMMETIER 'CANDIED APPLE'	143	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Robin'	122, 256
POMMETIER 'CENTURION'	143	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Snowbird'	122
POMMETIER DE SARGENT	200	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sundance'	122
POMMETIER DE SARGENT NAIN	201	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Tangerine'	256
POMMETIER DE SIBÉRIE COLONNAIRE	135	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Uman'	121, 255
POMMETIER 'DOLGO'	143	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Yellow Bird'	122
POMMETIER 'HARVEST GOLD'	143	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Yellow Gem'	122
POMMETIER 'INDIAN MAGIC'	144	POTENTILLE 'ABBOTSWOOD'	120
POMMETIER 'LOLLOPOP'	144	POTENTILLE 'CORONATION TRIUMPH'	120
POMMETIER 'MADONNA'	144	POTENTILLE DE JACKMAN	121
POMMETIER 'MAKAMIK'	144	POTENTILLE 'FLOPPY DISK'	121, 255
POMMETIER 'MAYBRIDE'	144	POTENTILLE FRUTESCENTE	120
POMMETIER 'MOLTEN LAVA'	144	POTENTILLE 'GOLD CARPET'	121
POMMETIER 'POM'ZIA'	201	POTENTILLE 'GOLDFINGER'	121
POMMETIER 'ROYAL BEAUTY'	144	POTENTILLE 'GOLDSTAR'	121
POMMETIER 'ROYAL SPLENDOR'	144	POTENTILLE 'MANGO TANGO'	121, 255
POMMETIER 'RUDOLPH'	145	POTENTILLE 'MCKAY'S WHITE'	121
POMMETIER 'SIR LANCELOT'	145	POTENTILLE 'MOUNT EVEREST'	121
POMMETIER 'SNOWDRIFT'	145	POTENTILLE 'ORANGEADE'	122, 255
POMMETIER 'SPRING SNOW'	145	POTENTILLE 'ORANGE WHISPER'	121, 255
POMMETIER 'SUGAR TYME'	145	POTENTILLE 'PINK BEAUTY'	255
POMMETIER 'THUNDERCHILD'	145	POTENTILLE 'PINK PRINCESS'	255
POMMETIER 'WINTERGOLD'	145	POTENTILLE 'PINK WHISPER'	122, 256
<i>Populus alba</i> 'Pyramidalis'	210	POTENTILLE 'PRIMEROSE BEAUTY'	256
<i>Populus balsamifera</i>	211	POTENTILLE 'RED ACE'	256
<i>Populus x berolinensis</i>	211	POTENTILLE 'RED ROBIN'	122, 256
<i>Populus x canadensis</i> 'Eugenei'	214	POTENTILLE 'SNOWBIRD'	122

POTENTILLE 'SUNDANCE'	
POTENTILLE 'TANGERINE'	
POTENTILLE 'YELLOW BIRD'	
POTENTILLE 'YELLOW GEM'	
PRUCHE DU CANADA	
PRUCHE DU CANADA 'ALBOSPICA'	
PRUCHE DU CANADA 'BENNETT'	
PRUCHE DU CANADA 'CLOUD PRUNE'	
PRUCHE DU CANADA 'COLE'S PROSTRATE'	
PRUCHE DU CANADA 'DAWSONIANA'	
PRUCHE DU CANADA 'GENEVA'	
PRUCHE DU CANADA 'GENTSCH WHITE'	
PRUCHE DU CANADA 'GOLDEN SPLENDOR'	170, 286
PRUCHE DU CANADA 'GRACILIS'	373
PRUCHE DU CANADA 'HORSFORD CONTORTED'	373
PRUCHE DU CANADA 'JACQUELINE VERKADE'	373
PRUCHE DU CANADA 'JEDDELOH'	373
PRUCHE DU CANADA 'JERVIS'	373
PRUCHE DU CANADA 'KELSEY'S WEEPING'	373
PRUCHE DU CANADA 'MINUTA'	373
PRUCHE DU CANADA 'MOON FROST'	341
PRUCHE DU CANADA NAIN	373
PRUCHE DU CANADA 'NEW GOLD'	341
PRUCHE DU CANADA PLEUREUSE	373
PRUCHE DU CANADA 'SLENDERELLA'	374
PRUCHE DU CANADA 'STOCKMAN'S DWARF'	374
PRUCHE DU CANADA 'SUMMER SNOW'	341
PRUCHE DU JAPON	360
PRUNIER DES SABLES POURPRE	360
PRUNIER NOIR	200, 301
PRUNUS BESSEYI	27
<i>Prunus besseyi</i>	27
<i>Prunus cerasifera</i> 'Hessei'	85
<i>Prunus cerasifera</i> 'Newport'	85
<i>Prunus x cistena</i>	75
<i>Prunus depressa</i>	63
PRUNUS DE VIRGINIE	197
PRUNUS DE VIRGINIE 'CANADA RED'	197
PRUNUS DE VIRGINIE 'SHUBERT'	197
PRUNUS 'HESSEI'	85
<i>Prunus maackii</i>	179, 346
PRUNUS 'NEWPORT'	85
<i>Prunus nigra</i>	85
<i>Prunus padus</i>	201, 301
<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	201, 301
<i>Prunus padus</i> 'Commutata'	201, 302
<i>Prunus padus</i> 'Skinner's Red'	201
<i>Prunus sargentii</i>	136
<i>Prunus sargentii</i> 'Rancho'	136
<i>Prunus serotina</i>	93
<i>Prunus tenella</i> 'Fire Hill'	57, 224
<i>Prunus tomentosa</i>	75, 316
<i>Prunus triloba</i> 'Multiplex'	146
<i>Prunus virginiana</i>	197
<i>Prunus virginiana</i> 'Canada Red'	197
<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	197
<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert Select'	197
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Carnefix Weeping'	89, 241
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Emerald Twister'	89, 241
<i>Pseudotsuga menziesii glauca</i>	89, 241

122	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Loggerhead'	89, 241
256	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pendula'	89, 242
122	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Torquis'	89, 241
122	<i>Ptelea trifoliata</i>	377
372	<i>Ptelea trifoliata</i> 'Aurea'	378
286, 341	<i>Pyracantha</i> x 'Yukon Belle'	120, 255
341	<i>Pyrus calleryana</i> 'Aristocrat'	123
372	<i>Pyrus calleryana</i> 'Bradford'	123
372	<i>Pyrus calleryana</i> 'Capital'	123
373	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	123
373	<i>Pyrus calleryana</i> 'Redspire'	123
341	<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'	60

Q

<i>Quercus alba</i>	167, 285
<i>Quercus bicolor</i>	163, 271
<i>Quercus borealis</i>	189, 297
<i>Quercus coccinea</i>	41
<i>Quercus coccinea</i> 'Splendens'	42
<i>Quercus macrocarpa</i>	176
<i>Quercus palustris</i>	186
<i>Quercus pedunculata</i>	167
<i>Quercus robur</i>	167
<i>Quercus robur</i> 'Crimschmidt'	167
<i>Quercus robur</i> 'Crimson Spire'	167
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	167
<i>Quercus robur</i> 'Tortuosa'	167
<i>Quercus rubra</i>	187, 297

R

RAISIN D'OURS	361
RAISIN D'OURS 'MASSACHUSETTS'	361
RAISIN D'OURS 'POINT REYES'	361
RAISIN D'OURS 'VANCOUVER JADE'	361
<i>Rhamnus frangula</i> 'Asplenifolia'	118, 254
<i>Rhododendron</i> x 'Aglo'	133, 329
RHODODENDRON 'APRIL DAWN'	132, 325
<i>Rhododendron</i> x 'April Dawn'	132, 325
RHODODENDRON 'APRIL MIST'	132, 325
<i>Rhododendron</i> x 'April Mist'	132, 325
RHODODENDRON 'APRIL ROSE'	132, 325
<i>Rhododendron</i> x 'April Rose'	132, 325
RHODODENDRON 'BESSE HOWELLS'	264, 325
<i>Rhododendron</i> x 'Besse Howells'	264, 325
RHODODENDRON 'BLACK SATIN'	132, 325
<i>Rhododendron</i> x 'Black Satin'	132, 325
RHODODENDRON 'BOULE DE NEIGE'	264, 325
<i>Rhododendron</i> x 'Boule de Neige'	264, 325
<i>Rhododendron canadense</i>	44
<i>Rhododendron canadense alba</i>	44
RHODODENDRON 'CATAWBIENSE ALBUM'	265, 326
<i>Rhododendron</i> x 'Catawbiense Album'	265, 326
RHODODENDRON 'CATAWBIENSE BOURSALT'	265, 326
<i>Rhododendron</i> x 'Catawbiense Boursault'	265, 326
RHODODENDRON 'CRETE'	267, 330
RHODODENDRON DU CANADA	44
RHODODENDRON DU CANADA BLANC	44
RHODODENDRON 'ELVIIRA'	265, 326
RHODODENDRON 'ENGLISH ROSEUM'	265, 326

<i>Rhododendron</i> x 'English Roseum'	265, 326	<i>Rhododendron</i> série Finnish	
<i>Rhododendron</i> x 'Golden Lights'	191, 348	'Pohjolan Tytär'	266, 327
RHODODENDRON 'HAAGA'	265, 326	<i>Rhododendron schlippenbachii</i>	298, 350
RHODODENDRON 'HELLIKKI'	265, 326	<i>Rhododendron</i> x 'Spicy Lights'	192, 350
RHODODENDRON 'HELSINKI UNIVERSITY'	266, 326	<i>Rhododendron</i> x 'St Michel'	266, 326
RHODODENDRON 'HENRY'S RED'	266, 327	<i>Rhododendron</i> x 'Tri-Lights'	192, 350
<i>Rhododendron</i> x 'Henry's Red'	266, 327	<i>Rhododendron</i> x 'Western Lights'	192, 350
RHODODENDRON IMPEDITUM	266, 327	RHODODENDRON 'WESTON'S AGLO'	133, 329
<i>Rhododendron impeditum</i>	266, 327	<i>Rhododendron</i> x 'Weston's Aglo'	133, 329
RHODODENDRON 'KEN JANECK'	268, 330	<i>Rhododendron</i> x 'Weston's Innocence'	192, 350
<i>Rhododendron</i> x 'Lemon Lights'	191, 348	<i>Rhododendron</i> x 'Weston's Lollipop'	193, 350
<i>Rhododendron</i> x 'Mandarin Lights'	191, 349	RHODODENDRON 'WESTON PINK DIAMOND'	133, 329
<i>Rhododendron</i> x 'Maximum Roseum'	266, 328	<i>Rhododendron</i> x 'Weston Pink Diamond'	133, 329
RHODODENDRON 'MIKKELI'	266, 326	<i>Rhododendron</i> x 'White Lights'	193, 350
RHODODENDRON 'MIST MAIDEN'	268, 330	RHODODENDRON 'YAKU ANGEL'	267, 329
<i>Rhododendron</i> x 'Northern Hi-Lights'	191, 249	<i>Rhododendron</i> x 'Yaku Angel'	267, 329
<i>Rhododendron</i> x 'Northern Lights'	191, 249	RHODODENDRON 'YAKU PRINCE'	267, 329
RHODODENDRON 'NORTHERN STAR BURST'	132, 327	<i>Rhododendron</i> x 'Yaku Prince'	267, 329
<i>Rhododendron</i> x 'Northern Star Burst'	132, 327	RHODODENDRON 'YAKU PRINCESS'	267, 329
RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA'	266, 327	<i>Rhododendron</i> x 'Yaku Princess'	267, 329
<i>Rhododendron</i> x 'Nova Zembra'	266, 327	<i>Rhododendron yakushmanum</i> 'Crete'	267, 330
RHODODENDRON 'OLGA MEZITT'	132, 327	<i>Rhododendron yakushmanum</i> 'Ken Janeck'	268, 330
<i>Rhododendron</i> x 'Olga Mezitt'	132, 327	<i>Rhododendron yakushmanum</i> 'Mist Maiden'	268, 330
<i>Rhododendron</i> x 'Orchid Lights'	192, 349	<i>Rhodora canadense</i>	44
<i>Rhododendron</i> x 'Pink and Sweet'	192, 349	RHODOTYPOS À PERLES NOIRES	379
<i>Rhododendron</i> x 'Pink Lights'	192, 349	<i>Rhodotypos scandens</i>	379
<i>Rhododendron</i> x 'Peter Tigerstedt'	266, 327	<i>Rhus aromatica</i>	198, 353
RHODODENDRON 'PJM'	132, 328	<i>Rhus aromatica</i> 'Grow Low'	198, 353
<i>Rhododendron</i> x 'PJM'	132, 328	<i>Rhus cotinus</i>	55
RHODODENDRON 'PJM COMPACT'	132, 328	<i>Rhus glabra</i>	67
<i>Rhododendron</i> x 'PJM Compact'	132, 328	<i>Rhus glabra</i> 'Laciniata'	67
RHODODENDRON 'PJM ELITE'	132, 328	<i>Rhus typhina</i>	28, 216
<i>Rhododendron</i> x 'PJM Elite'	132, 328	<i>Rhus thyphina</i> 'Bailtiger'	28, 307
<i>Rhododendron</i> x 'P.J. Mezitt'	132, 328	<i>Rhus thyphina</i> 'Dissecta'	28, 216
RHODODENDRON 'PJM REGAL'	133, 328	<i>Rhus typhina</i> 'Laciniata'	28, 216
<i>Rhododendron</i> x 'PJM Regal'	133, 328	<i>Rhus typhina</i> 'Tiger Eyes'	28, 307
RHODODENDRON 'PJM VICTOR'	133, 328	<i>Ribes alpinum</i>	368
<i>Rhododendron</i> x 'PJM Victor'	133, 328	<i>Ribes alpinum</i> 'Green Jeans'	368
RHODODENDRON 'P.M.A. TIGERSTEDT'	266, 327	<i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt'	368
<i>Rhododendron</i> x 'Pohjola's Daughter'	266, 327	<i>Ribes alpinum</i> 'Spreg'	368
RHODODENDRON 'POHJOLAN TYTÄR'	266, 327	<i>Ribes aureum</i>	375
RHODODENDRON 'PONTICUM ROSEUM'	266, 328	<i>Ribes odoratum</i>	215, 306
<i>Rhododendron</i> x 'Ponticum Roseum'	266, 328	<i>Ribes sanguineum</i> 'King Edward VII'	362
<i>Rhododendron</i> x 'Popsicle'	192, 350	<i>Robinia hispida</i>	57
RHODODENDRON 'PURPLE GEM'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	66
<i>Rhododendron</i> x 'Purple Gem'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	66, 227
RHODODENDRON 'RAMAPO'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Purple Crown'	67
<i>Rhododendron</i> x 'Ramapo'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Purple Robe'	67
RHODODENDRON 'ROSEUM ELEGANS'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	67
<i>Rhododendron</i> x 'Roseum Elegans'	267, 328	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Twist Baby'	67
<i>Rhododendron</i> x 'Roseum Pink'	265, 326	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	67
<i>Rhododendron</i> x 'Rosy Lights'	192, 350	ROBINIER À POILS RODES	57
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'Elviira'	265, 326	ROBINIER FAUX-ACACIA	66
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'Haaga'	265, 326	ROBINIER FAUX-ACACIA 'FRISIA'	66, 227
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'Hellikki'	265, 326	ROBINIER FAUX-ACACIA 'PURPLE CROWN'	67
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'Helsinki University'	266, 326	ROBINIER FAUX-ACACIA 'PURPLE ROBE'	67
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'Mikkeli'	266, 326	ROBINIER FAUX-ACACIA 'UMBRACULIFERA'	67
<i>Rhododendron</i> série Finnish 'P.M.A. Tigerstedt'	266, 327	ROBINIER TORTUEUX	67
		RONCE 'BENENDEN'	170, 286
		RONCE DE COCKBURN DORÉE	306, 357

RONCE DU MONT IDA	85	<i>Rosa hybrida</i> 'Play Boy'	161
RONCE DU MONT IDA DORÉE	317, 358	<i>Rosa hybrida polyantha</i> 'Orange Triumph'	161
RONCE DU TIBET	215	<i>Rosa hybrida polyantha</i> 'Sarabande'	161
<i>Rosa acicularis</i>	112	<i>Rosa hybrida polyantha</i> 'The Fairy'	161
<i>Rosa</i> x <i>alba</i> 'Blush Hip'	122, 257	<i>Rosa hybrida</i> 'Prairie Joy'	91
<i>Rosa</i> x <i>alba</i> 'Pompon Blanc Parfait'	122, 257	<i>Rosa hybrida</i> 'Prima Donna'	162
<i>Rosa</i> x <i>alba</i> 'White Rose of York'	122, 257	<i>Rosa hybrida</i> 'Pristine'	162
<i>Rosa blanda</i>	191, 348	<i>Rosa hybrida</i> 'Rosarium Ueteresen'	162
<i>Rosa</i> x <i>centifolia</i> 'Fantin-Latour'	115, 251	<i>Rosa hybrida</i> 'Rosy Cushion'	91
<i>Rosa</i> x <i>centifolia muscosa</i>		<i>Rosa hybrida</i> 'Scentimental'	162
'Gloire des Mousseux'	116, 252	<i>Rosa hybrida</i> série Dr Buck 'Folksinger'	158
<i>Rosa</i> x <i>centifolia muscosa</i> 'Henri Martin'	116, 252	<i>Rosa hybrida</i> série Dr Buck 'Hawkeye Belle'	158
<i>Rosa</i> x <i>centifolia muscosa</i> 'Nuits de Young'	116, 252	<i>Rosa hybrida</i> série Dr Buck 'Summer Wind'	159
<i>Rosa</i> x <i>centifolia</i> 'Prolifera de Redouté'	115, 251	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur	
<i>Rosa</i> x <i>centifolia</i> 'Rose de Meaux'	115, 251	'Alexander MacKenzie'	30
<i>Rosa</i> x <i>damascena</i> 'Botzaris'	116, 252	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur	
<i>Rosa</i> x <i>damascena</i> 'Madame Hardy'	116, 252	'Captain Samuel Holland'	30
<i>Rosa eglanteria</i> 'Amy Robsart'	54, 223	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur	
<i>Rosa foetida</i> 'Austrian Copper'	116, 252	'Charles Albanel'	30
<i>Rosa foetida bicolor</i>	116, 252	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur	
<i>Rosa gallica</i> 'Belle de Crécy'	54, 223	'David Thompson'	30, 216
<i>Rosa gallica</i> 'Cardinal de Richelieu'	54, 223	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Frontenac'	31
<i>Rosa gallica</i> 'Ipsilanté'	54, 224	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur	
<i>Rosa glauca</i>	54, 224	'George Vancouver'	31, 216
<i>Rosa hybrida</i> 'Altissimo'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Henry Hudson'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Apricot Nectar'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Jens Munk'	31, 217
<i>Rosa hybrida</i> 'Blaze Improved'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'John Cabot'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Broadway'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'John Davis'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Candelabra'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Lambert Closse'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Chicago Peace'	158	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Louis Jolliet'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Dornröschen'	91	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Marie-Victorin'	31
<i>Rosa hybrida</i> 'Dublin Bay'	159	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Quadra'	32
<i>Rosa hybrida</i> 'Fourth of July'	159	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Royal Edward'	32
<i>Rosa hybrida</i> 'George Burns'	159	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'Simon Fraser'	32
<i>Rosa hybrida</i> 'Gipsy Dancer'	159	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'William Baffin'	32
<i>Rosa hybrida</i> 'Glowing Peace'	159	<i>Rosa hybrida</i> série Explorateur 'William Booth'	32
<i>Rosa hybrida</i> 'Hope for Humanity'	159	<i>Rosa hybrida</i> série 'Flower Carpet'	91
<i>Rosa hybrida</i> 'Illusion'	159	<i>Rosa hybrida</i> série 'Meidiland'	91
<i>Rosa hybrida</i> 'Ilse Krohn Superior'	159	<i>Rosa hybrida</i> 'Swany'	92
<i>Rosa hybrida</i> 'Immmensee'	91	<i>Rosa hybrida</i> 'The Herbalist'	162
<i>Rosa hybrida</i> 'Ingrid Bergman'	160	<i>Rosa hybrida</i> 'Tournament of Roses'	162
<i>Rosa hybrida</i> 'Joseph's Coat'	160	<i>Rosa hybrida</i> 'Tradescant'	162
<i>Rosa hybrida</i> 'Lilian Austin'	160	<i>Rosa hybrida</i> 'Winnipeg Parks'	162
<i>Rosa hybrida</i> 'Love'	160	<i>Rosa hybrida</i> 'Wise Portia'	162
<i>Rosa hybrida</i> 'Loving Memory'	160	<i>Rosa moyesii</i> 'Eddie's Jewel'	83, 237
<i>Rosa hybrida miniature</i> 'Anna Ford'	160	<i>Rosa moyesii</i> 'Geranium'	83, 237
<i>Rosa hybrida miniature</i> 'Cupcake'	160	<i>Rosa multiflora</i>	123, 257
<i>Rosa hybrida</i> 'Miss All America Beauty'	160	<i>Rosa nitida</i> 'Métis'	37
<i>Rosa hybrida</i> 'Morden Blush'	160	<i>Rosa pimpinellifolia altaica</i>	63, 226
<i>Rosa hybrida</i> 'Morden Cardinette'	160	<i>Rosa pimpinellifolia</i> 'Frühlingsmorgen'	63, 226
<i>Rosa hybrida</i> 'Morden Ruby'	160	<i>Rosa rubiginosa</i> 'Amy Robsart'	54, 223
<i>Rosa hybrida</i> 'Morden Snow Beauty'	160	<i>Rosa rubrifolia</i>	54, 224
<i>Rosa hybrida</i> 'Morden Sunrise'	161	<i>Rosa rugosa</i> 'Agnes'	68, 227
<i>Rosa hybrida Musks</i> 'Ballerina'	91, 242	<i>Rosa rugosa alba</i>	68, 227
<i>Rosa hybrida Musks</i> 'Buff Beauty'	91, 242	<i>Rosa rugosa</i> 'Belle Poitevine'	68, 227
<i>Rosa hybrida Musks</i> 'Mozart'	91, 242	<i>Rosa rugosa</i> 'Magnifica'	68, 227
<i>Rosa hybrida</i> 'Opening Night'	161	<i>Rosa rugosa</i> 'Mrs John McNabb'	68, 228
<i>Rosa hybrida</i> 'Palmen Garten Frankfurt'	91	<i>Rosa rugosa</i> 'Robusta'	68, 228
<i>Rosa hybrida</i> 'Pascali'	161	<i>Rosa rugosa</i> 'Schneezwerg'	68, 228
<i>Rosa hybrida</i> 'Paul Neyron'	161, 282	<i>Rosa rugosa</i> série 'Grootendorst'	68, 227

<i>Rosa rugosa</i> série 'Max Graf'	68, 227	'TOURNAMENT OF ROSES'	162
<i>Rosa rugosa</i> 'Will Alderman'	69, 228	ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'ALTISSIMO'	158
ROSIER ACICULAIRE	112	ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'BLAZE IMPROVED'	158
ROSIER À FEUILLES ROUGES	54, 224	ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'FOURTH OF JULY'	159
ROSIER 'ALEXANDER MACKENZIE'	30	ROSIER HYBRIDE GRIMPANT 'JOSEPH'S COAT'	160
ROSIER 'AMY ROBSART'	54, 223	ROSIER HYBRIDE PERPÉTUEL 'PAUL NEYRON'	161, 282
ROSIER 'ANNA FORD'	160	ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'ORANGE TRIUMPH'	161
ROSIER ARBUSTIF 'DORNROSCHEIN'	91	ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'SARABANDE'	161
ROSIER ARBUSTIF 'IMMENSEE'	91	ROSIER HYBRIDE POLYANTHA 'THE FAIRY'	161
ROSIER ARBUSTIF 'PALMENGARTEN FRANKFURT'	91	ROSIER 'IPSILANTÉ'	54, 224
ROSIER ARBUSTIF 'PRAIRIE JOY'	91	ROSIER 'JENS MUNK'	31, 217
ROSIER ARBUSTIF 'ROSY CUSHION'	91	ROSIER 'JOHN DAVIS'	31
ROSIER ARBUSTIF SÉRIE 'FLOWER CARPET'	91	ROSIER 'LAMBERT CLOSSE'	31
ROSIER ARBUSTIF SÉRIE 'MEIDLAND'	91	ROSIER 'LOUIS JOLLIET'	31
ROSIER ARBUSTIF 'SWANY'	92	ROSIER 'MADAME HARDY'	116, 252
ROSIER 'BALLERINA'	91, 242	ROSIER 'MARIE-VICTORIN'	31
ROSIER 'BELLE DE CRÉCY'	54, 223	ROSIER 'MÉTIS'	37
ROSIER 'BLUSH HIP'	122, 257	ROSIER 'MORDEN BLUSH'	160
ROSIER 'BOTZARIS'	116, 252	ROSIER 'MORDEN CARDINETTE'	160
ROSIER 'BUFF BEAUTY'	91, 242	ROSIER 'MORDEN RUBY'	160
ROSIER 'CARDINAL DE RICHELIEU'	54, 223	ROSIER 'MORDEN SNOW BEAUTY'	160
ROSIER 'CHARLES ALBANEL'	30	ROSIER 'MORDEN SUNRISE'	161
ROSIER 'CUPCAKE'	160	ROSIER 'MOZART'	91, 242
ROSIER 'DAVID THOMPSON'	30, 216	ROSIER MULTIFLORE	123, 257
ROSIER DU LABRADOR	191, 348	ROSIER 'NUITS DE YOUNG'	116, 252
ROSIER 'EDDIE'S JEWEL'	83, 237	ROSIER PIMPRENELLE 'FRÜHLINGSMORGEN'	63, 226
ROSIER 'FANTIN-LATOUR'	115, 251	ROSIER PIMPRENELLE ALTAICA	63, 226
ROSIER FÉTIDE BICOLORE	116, 252	ROSIER 'POMPON BLANC PARFAIT'	122, 257
ROSIER 'FOLKSINGER'	158	ROSIER 'PROLIFERA DE REDOUTÉ'	115, 251
ROSIER 'FRONTENAC'	31	ROSIER 'QUADRA'	32
ROSIER 'GEORGE VANCOUVER'	31, 216	ROSIER 'ROYE DE MEAUX'	115, 251
ROSIER 'GERANIUM'	83, 237	ROSIER 'ROYAL EDWARD'	32
ROSIER 'GLOIRE DES MOUSSEUX'	116, 252	ROSIER RUGUEUX À FLEURS BLANCHES	68, 227
ROSIER GRIMPANT 'DUBLIN BAY'	159	ROSIER RUGUEUX 'AGNES'	68, 227
ROSIER 'HAWKEYE BELLE'	158	ROSIER RUGUEUX 'BELLE POITEVINE'	68, 227
ROSIER 'HENRI MARTIN'	116, 252	ROSIER RUGUEUX MAGNIFIQUE	68, 227
ROSIER 'HENRY HUDSON'	31	ROSIER RUGUEUX 'MRS JOHN McNABB'	68, 228
ROSIER 'HOPE FOR HUMANITY'	159	ROSIER RUGUEUX 'ROBUSTA'	68, 228
ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'LILIAN AUSTIN'	160	ROSIER RUGUEUX 'SCHNEEZWERG'	68, 228
ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'THE HERBALIST'	162	ROSIER RUGUEUX SÉRIE 'GROOTENDORST'	68, 227
ROSIER HYBRIDE DE AUSTIN 'WISE PORTIA'	162	ROSIER SÉRIE 'MAX GRAF'	68, 227
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'BROADWAY'	158	ROSIER RUGUEUX 'WILL ALDERMAN'	69, 228
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'CHICAGO PEACE'	158	ROSIER SARMENTEUX 'CAPTAIN SAMUEL HOLLAND'	30
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'GLOWING PEACE'	159	ROSIER SARMENTEUX 'ILLUSION'	159
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'INGRID BERGMAN'	160	ROSIER SARMENTEUX 'ILSE KROHN SUPERIOR'	159
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'LOVE'	160	ROSIER SARMENTEUX 'JOHN CABOT'	31
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'LOVING MEMORY'	160	ROSIER SARMENTEUX 'ROSARIUM UETERESEN'	162
ROSIER HYBRIDE DE THÉ		ROSIER SARMENTEUX 'WILLIAM BAFFIN'	32
'MISS ALL AMERICA BEAUTY'	160	ROSIER 'SIMON FRASER'	32
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'OPENING NIGHT'	161	ROSIER 'SUMMER WIND'	159
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'PASCALI'	161	ROSIER 'WHITE ROSE OF YORK'	122, 257
ROSIER HYBRIDE DE THÉ 'PRISTINE'	162	ROSIER 'WILLIAM BOOTH'	32
ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'APRICOT NECTAR'	158	ROSIER 'WINNIPEG PARKS'	162
ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'GEORGE BURNS'	159	<i>Rubus</i> x 'Benenden'	170, 286
ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'GIPSY DANCER'	159	<i>Rubus cockburnianus</i> 'Goldenvale'	306, 357
ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'PLAY BOY'	161	<i>Rubus idaeus</i>	85
ROSIER HYBRIDE FLORIBUNDA 'SCENTIMENTAL'	162	<i>Rubus idaeus</i> 'Aureus'	317, 358
ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA 'CANDELABRA'	158	<i>Rubus odoratus</i>	364
ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA 'PRIMA DONNA'	162	<i>Rubus odoratus</i> 'Rubra'	364
ROSIER HYBRIDE GRANDIFLORA		<i>Rubus thibetanus</i>	215

Rubus thibetanus 'Silver Fern' 215
Rubus x tridel 'Benenden' 170, 286

S

Salix alba 'Dart's Snake' 177
Salix alba 'Flame' 177
Salix alba 'Snake' 177
Salix alba 'Tristis' 177
Salix arenaria 41, 220
Salix babylonica 'Crispa' 118
Salix caprea 40, 308
Salix caprea 'Kilmarnock' 40
Salix caprea 'Pendula' (femelle) 40
Salix caprea 'Pendula' (mâle) 40
Salix caprea 'Weeping Sally' 40
Salix chaenomeloides 206, 355
Salix cinerea 'Tricolor' 119, 254
Salix cinerea 'Variegata' 119, 254
Salix discolor 213, 357
Salix x erythroflexuosa 182, 293
Salix exigua 63, 227
Salix geyeriana 187, 295
Salix gracilistyla 'Melanostachys' 202, 302
Salix hookeriana 'Clastop' 213
Salix integra 'Flamingo' 306
Salix integra 'Hakuro Nishiki' 306
Salix interior 63, 227
Salix koriyanagi 'Rubykins' 213, 357
Salix matsudana 'Golden Curls' 63, 226
Salix matsudana 'Scarlet Curls' 63, 226
Salix matsudana 'Tortuosa' 63, 226
Salix melanostachys 202, 302
Salix x 'Northern Fountains' 211
Salix x 'Prairie Cascade' 211
Salix purpurea 'Gracilis' 214
Salix purpurea 'Nana' 214
Salix purpurea 'Pendula' 214
Salix repens 41, 220
Salix sachalinensis 'Sekka' 202, 302
Salix sepulcralis 'Erythroflexuosa' 182, 293
Salix udensis 'Sekka' 202, 302
Salix udensis 'Setsuka' 202, 302
Salix viminalis 142
Sambucus canadensis 366
Sambucus canadensis 'Adams' 366
Sambucus canadensis 'Aurea' 112
Sambucus canadensis 'Maxima' 112, 320
Sambucus nigra 146, 335
Sambucus nigra 'Albomarginata' 147, 336
Sambucus nigra 'Aureomarginata' 146, 335
Sambucus nigra 'Black Beauty' 147, 336
Sambucus nigra 'Gerda' 147, 336
Sambucus nigra 'Guincho Purple' 147, 336
Sambucus nigra 'Laciniata' 147, 336
Sambucus nigra 'Madonna' 272, 336
Sambucus nigra 'Marginata' 147, 336
Sambucus nigra 'Pulverulenta' 147, 336
Sambucus nigra 'Purpurea' 147, 336
Sambucus pubens 68, 314

Sambucus racemosa 'Goldfinch' 66, 313
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' 313
Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 66, 314
SAPIN BAUMIER 187, 348
SAPIN BAUMIER NAIN 187, 348
SAPIN BAUMIER 'PICCOLO' 187, 348
SAPIN BLANC DU COLORADO 87, 240
SAPIN BLANC DU COLORADO COMPACT 87, 240
SAPIN COMMUN PLEUREUR 87, 239
SAPIN DE CORÉE 126
SAPIN DE CORÉE DORÉ 259
SAPIN DE CORÉE 'HORSTMANN'S SILBERLOCKE' 126
SAPIN DE CORÉE 'PROSTRATE BEAUTY' 126
SAPIN DE CORÉE 'SILVER SHOW' 126
SAPIN DE CORÉE 'STARKER'S DWARF' 127
SAPIN DE DOUGLAS BLEU 89, 241
SAPIN DE DOUGLAS 'CARNEFIX WEEPING' 84, 241
SAPIN DE DOUGLAS 'EMERALD TWISTER' 89, 241
SAPIN DE DOUGLAS 'LOGGERHEAD' 89, 241
SAPIN DE DOUGLAS PLEUREUR 89, 241, 242
SAPIN DE L'OUEST COMPACT 100, 246
SAPIN DE L'OUEST 'GREEN GLOBE' 100, 247
SAPIN DE NORMAND 'GOLDEN SPREADER' 259
SAULE À CHATONS ARGENTÉS 206, 355
SAULE À CHATONS NOIRS 202, 302
SAULE À FEUILLES ÉTROITES 63, 227
SAULE ARCTIQUE NAIN 214
SAULE ARCTIQUE PLEUREUR 214
SAULE ARGENTÉ 187, 295
SAULE CENDRÉ TRICOLERE 119, 254
SAULE DE HOOKER 'CLASTOP' 213
SAULE DE PÉKIN 'GOLDEN CURLS' 63, 226
SAULE DE PÉKIN 'SCARLET CURLS' 63, 226
SAULE DE PÉKIN TORTUEUX 63, 226
SAULE DISCOLORE 213, 357
SAULE DORÉ TORTUEUX 182, 293
SAULE 'FLAME' 177
SAULE 'FLAMINGO' 306
SAULE 'HAKURO NISHIKI' 306
SAULE MARSALTY 40, 308
SAULE MARSALTY PLEUREUR (FEMELLE) 40
SAULE MARSALTY PLEUREUR (MÂLE) 40
SAULE PLEUREUR À ÉCORCE JAUNE 177
SAULE PLEUREUR À FEUILLES CRISPÉES 118
SAULE PLEUREUR 'NORTHERN FOUNTAINS' 211
SAULE 'PRAIRIE CASCADE' 211
SAULE RAMPANT 41, 220
SAULE RAMPANT ARGENTÉ 41, 220
SAULE 'RUBYKINS' 213, 357
SAULE 'SEKKA' 202, 302
SAULE 'SNAKE' 177
SCIADOPITYS VERTICILLATA 220, 307
Sciadopitys verticillata 220, 307
SERINGAT BLANC 140, 332
SERINGAT 'BLIZZARD' 138, 330
SERINGAT 'BOUQUET BLANC' 138, 330
SERINGAT 'BUCKLEY'S QUILL' 138, 331
SERINGAT DORÉ 232
SERINGAT 'FROSTY MORN' 138, 331
SERINGAT 'INNOCENCE' 139, 331

SERINGAT 'MINIATURE SNOWFLAKE'	139, 331	<i>Spiraea japonica</i> 'Alpina'	183
SERINGAT 'MINNESOTA SNOWFLAKE'	139, 331	<i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer'	183, 293
SERINGAT 'SILVER SHOWERS'	139, 331	<i>Spiraea japonica</i> 'Bullata'	183
SERINGAT 'SNOWBELLE'	139, 332	<i>Spiraea japonica</i> 'Candlelight'	183, 293
SERINGAT 'SNOWGOOSE'	140, 332	<i>Spiraea japonica</i> 'Coccinea'	184, 294
SERINGAT 'SNOW VELVET'	139, 331	<i>Spiraea japonica</i> 'Crispa'	184
SERINGAT 'WATERTON'	140, 332	<i>Spiraea japonica</i> 'Dakota Goldcharm'	184, 294
SERINGAT 'WHITE ROCK'	140, 332	<i>Spiraea japonica</i> 'Dart's Red'	184, 294
SERINGAT 'YELLOW HILL'	140, 332	<i>Spiraea japonica</i> 'Firelight'	184
SHEPHERDIA ARGENTÉ	66	<i>Spiraea japonica</i> 'Flaming Elf'	184
Shepherdia argentea	66	<i>Spiraea japonica</i> 'Flaming Mound'	184
Shepherdia canadensis	57	<i>Spiraea japonica</i> 'Flowering Choice'	184
SHEPHERDIA DU CANADA	57	<i>Spiraea japonica</i> 'Froebelii'	185, 294
SMILAX HERBACÉ	320, 359	<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Elf'	185
Smilax herbacea	320, 359	<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess'	185
SORBARIA À FEUILLES DE SORBIER	371	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'	185
Sorbaria aitchisonii	170, 286	<i>Spiraea japonica</i> 'Gold Mound'	185
SORBARIA D'AITCHISON	170, 286	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	186
Sorbaria sorbifolia	371	<i>Spiraea japonica</i> 'Lisp'	185
Sorbaria tomentosa angustifolia	170, 286	<i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla'	186
SORBIER À FEUILLES DE CHÊNE	116	<i>Spiraea japonica</i> 'Magic Carpet'	186
SORBIER DE CORÉE	196	<i>Spiraea japonica</i> 'Manon'	186
SORBIER DE KOEHNE	97, 245	<i>Spiraea japonica</i> 'Manon Red Prince'	186
SORBIER DES OISEAUX	83, 238	<i>Spiraea japonica</i> 'Mertyann'	184, 294
SORBIER DES OISEAUX À FEUILLES DÉCOUPÉES	83, 238	<i>Spiraea japonica</i> 'Nana'	183
SORBIER DES OISEAUX 'CARDINAL ROYAL'	84, 238	<i>Spiraea japonica</i> 'Neon Flash'	186
SORBIER DES OISEAUX FASTIGIÉ	84, 238	<i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana'	186
SORBIER DES OISEAUX PLEUREUR	84, 238	<i>Spiraea latifolia</i>	32
SORBIER DES OISEAUX 'ROSSICA'	84, 239	<i>Spiraea</i> x 'Magic Carpet'	186
SORBIER MINIATURE	246, 320	<i>Spiraea media</i> 'Sericae'	29
SORBIER PLAISANT	195	<i>Spiraea nipponica</i> 'Halward's Silver'	180, 291
Sorbus alnifolia	196	<i>Spiraea nipponica</i> 'June Bride'	180, 292
Sorbus aucuparia	83, 238	<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound'	180, 292
Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'	83, 238	<i>Spiraea nipponica tosaensis</i>	180, 292
Sorbus aucuparia 'Cardinal Royal'	84, 238	<i>Spiraea pseudosalicifolia</i> 'Triumphans'	98
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	84, 238	<i>Spiraea prunifolia</i> 'Plena'	116, 252
Sorbus aucuparia 'Michred'	84, 238	<i>Spiraea salicifolia</i>	39
Sorbus aucuparia 'Pendula'	84, 238	<i>Spiraea</i> x 'Snow White'	147
Sorbus aucuparia 'Rossica'	84, 239	<i>Spiraea</i> x 'Sparkling Carpet'	186
Sorbus decora	195	<i>Spiraea</i> x 'Summersnow'	148
Sorbus intermedia	72, 229	<i>Spiraea thunbergii</i>	98, 246
Sorbus koehneana	97, 245	<i>Spiraea thunbergii</i> 'Fugino Pink'	98, 246
Sorbus reducta	246, 320	<i>Spiraea thunbergii</i> 'Mellow Yellow'	98, 320
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	116	<i>Spiraea thunbergii</i> 'Mount Fuji'	98, 246
Spiraea alba	32	<i>Spiraea thunbergii</i> 'Ogon'	98, 320
Spiraea albiflora	183	<i>Spiraea trilobata</i> 'Swan Lake'	117, 321
Spiraea x arguta	86	<i>Spiraea</i> x vanhouttei	182, 347
Spiraea x arguta 'Graciosa'	86	<i>Spiraea</i> x vanhouttei 'Captain'	182, 347
Spiraea betulifolia aemiliana	64	<i>Spiraea</i> x vanhouttei 'Pink Ice'	182, 347
Spiraea betulifolia 'Thor'	64	<i>Spiraea</i> x vanhouttei 'Renaissance'	182, 348
Spiraea x billardii 'Triumphans'	98	<i>Spiraea</i> x 'Walbuma'	186
Spiraea bullata	183	SPIRÉE À FEUILLES DE BOULEAU AEMILIANA	64
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	83, 293	SPIRÉE À FEUILLES DE BOULEAU 'THOR'	64
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	86	SPIRÉE À FEUILLES DE SAULE	39
Spiraea fritschiana 'Chicago Snow'	199, 353	SPIRÉE À FEUILLES LARGES	32
Spiraea x 'Golden Carpet'	185	SPIRÉE ARGUTA	86
Spiraea x 'Green Carpet'	185	SPIRÉE BLANCHE D'AMÉRIQUE	32
Spiraea japonica alba	183	SPIRÉE 'CHICAGO SNOW'	199, 353
Spiraea japonica albiflora	183	SPIRÉE DE FROEBEL	185, 294
Spiraea japonica 'Albiflora'	183	SPIRÉE DE THUNBERG	98, 246

SPIRÉE DE THUNBERG 'FUGINO PINK'	98, 246	SUREAU DU CANADA 'MAXIMA'	112, 320
SPIRÉE DE THUNBERG 'MELLOW YELLOW'	98, 320	SUREAU NOIR	146, 335
SPIRÉE DE THUNBERG 'MOUNT FUJI'	98, 246	SUREAU NOIR À FEUILLES LACINIÉES	147, 336
SPIRÉE VAN HOUTTE	182, 347	SUREAU NOIR À FEUILLES PANACHÉES	146, 335
SPIRÉE VAN HOUTTE 'PINK ICE'	182, 347	SUREAU NOIR À FEUILLES POURPRES	147, 336
SPIRÉE VAN HOUTTE 'RENAISSANCE'	182, 348	SUREAU NOIR 'BLACK BEAUTY'	147, 336
SPIRÉE DU JAPON À FEUILLES CRISPÉES	184	SUREAU NOIR 'MADONNA'	272, 336
SPIRÉE DU JAPON 'ANTHONY WATERER'	183, 293	SUREAU NOIR 'PULVERULENTA'	147, 336
SPIRÉE DU JAPON BLANCHE	183	SUREAU PUBESCENT	68, 314
SPIRÉE DU JAPON 'BULLATA'	183	<i>Symphoricarpos albus</i>	362
SPIRÉE DU JAPON 'CANDLELIGHT'	183, 293	<i>Symphoricarpos</i> x <i>chenaultii</i> 'Hancock'	180, 346
SPIRÉE DU JAPON 'COCCINEA'	184, 294	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i> 'Ariso'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'DAKOTA GOLDCHARM'	184, 294	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i> 'Amethyst'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'DART'S RED'	184, 294	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i> 'Kordes'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'FIRELIGHT'	184	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i> 'Magic Berry'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'FLAMING ELF'	184	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i> 'Marleen'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'FLAMING MOUND'	184	<i>Symphoricarpos</i> x <i>doorenbosii</i>	
SPIRÉE DU JAPON 'FLOWERING CHOICE'	184	'Mother of Pearl'	60, 311
SPIRÉE DU JAPON 'GOLD MOUND'	185	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	362
SPIRÉE DU JAPON 'GOLDEN ELF'	185	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Albovariegatus'	61, 312
SPIRÉE DU JAPON 'GOLDEN PRINCESS'	185	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	
SPIRÉE DU JAPON 'GOLDFLAME'	185	'Argenteovariegatus'	61, 312
SPIRÉE DU JAPON 'LITTLE PRINCESS'	186	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	
SPIRÉE DU JAPON 'MACROPHYLLA'	186	'Bowles' Golden Variegated'	61, 311
SPIRÉE DU JAPON 'MAGIC CARPET'	186	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	
SPIRÉE DU JAPON 'MANON RED PRINCE'	186	'Foliis Variegatis'	61, 311
SPIRÉE DU JAPON NAIN	183	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	
SPIRÉE DU JAPON 'NEON FLASH'	186	'Taff's Silver Edge'	61, 312
SPIRÉE DU JAPON 'SHIROBANA'	186	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Variegatus'	61, 311
SPIRÉE 'GOLDEN CARPET'	185	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	362
SPIRÉE 'GREEN CARPET'	185	<i>Symphoricarpos vulgaris</i>	362
SPIRÉE 'GREFSHEIM'	86	SYMPHORINE À FEUILLES RONDES	362
SPIRÉE 'HALWARD'S SILVER'	180, 291	SYMPHORINE À FEUILLES RONDES PANACHÉES	61, 312
SPIRÉE 'JUNE BRIDE'	180, 292	SYMPHORINE À FEUILLES RONDES	
SPIRÉE PRUINEUSE À FLEURS DOUBLES	116, 252	'Taff's Silver Edge'	61, 312
SPIRÉE 'SNOWMOUND'	180, 292	SYMPHORINE 'AMETHYST'	60, 311
SPIRÉE 'SNOW WHITE'	147	SYMPHORINE BLANCHE	362
SPIRÉE SOYEUSE	29	SYMPHORINE DE HANCOCK	180, 346
SPIRÉE 'SPARKLING CARPET'	186	SYMPHORINE 'MAGIC BERRY'	60, 311
SPIRÉE 'SUMMERSNOW'	148	SYMPHORINE 'MARLEEN'	60, 311
SPIRÉE 'SWAN LAKE'	117, 321	SYMPHORINE 'MOTHER OF PEARL'	60, 311
SPIRÉE 'TRIUMPHANS'	98	<i>Syringa</i> x 'Agincourt Beauty'	76, 232
STAPHYLEA À TROIS FEUILLES	369	<i>Syringa</i> x 'Albert F. Holden'	76, 232
<i>Staphylea trifolia</i>	369	<i>Syringa</i> x 'Andenken an Ludwig Späth'	81, 236
STEPHANANDRA CRISPÉ	170, 286	<i>Syringa</i> x 'Avalanche'	76, 232
<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	170, 286	<i>Syringa</i> x 'Bailbelle'	81, 237
STEWARTIA	170, 341	<i>Syringa</i> x 'Beauté de Moscou'	78, 234
<i>Stewartia pseudocamellia</i>	170, 341	<i>Syringa</i> x 'Beauty of Moscow'	78, 234
SUMAC AROMATIQUE	198, 353	<i>Syringa</i> x 'Belle de Nancy'	76, 232
SUMAC AROMATIQUE 'GROW LOW'	198, 353	<i>Syringa</i> x 'Burgundy Queen'	76, 232
SUMAC DE VIRGINIE	28	<i>Syringa</i> x 'Charles Joly'	76, 232
SUMAC DE VIRGINIE À FEUILLES LACINIÉES	28, 216	<i>Syringa</i> x <i>chinensis</i> 'Saugeana'	182, 293
SUMAC DE VIRGINIE 'TIGER EYES'	28, 307	<i>Syringa</i> x 'Dappled Dawn'	77, 232
SUREAU ARGENTÉ	147, 336	<i>Syringa</i> x 'Edward J. Gardner'	77, 233
SUREAU DORÉ PLUMEUX	313	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Angel White'	77, 233
SUREAU DORÉ PLUMEUX 'GOLDFINCH'	66, 131	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Asessippi'	77, 233
SUREAU DORÉ PLUMEUX 'SUTHERLAND GOLD'	66, 134	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Churchill'	77, 233
SUREAU DU CANADA	366	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Excel'	77, 233
SUREAU DU CANADA 'ADAMS'	366	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Lavender Lady'	77, 233
SUREAU DU CANADA DORÉ	112	<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Maiden's Blush'	77, 234

<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Mount Baker'	78, 234	<i>Tamarix parviflora</i>	58
<i>Syringa</i> x <i>hyacinthiflora</i> 'Pocahontas'	78, 234	<i>Tamarix pentandra</i>	46
<i>Syringa</i> x 'Josée'	78	<i>Tamarix ramosissima</i>	46
<i>Syringa josikaea</i>	148	<i>Tamarix ramosissima</i> 'Pink Cascade'	47
<i>Syringa josikaea</i> 'Holger'	148	<i>Tamarix ramosissima</i> 'Rubra'	47
<i>Syringa julianae</i> 'Hers'	72, 229	<i>Tamarix ramosissima</i> 'Summer Glow'	47
<i>Syringa</i> x 'Katherine Havemeyer'	78, 234	<i>Taxus canadensis</i>	372
<i>Syringa</i> x 'Krasavitsa Moskvj'	78, 234	<i>Taxus cuspidata</i> 'Aurescens'	111, 250
<i>Syringa</i> x <i>laciniata</i>	78	<i>Taxus cuspidata</i> 'Bright Gold'	112, 250
<i>Syringa</i> x 'Little Boy Blue'	78, 234	<i>Taxus cuspidata</i> 'Capitata'	364
<i>Syringa</i> x 'Madame Lemoine'	79, 235	<i>Taxus cuspidata</i> 'Dwarf Bright Gold'	112, 250
<i>Syringa</i> x 'Marie Frances'	78, 234	<i>Taxus cuspidata</i> 'Nana'	365
<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	246	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Brownii'	365
<i>Syringa meyeri</i> 'Snowstorm'	246	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Densiformis'	365
<i>Syringa</i> x 'Michel Buchner'	79, 234	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Fairview'	365
<i>Syringa microphylla</i> 'Superba'	86, 239	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Flushing'	365
<i>Syringa</i> x 'Miss Ellem Willmott'	79, 235	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Hicksii'	365
<i>Syringa</i> x 'Monge'	79, 235	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Hillii'	365
<i>Syringa</i> x 'Mrs Edward Harding'	79, 235	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Sentalinis'	365
<i>Syringa</i> x 'Nadezha'	79, 235	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Stricta Viridis'	365
<i>Syringa palibiniana</i>	246	<i>Taxus</i> x <i>media</i> 'Viridis'	365
<i>Syringa patula</i> 'Miss Kim'	86	THE DES BOIS	308, 358
<i>Syringa</i> x 'Paul Thirion'	79, 235	THE DU LABRADOR	44, 221
<i>Syringa persica</i> 'Laciniata'	78	THUJA DU JAPON	115, 250
<i>Syringa</i> x 'Pink Elizabeth'	80, 235	<i>Thuja occidentalis</i>	127, 259
<i>Syringa</i> x 'Prairie Petite'	80, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	129, 261
<i>Syringa</i> x 'Président Grevy'	86, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Boisbriand'	127, 259
<i>Syringa</i> x 'Président Poincaré'	86, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Brabant'	128, 323
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Agnes Smith'	98	<i>Thuja occidentalis</i> 'Brandon'	129, 261
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Alice Rose Foster'	98	<i>Thuja occidentalis</i> 'Caespitosa'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Coral'	98	<i>Thuja occidentalis</i> 'Danica'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Donald Wyman'	98	<i>Thuja occidentalis</i> 'Dart's Gold'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Hiawatha'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Degroot's Spire'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Isabella'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Emerald'	130, 262
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'James Mac Farlane'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Europe Gold'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Minuet'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Filliformis'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Miss Canada'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe'	128, 260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Red Wine'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Tuffet'	260
<i>Syringa</i> x <i>prestoniae</i> 'Royalty'	99	<i>Thuja occidentalis</i> 'Hetz Midget'	128, 260
<i>Syringa</i> x 'Primrose'	80, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Holmstrup'	129, 261
<i>Syringa</i> x 'Prodige'	81, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Little Giant'	129, 261
<i>Syringa reticulata</i>	81	<i>Thuja occidentalis</i> 'Lutea'	129, 261
<i>Syringa reticulata</i> 'Golden Eclipse'	72, 229	<i>Thuja occidentalis</i> 'Mission'	130, 262
<i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk'	72, 230	<i>Thuja occidentalis</i> 'Nigra'	129, 261
<i>Syringa</i> x 'Sensation'	81, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Pendula'	129, 261
<i>Syringa</i> x 'Slater's Elegance'	81, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Pyramidalis'	129, 261
<i>Syringa</i> x 'Souvenir de Ludwig Spaeth'	81, 236	<i>Thuja occidentalis</i> 'Rheingold'	262
<i>Syringa</i> x 'Tinkerbelle'	81, 237	<i>Thuja occidentalis</i> 'Robusta'	131, 263
<i>Syringa velutina</i> 'Miss Kim'	86	<i>Thuja occidentalis</i> 'Sherwood Frost'	129, 262
<i>Syringa villosa</i>	86	<i>Thuja occidentalis</i> 'Sherwood Moss'	129, 262
<i>Syringa villosa</i> 'Aurea'	239	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	130, 262
<i>Syringa vulgaris</i>	81, 237	<i>Thuja occidentalis</i> 'Snowtip'	130, 262
<i>Syringa</i> x 'Wedgewood Blue'	81, 237	<i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis'	130, 262
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Sunkist'	262
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Techny'	130, 262
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Teddy'	130, 262
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Tiny Tim'	130, 263
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Unicorn'	130, 263
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Wansdyke Silver'	130, 263
		<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana'	131, 263

T

TAMARIX À PETITES FEUILLES	58
TAMARIX DE RUSSIE	46
TAMARIX DE RUSSIE 'PINK CASCADE'	47
TAMARIX DE RUSSIE 'SUMMER GLOW'	47

<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Aurea'	130, 263
<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens'	130, 263
<i>Thuja occidentalis</i> 'Woodwardii'	131, 263
<i>Thuja occidentalis</i> 'Yellow Ribbon'	131, 264
<i>Thuja standishii</i>	115, 250
<i>Tilia americana</i>	369
<i>Tilia americana</i> 'Fastigiata'	369
<i>Tilia americana</i> 'Nova'	369
<i>Tilia americana</i> 'Redmond'	369
<i>Tilia cordata</i>	135, 268
<i>Tilia cordata</i> 'Chancellor'	135, 268
<i>Tilia cordata</i> 'Chancole'	135, 268
<i>Tilia cordata</i> 'Corinthian'	135, 268
<i>Tilia cordata</i> 'Corzam'	135, 268
<i>Tilia cordata</i> 'De Groot'	136, 269
<i>Tilia cordata</i> 'Golden Cascade'	136, 269
<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	136, 269
<i>Tilia cordata</i> 'Lico'	136
<i>Tilia cordata</i> 'Norlin'	136, 269
<i>Tilia cordata</i> 'Ronald'	136, 269
<i>Tilia x euchlora</i>	72, 230
<i>Tilia x europaea</i> 'Wratislaviensis'	179, 291
<i>Tilia flavescens</i> 'Dropmore'	136
<i>Tilia mongolica</i> 'Harvest Gold'	176, 290
<i>Tilia tomentosa</i> 'Sashazam'	72, 230
<i>Tilia tomentosa</i> 'Satin Shadow'	72, 230
TILLEUL À PETITES FEUILLES	135, 268
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CHANCELLOR'	135, 268
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'CORINTHIAN'	135, 268
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'DE GROOT'	136, 269
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GOLDEN CASCADE'	136, 269
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'GREENSPIRE'	136, 269
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'LICO'	136
TILLEUL À PETITES FEUILLES 'RONALD'	136, 269
TILLEUL AMÉRICAIN	369
TILLEUL AMÉRICAIN FASTIGIÉ	369
TILLEUL AMÉRICAIN 'NOVA'	369
TILLEUL AMÉRICAIN 'REDMOND'	369
TILLEUL ARGENTÉ 'SATIN SHADOW'	72, 230
TILLEUL DE CRIMÉE	72, 230
TILLEUL DE MONGOLIE 'HARVEST GOLD'	176, 290
TILLEUL DE WRATISLAVA	179, 291
TILLEUL 'DROPMORE'	136
TROËNE 'CHEYENNE'	75, 316
TROËNE DORÉ	199
TROËNE DORÉ 'HILLSIDE'	199
TROËNE 'LODENSE'	75, 316
<i>Tsuga canadensis</i>	372
<i>Tsuga canadensis</i> 'Albospica'	286, 341
<i>Tsuga canadensis</i> 'Bennett'	341
<i>Tsuga canadensis</i> 'Cloud Prune'	372
<i>Tsuga canadensis</i> 'Cole's Prostrate'	372
<i>Tsuga canadensis</i> 'Dawsoniana'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Geneva'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Gentsch White'	341
<i>Tsuga canadensis</i> 'Golden Splendor'	170, 286
<i>Tsuga canadensis</i> 'Gracilis'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Horsford Contorted'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Jacqueline Verkade'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Jeddalah'	373

<i>Tsuga canadensis</i> 'Jervis'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Kelsey's Weeping'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Minuta'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Moon Frost'	341
<i>Tsuga canadensis</i> 'Nana'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'New Gold'	341
<i>Tsuga canadensis</i> 'Pendula'	373
<i>Tsuga canadensis</i> 'Slenderella'	374
<i>Tsuga canadensis</i> 'Stockman's Dwarf'	374
<i>Tsuga canadensis</i> 'Summer Snow'	341
<i>Tsuga diversifolia</i>	360
TULIPIER DE VIRGINIE	166

U

<i>Ulmus</i> x 'Accolade'	204
<i>Ulmus carpiniifolia</i>	60
<i>Ulmus</i> x 'Discovery'	204
<i>Ulmus glabra</i> 'Camperdownii'	136
<i>Ulmus</i> x 'Homestead'	204
<i>Ulmus minor</i> 'Jacqueline Hillier'	61
<i>Ulmus</i> x 'Morton'	204
<i>Ulmus</i> x 'Patriot'	204
<i>Ulmus</i> x 'Pioneer'	204
<i>Ulmus</i> x 'Prospector'	204
<i>Ulmus pumila</i>	380
<i>Ulmus pumila</i> 'Park Royal'	380
<i>Ulmus rubra</i>	137

V

<i>Vaccinium angustifolium</i>	309
<i>Vaccinium canadense</i>	42, 309
<i>Vaccinium corymbosum</i>	113, 321
<i>Vaccinium macrocarpon</i>	44
<i>Vaccinium myrtilloides</i>	42, 309
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	310
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Koralle'	310
<i>Vaccinium vitis-idaea minus</i>	310
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Pearl'	310
<i>Viburnum acerifolium</i>	364
<i>Viburnum alnifolium</i>	366
<i>Viburnum x carlcephalum</i>	86, 239
<i>Viburnum cassinoides</i>	374
<i>Viburnum cassinoides</i> 'Appalache'	375
<i>Viburnum dentatum</i>	119, 322
<i>Viburnum dentatum</i> 'Autumn Jazz'	119, 322
<i>Viburnum dentatum</i> 'Blue Muffin'	119, 323
<i>Viburnum dentatum</i> 'Chicago Lustre'	119, 323
<i>Viburnum dentatum</i> 'Christom'	119, 323
<i>Viburnum dentatum</i> 'Perle Bleue'	119, 323
<i>Viburnum dentatum</i> 'Ralph Senior'	119, 322
<i>Viburnum dentatum</i> 'Synnstedt'	119, 323
<i>Viburnum lantana</i>	117, 322
<i>Viburnum lantana</i> 'Mohican'	117, 322
<i>Viburnum lentago</i>	375
<i>Viburnum plicatum</i>	181, 347
<i>Viburnum plicatum</i> 'Shasta'	181, 347
<i>Viburnum plicatum</i> 'Summer Snowflake'	181, 347
<i>Viburnum x rhytidophylloides</i> 'Alleghany'	100, 246
<i>Viburnum sargentii</i>	117, 253

<i>Viburnum sargentii</i> 'Onondaga'	117, 253	WEIGELA 'LUCIFER'	148, 273
<i>Viburnum trilobum</i>	176, 345	<i>Weigela</i> x 'Lucifer'	148, 273
<i>Viburnum trilobum</i> 'Alfredo'	176, 345	<i>Weigela middendorffiana</i>	100, 246
<i>Viburnum trilobum</i> 'Compactum'	176, 345	WEIGELA 'MIDNIGHT WINE'	148, 273
<i>Viburnum trilobum</i> 'Wentworth'	177, 345	<i>Weigela</i> x 'Midnight Wine'	148, 273
VIGNE DES MARAIS	368	WEIGELA 'MINUET'	149, 273
VIGNE-VIERGE	367	<i>Weigela</i> x 'Minuet'	149, 273
VIGNE-VIERGE D'ENGELMANN	367	WEIGELA 'NAIN ROUGE'	149, 274
VIGNE-VIERGE 'STAR SHOWERS'	368	<i>Weigela</i> x 'Nain Rouge'	149, 274
VINAIGRIER	67	<i>Weigela</i> x 'Olympiade'	272, 336
VINAIGRIER À FEUILLES LACINIÉES	67	WEIGELA 'PINK DELIGHT'	149, 274
VIORNE À FEUILLES D'AULNE	366	<i>Weigela</i> x 'Pink Delight'	149, 274
VIORNE À FEUILLES D'ÉRABLE	364	WEIGELA 'PINK PRINCESS'	149, 274
VIORNE 'ALLEGHANY'	100, 246	<i>Weigela</i> x 'Pink Princess'	149, 274
VIORNE CARLCEPHALUM	86, 239	WEIGELA 'POLKA'	149, 274
VIORNE CASSINOÏDE	374	<i>Weigela</i> x 'Polka'	149, 274
VIORNE CASSINOÏDE 'APPALACHE'	375	WEIGELA 'RED PRINCE'	149, 274
VIORNE COMMUNE	117, 322	<i>Weigela</i> x 'Red Prince'	149, 274
VIORNE COMMUNE 'MOHICAN'	117, 322	<i>Weigela</i> x 'Rubidor'	272, 336
VIORNE DENTÉE	119, 322	WEIGELA 'RUBY QUEEN'	149, 274
VIORNE DENTÉE 'AUTUMN JAZZ'	119, 322	<i>Weigela</i> x 'Ruby Queen'	149, 274
VIORNE DENTÉE 'BLUE MUFFIN'	119, 323	WEIGELA 'RUMBA'	149, 274
VIORNE DENTÉE 'CHICAGO LUSTRE'	119, 323	<i>Weigela</i> x 'Rumba'	149, 274
VIORNE DENTÉE 'PERLE BLEUE'	119, 323	WEIGELA 'SAMBA'	150, 274
VIORNE DE SARGENT	117, 253	<i>Weigela</i> x 'Samba'	150, 274
VIORNE DE SARGENT 'ONONDAGA'	117, 253	<i>Weigela</i> x 'Saphir'	149, 274
VIORNE DU JAPON	181, 347	WEIGELA 'SUNNY PRINCESS'	150, 274
VIORNE DU JAPON 'SHASTA'	181, 347	<i>Weigela</i> x 'Sunny Princess'	150, 274
VIORNE DU JAPON 'SUMMER SNOWFLAKE'	181, 347	WEIGELA 'SUZANNE'	150, 274
<i>Vitex agnus castus</i>	64	<i>Weigela</i> x 'Suzanne'	150, 274
<i>Vitis riparia</i>	368	WEIGELA 'TANGO'	150, 275

W

WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES	126, 259	WEIGELA 'TANGO'	150, 275
WEIGELA À FEUILLES PANACHÉES NAIN	126, 259	<i>Weigela</i> x 'Tango'	150, 275
WEIGELA À FEUILLES POURPRES	126	WEIGELA 'VICTORIA'	150, 275
<i>Weigela</i> x 'Alexandra'	150, 275	<i>Weigela</i> x 'Victoria'	150, 275
WEIGELA 'BRIANT RUBIDOR'	272, 336	WEIGELA 'WHITE KNIGHT'	150, 275
<i>Weigela</i> x 'Briant Rubidor'	272, 336	<i>Weigela</i> x 'White Knight'	150, 275
<i>Weigela</i> x 'Brigela'	148, 273	WEIGELA 'WINE & ROSES'	150, 275
WEIGELA 'BRISTOL RUBY'	148, 273	<i>Weigela</i> x 'Wine & Roses'	150, 275
<i>Weigela</i> x 'Bristol Ruby'	148, 273	<i>Wisteria floribunda</i> 'Lawrence'	90, 318
WEIGELA 'BRISTOL SNOWFLAKE'	148, 273	<i>Wisteria macrostachya</i> 'Aunt Dee'	113, 320
<i>Weigela</i> x 'Bristol Snowflake'	148, 273	<i>Wisteria sinensis</i>	90, 318
WEIGELA 'CARNAVAL'	148, 273	<i>Wisteria sinensis</i> 'Blue Sapphire'	91, 318
<i>Weigela</i> x 'Carnaval'	148, 273		
<i>Weigela</i> x 'Carnival'	148, 273		
<i>Weigela</i> x 'Courtalor'	148, 273		
<i>Weigela</i> x 'Courtanin'	149, 274		
<i>Weigela</i> x 'Courtared'	148, 273		
WEIGELA DE MIDDENDORF	100, 246		
<i>Weigela</i> x 'Elvera'	148, 273		
<i>Weigela florida</i> 'Purpurea'	126		
<i>Weigela florida</i> 'Variegata'	126, 259		
<i>Weigela florida</i> 'Variegata Nana'	126, 259		
WEIGELA 'FRENCH LACE'	148, 273		
<i>Weigela</i> x 'French Lace'	148, 273		
WEIGELA 'JAVA RED'	148, 273		
<i>Weigela</i> x 'Java Red'	148, 273		

X • Y

XANTHORHIZA À FEUILLES DE CÉLÉRI	367
<i>Xanthorhiza simplicissima</i>	367
YUCCA BAÏONNETTE	28
YUCCA FILAMENTEUX	27
YUCCA FILAMENTEUX 'BRIGHT EDGE'	27
<i>Yucca filamentosa</i>	27
<i>Yucca filamentosa</i> 'Bright Edge'	27
<i>Yucca flaccida</i> 'Golden Sword'	28
<i>Yucca flaccida</i> 'Ivory Tower'	28
<i>Yucca glauca</i>	28
YUCCA 'GOLDEN SWORD'	28
YUCCA 'IVORY TOWER'	28

BIBLIOGRAPHIE

Bärtels, Andreas. Dwarf trees and shrubs, Timber Press, Portland, 1986.

Bärtels, Andreas. Le livre des arbres et arbustes, Ulmer, Paris, 1997.

Bolliger, Erben, Grau et Heubl. Les arbustes, Solar, Paris, 1985.

Brickell, Christopher. The Gardener's encyclopedia of plants & flowers, Dorling Kindersley, London, 1989.

Brockman, Zim, Merrilees. Guide des arbres de l'Amérique du Nord, Éditions Marcel Broquet, La Prairie, 1982.

Brossard, René ; Cuisance, Pierre. Arbres et arbustes d'ornement des régions tempérées et méditerranéennes, Technique et documentation, Lavoisier et J.B. Baillièrre, Paris, 1984, additif 1986.

Callen, G. Les conifères cultivés en Europe, volumes I et 2, Éditions J.B. Baillièrre, Paris, 1976.

Degraaf, Richard M. ; Witman, Gretchin M. Trees, Shrubs and Vines for attracting birds, University of Massachusetts Press, Amherst, 1979.

Devoyault, Jean-Pierre. Guide pratique des meilleurs végétaux rustiques pour le Québec, Au jardin de Jean-Pierre, Sainte-Christine.

Dion, André. Les jardins d'oiseaux, Brimar et Québec agenda, Beauceville, 1988.

Dirr, Michael A. Dirr's Hardy Trees and Shrubs, An illustrated Encyclopedia, Timber Press, Portland, 1997.

Dirr, Michael A. Manual of Woody Landscape Plants, Stipes Publishing Company, Champaign, Illinois, 1977.

Dirr, Michael A. Photographic Manual of Woody Landscape, Stipes Publishing Company, Champaign, Illinois, 1978.

Divers auteurs. RHS Plant Finder 2003-2004, Dorling Kindersley Ltd., London, 2003.

Dumont, Bertrand. Entretien et aménagement paysager au Québec, Éditions versicolores inc., Québec, 1989.

Dumont, Bertrand. Guide des végétaux d'ornements pour le Québec, tome I. Les conifères et arbustes à feuillage persistant, Éditions Broquet, La Prairie, 1987.

Dumont, Bertrand. Guide des végétaux d'ornements pour le Québec, tome II. Les arbres feuillus, Éditions Broquet, La Prairie, 1989.

Dumont, Bertrand. Guide des végétaux d'ornements pour le Québec, tome III. Les arbustes, Éditions Broquet, La Prairie, 1992.

Erhardt, Anne und Walter. PPP Index, Ulmer, Stuttgart, 1997.

Farrar, John Liard. Les Arbres du Canada, Fides, Montréal, 1996.

Frère Marie-Victorin. Flore laurentienne, Presses de l'Université de Montréal, 1964 et 1995.

Geldereren, D.M. van ; Hoeyt Smith, J.R.P. van. Conifers, Timber Press, Portland, 1986.

Harrison, L. Flint. Landscape Plants for Eastern North America, Wiley-Interscience, New York, 1984.

Hightshoe, G.L. Native trees, shrubs and vines for urban and rural America, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988.

Hillier. Hillier's manual of trees and shrubs, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1992.

Krussman, G. Cultivated broad-leaved trees and shrubs, volumes I, II, III, Timber Press, 1984.

Micheaux, Jean-Pierre. Dictionnaire sélectif des arbres, des plantes et des fleurs, Français-Anglais, Anglais-Français, Orphys, Paris, 1979.

Moore, David ; White, John. The illustrated encyclopedia of Trees, Timber Press, Portland, 2003.

Rose, Nancy ; Selinger, Don ; Whitman, John. Growing Shrubs and Small Trees in Cold Climates, The contemporary Gardener, Chicago, 2001.

Sabuco, John J. The best of the hardiest, Plantsmen's Publications, Flossmoor, 1990.

Sherk, C.L. ; Buckley, A.R. Arbustes ornementaux pour le Canada, Agriculture Canada, Ottawa, 1972.